



# СПЕЦИФИЧЕСКАЯ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА Вариант 1

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, 417 ГР.  
КОРОЛЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

# Диагноз:

Бронхиальная легкая интермиттирующая астма (приступы 3-4 раза в год)

. С какими группами небактериальных аллергенов необходимо провести аллергологическое обследование?

- ▶ Исследование уровня аллергенспецифических IgE в сыворотке крови.

- ▶ Противопоказания к проведению кожного тестирования: обострение основного заболевания; тяжелое, нескомпенсированное течение бронхиальной астмы; острые интеркуррентные инфекции (ОРЗ, ангина, пневмония и др.); декомпенсация заболеваний внутренних органов (печени, почек, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, крови и др.); обострение очагов хронической инфекции. Активная фаза хронических инфекционных заболеваний (туберкулеза, сифилиса, бруцеллеза и др.); аутоиммунные заболевания (СКВ, склеродермия, ревматоидный артрит, дерматомиозит и др.); злокачественные новообразования; психические заболевания; беременность и лактация; синдром приобретенного иммунодефицита.

- ▶ Прием антигистаминных препаратов, трициклических антидепрессантов и нейролептиков снижает чувствительность кожных рецепторов и может привести к получению ложноотрицательных результатов, поэтому эти препараты необходимо отменить за 3, 7 дней и 30 суток, соответственно, до предполагаемого срока исследования.

Первоначальная диагностика аллергии на кошек у детей проводится в домашних условиях. Родителям необходимо провести ряд манипуляций, направленных на выявление источника раздражения:

- Исключить другие, потенциальные аллергены, с которыми ребёнок имел контакт впервые.
- Следует отдать (на время) домашнего любимца другим людям и провести генеральную уборку помещения, чтобы иметь возможность удостовериться в том, что у малыша наблюдаются симптомы именно аллергии на кошачьих.
- У детей аллергия может возникать не на всех кошек, а именно на представителей конкретной породы.
- Достоверно поставить диагноз аллергии на кошек может только узкопрофильный специалист-аллерголог. Для этого врачу необходимо иметь анамнез заболевания, результаты анализов и тщательно проведённый первичный осмотр. После получения всех необходимых сведений врач ставит диагноз и назначает лечение.
- Чаще всего нужно сдать следующие анализы:
- Забор крови на присутствие антител.
- Пробы с кожных покровов на вероятность присутствия аллергии.
- Тесты провокационные. Проводятся путём ввода незначительных фрагментов потенциального аллергена в нос или ротовую полость. При выявлении признаков аллергии на кошек у ребёнка берут мазок на анализ.
- По результатам специалист назначает лечение с соблюдением индивидуальных особенностей каждого организма.