

КОЖНЫЙ СИНДРОМ ПРИ СКВ



Жалобы

- Высыпания на лице
- Выпадение волос
- Боли в суставах
- Повышение температуры
- Утомляемость
- Похудание

Анамнез

- Женщины репродуктивного возраста
- Наследственность
- Фотосенсибилизация
- Аллергический анамнез
- Исключить лекарственный генез
- Беременность, аборт, роды
- Стресс
- Вакцинация

Объективно

- **Дискоидные очаги** – сыпь в виде пузырьков в области шеи и верхней половины туловища. После разрешения остаются мелкие рубчики.
- **Эритематозные пятна** (изолированные или сливные) различных очертаний и величины, отечные, резко отграниченные от окружающей здоровой кожи, наблюдаются обычно на лице, шее, груди, в области локтевых, коленных, голеностопных суставов и щеках с образованием фолликулы «и».



Объективно

- **Люпус-хейлит** – застойная гиперемия с плотными сухими сероватыми чешуйками, иногда корочками и эрозиями, с исходом в атрофию на красной кайме губ.
- **Капилляриты** – отечная эритема с телеангиэктазиями и атрофией на подушечках пальцев, ладонной и подошвенной поверхности стоп



Трофические нарушения при СКВ

- Общая сухость кожи
- Диффузное выпадение волос (распространенное или гнездное)
- Деформация и ломкость ногтей

Лабораторные исследования

- Гипергаммаглобунемия
- Анемия нормоцитарная и нормохромная
- Лейкопения, особенно лимфоцитопения
- Тромбоцитопения
- СОЭ увеличена
- Протеинурия, гематурия, цилиндрурия
- LE-клетки
- Анти-ДНК
- ЛПРВ
- Антинуклеарный фактор
- Биопсия- гемотоксилиновые тельца

ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ

- Глюкокортикоиды
 - Цитостатические препараты
 - НПВП
 - Симптоматическая терапия
3. **Экстракорпоральные методы: плазмаферез.**