

Лекция 3. Дополнение к 1 вопросу Нарушения психического развития, обусловленные генетической патологией

Дисциплина «Клиническая психология детей и подростков»

Кафедра практической психологии


Старший преподаватель Зинченко Т.О.

План лекции

Вопросы:

1. Синдром Дауна
2. Синдром Вильямса
3. Синдром Ангельмана

Общие диагностические признаки



1 вопрос. Синдром Дауна

Распространенность:

1 : 700

(1 ребенок на 700 новорожденных)

Причины:

Трисомия 21-ой пары хромосом
(лишняя хромосома, всего 47
хромосом, а не 46)


История названия синдрома Дауна


- **1862** – Джон Лэнгдон **Даун**, английский врач - характеристика особой формы психического расстройства
- **1959** – Жером **Лежен**, французский детский врач – открытие генетической природы расстройства

Социальные достижения

- Актеры
- Музыканты
- Танцоры
- Психологи
- Учителя
- Университетское образование (Пабло Пинеда, Испания)













2 вопрос. Синдром Вильямса

Распространенность:

1 : 20 000

(1 ребенок на 20 000 новорожденных)

Причины:

Делеция (утрата, отсутствие, потеря) участка 7-ой хромосомы

История названия синдрома Вильямса

- **1961** – Дж. **Уильямс**, новозеландский кардиолог – выделил среди кардиопациентов лиц со специфической внешностью («**лицо эльфа**») и умственной отсталостью







3 вопрос. Синдром Ангельмана

Распространенность:

1 : 10 000 - 20 000

(1 ребенок на 10 000 - 20 000 новорожденных)

Причины:

Делеция (утрата, отсутствие, потеря) участка
15-ой хромосомы

История названия синдрома Ангельмана

- **1965** – Гарри **Ангельман**, английский педиатр – первое описание синдрома («лицо Петрушки», «лицо смеющейся куклы», «марионетка»)







Спасибо за внимание!