

**Кафедра: Клиникалық фармакология
және фармакотерапия**

Тақырыбы: Нитроглицерин.

MedClock.ru



Орындаған: Кенжеева М
Қабылдаған: Қайырбеков А.Қ
Курс: 6
Топ: 604-1к
Факультет: терапия

Фармакологическое действие

- Расширяет кровеносные сосуды (преимущественно коронарные /сердечные/ артерии и сосуды мозга), расслабляет гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей и других органов.

Наряду со снижением сопротивления коронарных и периферических сосудов нитроглицерин уменьшает венозный возврат крови к сердцу, способствует перераспределению кровотока в миокарде (сердечной мышце) в пользу очага ишемии и уменьшению при инфаркте миокарда очагов ишемического поражения, усиливает инотропную (сократительную) функцию миокарда. Как и другие органические нитраты, нитроглицерин улучшает метаболические процессы (обмен веществ) в миокарде, уменьшает потребность миокарда в кислороде.

Показания к применению

Для купирования
(снятия) приступов
стенокардии


При левожелудочковой
недостаточности

При дискинезии
(нарушении
подвижности)
желчевыводящих путей

В том числе при
инфаркте миокарда.

При эмболии
(закупорке)
центральной артерии
сетчатки


Механизм действия нитроглицерина



Антиангинальное действие нитроглицерина определяют следующие факторы:

- Расширение вен большого круга кровообращения и снижение венозного давления (снижение преднагрузки), вследствие чего:
 - снижается работа сердца и потребность сердца в кислороде;
 - уменьшается экстравазальная компрессия коронарных сосудов;
- Расширение артерий большого круга кровообращения и снижение артериального давления (снижение постнагрузки), что также ведет к уменьшению работы сердца и снижению потребности сердца в кислороде;
- Расширение крупных коронарных сосудов, вследствие чего улучшается коллатеральное кровоснабжение миокарда.

Механизм антиангинального действия нитроглицерина



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Чаще применяют **таблетки** или **капсулы**.
- При применении 1% раствора наносят 1-2 капли под язык или смачивают 2-3 каплями небольшой кусок сахара и держат его во рту (под языком), не проглатывая, до полного всасывания.
- Таблетки (0/2-1 таблетку) помещают под язык и не проглатывают (держат во рту до полного всасывания).
- Высшие дозы 1 % раствора нитроглицерина для взрослых: разовая 4 капли, суточная 16 капель (соответственно, 1 1/2 таблетки разовая и 6 таблеток суточная).
Капсулы также держат под языком до полного рассасывания, однако для ускорения эффекта можно раздавить капсулу зубами.

- Частота и длительность применения капель, таблеток и капсул зависят от частоты и интенсивности приступов стенокардии, эффективности и переносимости препарата. Обычно после купирования (снятия) приступов переходят на прием препаратов пролонгированного (длительного) действия.
- При применении нитроглицерина (и других нитратов) в разных лекарственных формах следует учитывать, что непрерывный длительный их прием приводит к развитию толерантности (устойчивости к действию препарата), когда для достижения предшествующего антиангинального (противоишемического) и гемодинамического эффекта требуется увеличение дозы, а иногда и частоты приемов.



Побочные действия



- При применении препаратов нитроглицерина часто возникает преходящая головная боль,
- Возможны головокружение,
- Понижение артериального давления (особенно при вертикальном положении),

А при передозировке -ортостатический коллапс (резкое падение артериального давления при переходе из горизонтального в вертикальное положение).

Следует избегать попадания растворов нитроглицерина на кожу, так как препарат может всосаться и вызывать головную боль.

Противопоказания

- ❑ Кровоизлияние в мозг,
- ❑ Повышенное внутричерепное давление, выраженная гипотензия (пониженное артериальное давление),
- ❑ А также закрыто угольная форма глаукомы (повышенное внутриглазное давление).
- ❑ При открыто угольной форме глаукомы нитроглицерин не противопоказан.




Форма выпуска

- ❑ 1 % раствор нитроглицерина в спирте во флаконах по 5 мл;
- ❑ таблетки, содержащие по 0,0005 г (0,5 мг) нитроглицерина,
- ❑ в стеклянных трубках по 40 штук; 1% раствор в масле в капсулах (шарообразной формы, красного цвета) по 0,5 и мг в упаковке по 20 штук.



Список аналогов Нитроглицерина.

- Нитроглицерол,
 - Ангинин,
 - Ангисед,
 - Глицерил тринитрат,
 - Нитрангин,
 - Нитроглин,
 - Нитростат,
 - Тринитрин,
 - Тринитроглииерол,
- Ангибид,
Ангиолингвал,
Ангорин,
Миоглицерин,
Нитрокардиол,
Нитроминт,
Нитрозелл,
Тринитрол.
- 

Фармакологическая группа

- Сердечно-сосудистые лекарственные средства
 - Лекарственные средства, улучшающие кровоснабжение органов и тканей.
 - Лекарственные средства, улучшающие кровоснабжение и метаболизм миокарда.
 - Нитраты и нитриты.
- 