


# Строение атома

## Опыты

### Резерфорда

Урок физики  
в 11 классе



Гипотеза о том, что вещества состоят из большого числа атомов, зародилась свыше двух тысячелетий назад.



- Позиция Демокрита:  
«Существует предел деления – атом».



- Позиция Аристотеля:  
« Делимость вещества бесконечна».

**Конкретные представления о строении атома развивались по мере накопления физикой фактов о свойствах вещества.**

**1897 г - Дж. Дж. Томсон доказал существование электрона, измерил его заряд и массу.**

**1897 г - В. Вебер впервые высказал мысль об электронном строении атома ( электроны входят в состав атома).**


**1905 г - Ф. Линдеман утверждал, что атом кислорода имеет форму кольца, а атом серы- форму лепешки.**

**1903-1904 гг - Дж. Дж. Томсон предложил модель атома в виде положительно заряженного шара, в котором «плавают» электроны.**

## Модель строения атома Томсона

- Атом – шар, по всему объёму которого равномерно распределён положительный заряд.
- Внутри шара находятся электроны.
- Каждый электрон может совершать колебательные движения около своего положения равновесия.
- Положительный заряд шара равен по модулю суммарному заряду электронов, поэтому заряд атома в целом равен нулю.

# Модель атома Томсона



## **Модель Томсона нуждалась в экспериментальной проверке.**

Важно было убедиться, действительно ли положительный заряд распределён по всему объёму атома с постоянной плотностью.

В 1909г. Эрнест Резерфорд совместно со своими сотрудниками Г. Гейгером и Э. Марсденом провёл ряд опытов по исследованию состава и строения атомов.

## Резерфорд Эрнест (1871–1937)

— английский физик, основоположник ядерной физики. Его исследования посвящены атомной и ядерной физике, радиоактивности.

Своими фундаментальными открытиями в этих областях заложил основы современного учения о радиоактивности и теории строения атома.

В 1899 г. открыл альфа - и бета-лучи. Вместе с Ф. Содди в 1903 г. разработал теорию радиоактивного распада и установил закон радиоактивных превращений. В 1903 г. доказал, что альфа-лучи состоят из положительно заряженных частиц. Предсказал существование трансурановых элементов.

В 1908 г. ему была присуждена Нобелевская премия.



## Идея опыта Резерфорда:

- Зондировать атом альфа-частицами.
- Альфа-частицы возникают при распаде радия.
- Масса альфа-частицы в 8000 раз больше массы электрона.
- Электрический заряд альфа-частицы в 2 раза больше заряда электрона.
- Скорость альфа-частицы около 15 000 км/с.
- Альфа-частица является ядром атома гелия.



# Схема опыта Резерфорда по рассеянию $\alpha$ - частиц.




Рисунок с сайта [www.college.ru](http://www.college.ru)

# Схема опыта Резерфорда



Скорость  $\alpha$ - частиц -  $1/30$  скорости света в вакууме




Радиоактив  
ное  
вещество





Фольг  
а




На  
экране



# ОПЫТ РЕЗЕРФОРДА



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



## **Опыты показали:**

**Подавляющая часть альфа-частиц проходит сквозь фольгу практически без отклонения или с отклонением на малые углы;**

**Некоторая небольшая часть альфа-частиц при прохождении через фольгу отклоняется на значительные углы ( 90,120,150 градусов);**

**Обнаружилось, что некоторые  $\alpha$ -частицы отклонялись на большие углы, до  $180^\circ$ .**

Резерфорд понял, что такое отклонение возможно лишь при встрече с положительно заряженной частицей большой массы. Малая вероятность отклонения на большие углы говорила о том, что эта положительная частица имеет малые размеры, порядка  $\approx 10^{-14}$  м.

Электроны, по Резерфорду, движутся вокруг ядра.

Оказалось, что радиус ядра  $R \approx (10^{-14} \div 10^{-15})$  м и зависит от числа нуклонов в ядре.

## Выводы из опытов:


- Положительный заряд сосредоточен в малой части атома – ядре;
- Практически вся масса атома сосредоточена в этом ядре;
- Отклонения альфа-частиц на большие углы происходят в результате столкновения альфа – частиц с ядром одного из атомов;
- Теоретические расчеты позволили оценить размеры ядер атомов – порядка  $10^{-14}$  м, тогда как размеры атома в 10 000 раз больше.

**На основе выводов из опытов Резерфордом была предложена планетарная модель атома**



**Конец XIX - начало XX века**

# Строение атома по Резерфорду





# Недостатки атома Резерфорда

1. **Эта модель не согласуется с наблюдаемой стабильностью атомов.** По законам классической электродинамики вращающийся вокруг ядра электрон должен **непрерывно** излучать электромагнитные волны, а поэтому терять свою энергию. В результате электроны будут приближаться к ядру и в конце концов упадут на него.
2. **Эта модель не объясняет наблюдаемые на опыте оптические спектры атомов.** Оптические спектры атомов не непрерывны, как это следует из теории Резерфорда, а состоят из узких спектральных линий, т.е. атомы излучают и поглощают электромагнитные волны лишь определенных частот, характерных для данного химического элемента.



**К явлениям атомных масштабов законы классической физики неприменимы.**

Желаю удачи в изучении физики!

