

ОТЧЕТ О РЕШЕНИИ ЗАДАЧ

студента 1 курса 1041 группы

Макеев Михаил Владимирович

Задача 1

Условия задачи 1

Колебательный контур состоит из емкости $C = 16$ нФ и индуктивности $L = 160$ мкГн. В начальный момент времени напряжение на емкости составляет $V = 10$ В, а ток в цепи отсутствует. Каковы зависимости от времени напряжения на ёмкости и тока через индуктивность? Чему равно максимальное значение заряда на конденсаторе?

Так как в начальный момент времени $V_0 \neq 0, I_0 = 0$, то:

$$V_T = V_0 = 10$$

$$V = V_m * \cos(\omega t)$$

$$I = I_m * \sin(\omega t)$$

По формуле Томсона:

$T = 2\pi\sqrt{LC}$, тогда:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1,6*10^{-8}*1,6*10^{-4}}} = 6,25 * 10^5 \text{ Гц}$$

$$V = 10 * \cos(6,25 * 10^5 t) \quad B$$

По закону сохранения энергии:

$$\frac{L * I_m^2}{2} = \frac{C * U_m^2}{2}$$

Откуда можно найти I_m :

$$I_m^2 = \frac{C * U_m^2}{L}$$

$$I_m = U_m * \sqrt{\frac{C}{L}} = 10 * \sqrt{\frac{1,6 * 10^{-8}}{1,6 * 10^{-4}}} = 0,1 \text{ A}$$

А после выразить I:

$$I = I_m * \sin() + 0,1 * \sin(6,25 * 10^5 t) \text{ A}$$

Формула ёмкости конденсатора:

$$C = \frac{q_m}{U_m}$$

Из формулы (7) нужно выразить q:

$$q_m = C * U_m = 1,6 * 10^{-8} * 10 = 160 \text{ нКл}$$

Задача 2

Условия задачи 2

К наклонной стенке, составляющей малый угол α с вертикалью, подвешен на невесомой нерастяжимой нити тяжелый шарик. Его отвели на малый угол β_0 , больший α , и отпустили. Удары шарика о стенку таковы, что отношение кинетической энергии шарика сразу после удара к кинетической энергии шарика перед ударом равно k ($0 < k < 1$). Определите последовательность максимальных отклонений шарика влево. Что произойдет с максимальным углом отклонения через очень большое время?

Пусть длина нити l , масса шарика m . Тогда потенциальная энергия шарика при максимальном отклонении влево составляет $U = 2mgl\sin^2(\frac{\beta}{2})$, а вправо $U = 2mgl\sin^2(\frac{\alpha}{2})$, или, учитывая малость углов α и β , $U = \frac{mg\beta^2}{2}, U = \frac{mg\alpha^2}{2}$. Тогда после первого удара о стенку шарик будет иметь энергию $U_1 = \frac{mgl(\beta^2 - \alpha^2)}{2}$ и после этого шарик отклонится влево на такой угол β_1 , что $\frac{mgl\beta_1^2}{2} = U_1$, т.е. $\beta_1^2 = k\beta_0^2 + (1 - k)\alpha^2$.

Проводя аналогичные рассуждения для второго, третьего и последующих ударов, несложно получить общую формулу: $\beta_n = \sqrt{k^n\beta_0^2 + (1 - k^n)\alpha^2}$. Видно, что $\beta_n \rightarrow \alpha$ при $n \rightarrow \infty$ за исключением случая абсолютно упругого удара ($k=1$), при котором $\beta_n = \alpha$ при всех n .

Также можно заметить, что при $n \rightarrow \infty, k \rightarrow 0$ из чего следует вывод, что и $\beta \rightarrow 0$. Соответственно максимальный угол отклонения через очень большое время будет бесконечно мал.

Задача 3

Условия задачи 3

Если отклонить в поперечном направлении конец зажатой с одной стороны упругой линейки и отпустить его, возникнут свободные поперечные колебания. Наименьшая циклическая частота таких колебаний определяется свойствами материала линейки - модулем Юнга E и плотностью ρ - и геометрическими размерами её свободного конца. Из эксперимента можно определить, что указанная частота обратно пропорциональна квадрату длины конца линейки l , а от ширины линейки b не зависит. Определите остальные показатели степеней в указанной зависимости.

Для решения используем метод размерностей:

$$\omega = E^\alpha * \rho^\delta * l^\gamma * h^\eta,$$

$$\text{где } [\omega] = \frac{1}{c} \quad [E] = Pa = \frac{H}{M^2} = \frac{KГ * \frac{M}{c^2}}{M^2} = \frac{KГ}{c^2 * M} \quad [\rho] = \frac{KГ}{M^3} \quad [l] = M \quad [h] = M$$

По условию: $\gamma = -2$, тогда:

$$\begin{aligned} [\omega] &= [E^\alpha * \rho^\delta * l^{-2} * h^\eta] \\ \frac{1}{c} &= \frac{KГ^\alpha}{c^{2\alpha} * M^\alpha} * \frac{KГ^\beta}{M^{3\beta}} * M^{-2} * M^\eta = \\ &= KГ^{\alpha+\beta} * c^{-2\alpha} * M^{-\alpha-3\beta-2+\eta} \end{aligned}$$

Определим показатели степеней:

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ -2\alpha = -1 \\ -\alpha - 3\beta - 2 + \eta = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = \frac{1}{2} \\ \beta = -\frac{1}{2} \\ -\eta = -\frac{1}{2} + 3\frac{1}{2} - 2 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = \frac{1}{2} \\ \beta = -\frac{1}{2} \\ \eta = 1 \end{cases}$$