
# \*КОЛЛАПС



#### \*КОЛЛАПС

Острая сосудистая недостаточность, при которой значительно уменьшается масса крови, циркулирующей в организме, и падает общий сосудистый тонус.

Коллапс сердца зачастую способен привести к смертельному исходу, поэтому так важно оказать первую медицинскую помощь.



### \*причины:

- \* 1. Большая потеря крови, которая может быть следствием разрыва какогонибудь внутреннего органа или серьёзными наружными травмами тела.
- \* 2. Резкое изменение положения тела у лежачего больного.
- \* 3. Пубертальный период у девочек.
- \* 4. Различные перенесённые инфекционные заболевания (например, сыпной тиф, дизентерия, сибирская язва, токсический грипп, вирусный гепатит или пневмония).
- \* 5. Интоксикация организма (например, передозировка различных лекарств или пищевое отравление).
- \* 6. Нарушения ритма сердца: инфаркт миокарда, тромбоэмболия лёгочных артерий, миокардит, гемоперикард.
- \* 7. Обезвоживание организма.
- \* 8. Сильный удар электрическим током.
- \* 9. Высокая температура окружающей среды: тепловой удар, например.
- \* 10. Сильные дозы ионизирующего излучения.

### \*признаки:

- \* 1. Самочувствие ухудшается очень внезапно.
- \* 2. Резкая головная боль.
- \* 3. Потемнение в глазах зрачки больного расширяются, шум в ушах.
- \* 4. Неприятные ощущения в области сердца.
- **\*** 5. Слабость.
- \* 6. Резкое снижение артериального давления.

\* 7. Кожные покровы моментально бледнеют, холоднеют и становятся влажными, а затем наблюдается цианоз (посинение кожных покровов).

- \* 8. Черты лица резко заостряются.
- \* 9. Нарушение дыхательного ритма: дыхание становится частым и поверхностным.
- \* 10. Пульс прощупать практически невозможно.
- \* 11. Низкая температура тела.
- \* 12. Возможна потеря сознания.
- \* 13. Больной покрывается липким потом.



## \*первая помощь:

- \* 1. Расположите больного следующим образом:
  - он должен лежать в горизонтальном положении на спине,
  - поверхность, на которой он лежит, должна быть жёсткая и ровная;
  - голова должна быть слегка согнута,
  - ноги должны быть слегка приподняты так вы обеспечите приток крови к головному мозгу.
- \* 2. Избавьте больного от узкой, стесняющей одежды расстегните все манжеты. пуговицы воротник, ремень.
- \* 3. Вызовите как можно скорее скорую помощь.
- \* 4. Обеспечьте больному приток свежего воздуха через открытое окно или балкон.
- \* 5. Согрейте больного, обложив его со всех сторон горячими грелками.
- \* 6. Дайте больному понюхать нашатырный спирт.
- \* 7. Если коллапс вызван большой кровопотерей, нужно как можно быстрее остановить кровотечение.
- \* 8. Обеспечьте больному полный покой.

