

Средства тормозящие свертывание крови

Выделяют

- Антикоагулянты прямого действия
- Антикоагулянты непрямого действия

Гепарин (Heparinum)

- **Показания к применению:** Применяют для профилактики и лечения различных тромбоземболических заболеваний и их осложнений: для предотвращения или ограничения тромбообразования при остром инфаркте миокарда, при тромбозах и эмболиях магистральных вен и артерий, сосудов мозга, глаза, при операциях на сердце и кровеносных сосудах, для поддержания жидкого состояния крови в аппаратах искусственного кровообращения и аппаратуре для гемодиализа, а также для предотвращения свертывания крови при лабораторных исследованиях.
- **Способ применения:** в/в

Гепарин (Heparinum)

- **Побочное действие:** Применяя гепарин, необходимо учитывать возможность развития геморрагии. Для предупреждения осложнений препарат следует вводить только в условиях стационара , при угрожающей гипокоагуляции (пониженной свертываемости крови) понизить дозу гепарина.
- В случае индивидуальной непереносимости и появления аллергических реакций немедленно прекращают введение гепарина, назначают десенсибилизирующие препараты, а при необходимости продолжения антикоагулянтной терапии назначают непрямые антикоагулянты.

Гепарин (Heparinum)

- **Противопоказания:** при повышенной кровоточивости, кровотечениях любой локализации (за исключением геморрагии при эмболическом инфаркте легкого или почек), подостром бактериальном эндокардите, тяжелых нарушениях функции печени и почек, острых и хронических лейкозах.

Амбенат (Ambenat)

- **Фармакологическое действие:** При местном применении препарат оказывает анальгетическое, противовоспалительное, сосудорасширяющее действие. Уменьшает отек, оказывает местное антитромботическое действие.
- **Показания к применению.** Невралгия, миалгия, заболевания суставов различного происхождения, последствия травм, ушибов, растяжение связок, вывих сустава.

Амбенат (Ambenat)

- **Способ применения и дозы.** Применяют только наружно. Тонкий слой мази наносят 2-3 раза в день и тщательно втирают.
- **Побочное действие.** Аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке).
- **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к препарату.

Венобене (Venobene)

- **Показания к применению.** Поверхностный тромбофлебит, флебит, перифлебит, геморрой, перианальная гематома, варикозное расширение вен, травмы, в том числе спортивные, с ушибами, растяжением связок, гематомами, миалгиями.
- **Способ применения и дозы.** Мазь обычно наносят 1-3 раза в день тонким слоем на пораженные участки, равномерно распределяя по поверхности кожи, слегка втирают без использования массирующих движений.

Венобене (Venobene)

- **Побочное действие.** Крайне редко гиперергические реакции в виде преходящей эритемы или изменения цвета участка кожного покрова.
- **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к препарату. Препарат не следует наносить на открытую раневую поверхность.
- **Втирание мази в кожу при остром глубоком флеботромбозе или подозрении на него не допускается** из-за возможности развития окклюзии сосуда отдельными сгустками крови..
- **Форма выпуска.** Мазь в тубах по 20, 40 и 100. г. 1 г мази содержит гепарина натрия 300 МЕ, декспантенола 0,05 г.

Гепальпан (Gepalpan)

- **Показания к применению.** Флебит и поверхностный тромбофлебит предварикозный синдром, постфлебический синдром, спортивные и другие травмы.
- **Способ применения и дозы.** Наносить тонким слоем 2-3 раза в день на пораженный участок кожи и легко втирать.
- **Побочное действие.** Возможны аллергические реакции.
- **Противопоказания.** Кровоточащие трофические язвы, кровотечения другой этиологии.

Гепариновая мазь (Unguentum Heparini)

- **Показания к применению.** Применяют наружно при поверхностном тромбофлебите конечностей, флебитах, после повторных внутривенных инъекций, тромбозе геморроидальных вен, язвах конечностей.
- **Способ применения и дозы.** Мазь наносят тонким слоем 2-3 раза в день и осторожно втирают в кожу. При остром воспалении геморроидальных вен мазью смазывают полотняную или бязевую ткань, которую накладывают на геморроидальные узлы или вводят ее с помощью тампона в задний проход.
- **Противопоказания.** При язвенно-некротических процессах, пониженной свертываемости крови, тромбопении.

Гепароид (Heparoid)

- **Показания к применению.** Поверхностные тромбофлебиты , язвы конечностей, гематомы.
- **Способ применения и дозы.** Слой мази наносят на пораженное место (и вокруг него) высотой 1 мм. Мазь слегка втирают в кожу и накрывают компрессной бумагой. Ежедневно или через день повязку меняют.
- **Противопоказания.** Геморрагический диатез гемофилия, тромбоцитопения.

Литион 1000 (Lioton 1000)

- **Показания к применению.** Тромбофлебиты поверхностных вен, флебиты в том числе при хронической варикозной болезни и варикозных язвах , осложнения после хирургических операций на венах; асептические инфильтраты и местные отеки; ушибы (в том числе, мышечной ткани, сухожилий, суставов); подкожные гематомы.
- **Способ применения и дозы.** Втирающими движениями 3-10 см геля наносят на пораженный участок кожи 1 -3 раза в сутки.
- **Побочное действие.** Возможны местные реакции повышенной чувствительности.
- **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к препарату. С осторожностью препарат применяют при геморрагических процессах .Препарат не следует наносить на открытые раны, на слизистые оболочки. Не следует применять при наличии гнойных процессов.

Спасибо за внимание!

