

6.7. ПРИЗНАКИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРЕДЕЛА

Теорема 1.

Если числовая последовательность

$$\{a_n\}$$

*монотонна и ограничена, то она имеет
предел.*

Возможны два случая:

1

Последовательность не убывает и ограничена сверху:

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq M$$

2

Последовательность не возрастает и ограничена снизу:

$$m \geq a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n$$

Теорема 2.

Если в некоторой окрестности точки x_0 (или при достаточно больших значениях x) функция $f(x)$ заключена между двумя функциями $\varphi(x)$ и $\psi(x)$, имеющими одинаковый предел, равный A , то функция $f(x)$ имеет тот же предел A .

Доказательство:

Пусть при $x \rightarrow x_0$
существуют пределы

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = A$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = A$$

Следовательно, для любого, сколь угодно малого числа $\varepsilon > 0$, найдется такое положительное число δ , что при всех x , таких что $|x - x_0| < \delta$, одновременно выполняются неравенства:

$$|\varphi(x) - A| < \varepsilon$$

$$|\psi(x) - A| < \varepsilon$$

или $A - \varepsilon < \varphi(x) < A + \varepsilon$, $A - \varepsilon < \psi(x) < A + \varepsilon$

Т.к. по условию функция $f(x)$ заключена между функциями $\varphi(x)$ и $\psi(x)$, то

$$A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$$

Т.е.

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

А это и означает по определению предела функции в точке, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

