

СИМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД

Численные методы решения линейной распределительной задачи требуют преобразования неравенств в равенства

$$\text{Токарная обработка } 40x + 25y \leq 1000$$

$$\text{Сверловка } 35x + 28y \leq 980$$

$$\text{Шлифовка } 25x + 35y \leq 875$$


Неравенства преобразуются в уравнения путем введения *свободных переменных* u , v и w . Эти переменные представляют собой разность между левой и правой частями неравенств. Таким образом, имеем:

$$40x + 25y + u = 1000$$

$$35x + 28y + v = 980 \quad (1)$$

$$25x + 35y + w = 875$$

Свободные переменные u , v и w должны быть неотрицательными.



В рассматриваемом многоугольнике ОАВС в любой вершине две из пяти переменных (x, y, u, v, w) равны нулю, а остальные три больше нуля.

В общей задаче, содержащей n переменных и m ограничений в виде неравенств, требуется m свободных переменных и решение, максимизирующее принятый критерий оптимальности, из общего числа $m + n$ переменных, включая свободные, содержит точно m ненулевых значений.

Набор значений переменных, удовлетворяющих ограничениям, из которых m отличны от нуля, а n равны нулю, называется **допустимым решением или опорным планом**.

Вычисления начинаются с отыскания допустимого решения. Далее производится проверка, показывающая, является ли решение оптимальным. Если устанавливают, что это не так, то отыскивают улучшенное допустимое решение, причем эта вычислительная схема повторяется до тех пор, пока не обнаруживают, что дальнейшее улучшение решения невозможно.

Алгоритм можно разбить на четыре шага.

1.Очевидным допустимым решением системы

$$40x + 25y + u = 1000$$

$$35x + 28y + v = 980 \quad (1)$$

$$25x + 35y + w = 875$$

является следующий набор значений переменных:

$$x = y = 0, \quad u = 1000, \quad v = 980 \quad \text{и} \quad w = 875.$$

Это решение можно изменить, увеличив либо x , либо y .

Из целевой функции $Z = 1,20x + 1,40y$ видно, что *скорость* возрастания Z при увеличении x равна 1,2 и 1,4 при увеличении y .

Поэтому целесообразно увеличить y .

2. Увеличение y приведет к уменьшению u , v и w , так что y можно увеличивать лишь до тех пор, пока одна из переменных u , v или w не станет равной нулю.

Из системы уравнений

$$40x + 25y + u = 1000$$

$$35x + 28y + v = 980 \quad (1)$$

$$25x + 35y + w = 875$$

ясно, что в первом уравнении $u = 0$,

когда $y = 40$,

во втором — что $v = 0$ при $y = 35$ и в

третьем —

что $w = 0$ при $y = 25$.

Таким образом, u можно увеличить только до 25, что даст $u = 375$, $v = 280$ и $w = 0$. Эти расчеты выполнить очень просто в силу следующих причин:

- а) Z не содержит ненулевых переменных u , v и w :**
- б) каждое из уравнений системы содержит в точности одну ненулевую переменную u , v или w , и коэффициенты при каждой из них равны единице.**

Изменим теперь **Z** и уравнения (1) так, чтобы выполнялись условия а) и б) для новых значений ненулевых переменных **y**, **u** и **v**.

Третье уравнение системы (1) является единственным, содержащим переменную **w**, ставшую равной нулю. Разделив это уравнение на 35, т. е. на коэффициент при новой ненулевой переменной **y** получаем:

$$5/7X + Y + W/35 = 25 \quad (2)$$

Вычтем далее умноженное на соответствующие множители (25 и 28) уравнение (2) из остальных уравнений системы (1), чтобы исключить из них u .
Имеем:

$$155/7X + U + 5/7 W = 375 \quad (3)$$

$$15X + V - 4/5 W = 280 \quad (4)$$

Но из (2) получаем $5/7 x + y + (W/35) - 25 = 0$.

Следовательно, если вычтуть кратные этому выражению величины из Z , то Z не изменится.

Если же вычтуть из Z это выражение, предварительно умножив его на 1,4, то тем самым будет исключена переменная u .

Следовательно, $Z = 0,2x - 0,04W + 35$.

Очевидно, что из двух нулевых переменных x и w только x может увеличивать значение Z при увеличении от нуля.

Чтобы определить, насколько можно увеличить x , разделим коэффициенты при x в (2), (3) и (4) на постоянные, стоящие в правой части.

Получаем 35 , $16 \cdot 29/31$ и $18 \cdot 2/3$.

Увеличение значения x до $16 \cdot 29/31$ приведет к уменьшению U до нуля при $y = 12 \cdot 28/31$ и $V = 25 \cdot 30/31$.

Разделив (2) на коэффициент при x и перенеся постоянную в левую часть, получим:

$$X + 7/155 U + W /31 - 16 \cdot 29/31 = 0 \quad (5)$$

Если вычесть (5), обе части которого умножены на 0,2 из

$$Z = 0,2x - 0,04W + 35,$$

то получим

$$Z = - 1,4/155 U - 26/755W + 38 \cdot 12/31$$

Отсюда можно сделать вывод, что увеличение любой переменной **U** или **W** приведет только к уменьшению **Z**.

Следовательно, максимальное значение **Z** найдено и равно

38•12/31

Решение оптимизационной задачи в табличной форме

Составим таблицу (табл. 1), в которой строки, обозначенные P_3 , P_4 и P_5 , соответствуют первому набору значений ненулевых переменных u , v и w . Столбцы, обозначенные P_1 , P_2 , P_3 , P_4 и P_5 , соответствуют переменным x , y , u , v и w . Добавим еще один столбец P_0 соответствующий постоянным (правым частям) уравнений, и строку Δ , в которой проставлены коэффициенты функции Z .

	$P_1 X$	$P_2 Y$	$P_3 U$	$P_4 V$	$P_5 W$	P_0
$P_3 U$	40	25	1	0	0	1000
$P_4 V$	35	28	0	1	0	980
$P_5 W$	25	35	0	0	1	875
Δ	1,2	1,4				

- Таблица полностью определяет уравнения

$$Z = 1,20 x + 1,40 y \text{ и}$$

$$40x + 25y + u = 1000$$

$$35 x + 28 y + v = 980 \quad (1)$$

$$25 x + 35 y + w = 875$$

- Пустые клетки таблицы соответствуют нулям.
- Используя таблицу 1, можно вновь применить алгоритм из четырех шагов, соответствующих только что выполненным вычислениям.

1. Выбрать столбец с наибольшим положительным элементом в строке A. В данном случае это столбец P_2 с элементом 1,4.

2. Разделить *положительные* элементы в выбранном на шаге 1 столбце на соответствующие элементы столбца P_0 и выбрать наименьший результат. В этом примере выбран столбец P_2
Результаты деления по строкам следующие:
для P_3 — $1000/25 = 40$, для P_4 — $980/28 = 35$ и
для P_5 — $875/35 = 25$. Поэтому выбирается строка P_5

3. Разделить строку, выбранную на шаге 2, на наибольший элемент столбца, выбранного на шаге 1, и обозначить результат символом этого столбца. В этом примере элементы строки P_5 делятся на 35 и результат получает обозначение P_2 .
Это дает:

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_0
P_2	5/7	1			5/7	25

4. Исключить элементы всех строк (включая строку Δ)

кроме строки, измененной на шаге 3, вычитая умноженную на соответствующие множители строку, полученную на шаге 3, которой приписано новое обозначение. Если все элементы получающейся в итоге строки A отрицательны или равны нулю, то оптимальное решение найдено. В противном случае нужно вернуться к шагу 1.

В рассматриваемом примере строка P_2 умножается на 25 и результат вычитается из строки P_3 . Аналогичную операцию мы производим над строками P_4 (предварительно умножая P_2 на 28) и Δ (предварительно умножая P_2 на 1,4). В результате получается табл. 3

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_0
P_2	5/7	1			1/35	25
P_3	155/7		1	1	- 5/7	375
P_4	15				- 4/5	280
Δ	1/5				- 1/25	

Константа, получаемая при исключении переменной из строки Δ на последующих шагах, не нужна, и поэтому ее обычно опускают.

Поскольку в строке Δ еще имеется положительный элемент, необходимо вернуться к шагу 1 и повторить все шаги алгоритма. В результате получаем табл. 4

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_0
P_1	1		$7/155$		$- 1/31$	$16 \cdot 29/31$
P_2		1	$- 1/31$		$8/155$	$12 \cdot 28/31$
P_4			$- 21/31$	1	$- 49/155$	$25 \cdot 30/31$
Δ			$- 1,4/155$		$- 26/775$	

Вследствие того что оба элемента строки Δ теперь отрицательны, приходим к выводу, что при $P1 = x = 16 \cdot 29/31$ и $P2 = y = 12 \cdot 28/31$

достигается максимум Z .

Отметим, что шаг 2 описанной табличной модификации алгоритма нереализуем, если в выбранном на первом шаге столбце нет ни одного положительного элемента (кроме элемента строки Δ). В этом случае переменную, выбранную на шаге 1, можно, не нарушая ограничения, увеличивать до бесконечности. Когда исходные данные соответствуют реальной задаче, это обычно означает, что-либо реальная задача нелинейная, либо пропущено какое-то ограничение.