

**РОЛЬ БИОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.**

**МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОГО.**

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

- 1. Биология – естественная наука о жизни. Роль биологии в системе медицинского образования.**
- 2. Свойства и признаки живых организмов, уровни организации живого.**
- 3. Организация наследственного материала у неклеточных форм, про- и эукариот.**
- 4. Нуклеиновые кислоты. Строение ДНК. Аутосинтетическая функция - репликация ДНК, гетеросинтетическая - синтез белка. Правила Чаргаффа.**
- 5. Строение РНК и её виды. Синтез и-РНК, его этапы.**
- 6. Ген – фрагмент геномной нуклеиновой кислоты. Свойства генов и их функции.**
- 7. Генетический код и его свойства. Кодирование генетической информации.**

Биология - наука о жизни, которая изучает жизнь как особую форму движения материи, законы ее существования и развития.


Предметом биологии являются живые организмы, их строение, функции, а также природные сообщества организмов.

Термин "биология" впервые был предложен Ж.Б.Ламарком в 1802 году, и происходит от двух греческих слов: *bios* - жизнь, *logos* - наука.

К биологии относятся дисциплины:

- а) морфологические - анатомия, гистология;**
- б) физиологические - физиология клетки, животных, растений;**
- в) общебиологические - цитология, генетика, эволюционное учение и т.д.;**
- г) экологические - биогеография, паразитология;**
- д) пограничные - биохимия, биофизика, антропология.**

ЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА БИОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА.



***Познание сущности жизни –
одна из основных задач
современной биологии.***

Свойства живого:

- 1. Саморегуляция.**
- 2. Самообновление.**
- 3. Самовоспроизведение.**

Признаки живого:

- 1. Обмен веществ и энергии.**
- 2. Структурная организация.**
- 3. Дискретность и целостность.**
- 4. Репродукция.**
- 5. Наследственность и изменчивость.**
- 6. Рост и развитие.**
- 7. Раздражимость и движение.**
- 8. Внутренняя регуляция и гомеостаз.**

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОГО:

- 1. Молекулярно–генетический.**
- 2. Клеточный.**
- 3. Онтогенетический.**
- 4. Популяционно–видовой.**
- 5. Биосферно –
биогеоценотический.**

Молекулярно-генетический уровень организации живого связан с хранением и воспроизведением потока информации в меняющихся поколениях клеток и организмов.

В этом процессе участвуют:


- ✓ ДНК ядра и цитоплазмы**
- ✓ молекулы и-РНК**
- ✓ молекулы т-РНК**
- ✓ рибосомы**
- ✓ ферменты активации аминокислот**

Организация наследственного материала у неклеточных форм, про- и эукариот.

Наследственный материал вирусов представлен дву- или одноцепочечной молекулой ДНК, или РНК.

Наследственный материал прокариот (а) представлен голой кольцевой молекулой ДНК.

Наследственный материал эукариот (б) состоит из нуклеопротеидов (хроматина или хромосом) главными компонентами которых являются ДНК и два типа белков – гистоновых (основных) и негистоновых (кислых).



ДНК прокариот и эукариот отличаются:

- ✓ **по количеству ДНК,**
- ✓ **длиной молекулы ДНК,**
- ✓ **порядком чередования нуклеотидных последовательностей,**
- ✓ **формой укладки:**
 - у эукариот - линейная,**
 - а у прокариот - кольцевая.**

**ДНК - носитель
наследственной
информации**

**РНК - реализует
генетическую
информацию**

Включаются в состав:

✓ **хроматина ядра**

✓ **митохондрий**

✓ **пластид**

✓ **ядрышка**



✓ **матрикса**

цитоплазмы

✓ **рибосомы**

Схема моноклеотида.

Моноклеотид-структурная единица нуклеиновой кислоты



Правила Э. Чаргаффа

- 1. Количество аденина равно количеству тимина ($A=T$);**
- 2. Количество гуанина равно количеству цитозина ($G=C$);**
- 3. Количество пуринов равно количеству пиримидинов ($G+A=C+T$);**
- 4. Количество оснований с б-амино-группами равно количеству оснований с б-кетогруппами ($A+C=G+T$).**


Постулаты Дж.Уотсона и Ф.Крика

- 1. Каждая молекула ДНК состоит из двух длинных антипараллельных полинуклеотидных цепей, образующих двойную спираль, закрученную вокруг центральной оси.**
- 2. Каждый нуклеозид (пентоза + азотистое основание) расположен в плоскости, перпендикулярной оси спирали.**
- 3. Две цепи спирали скреплены водородными связями, образующимися между основаниями разных цепей.**



4. Спаривание оснований строго специфично по принципу комплементарности. Пуриновые основания соединяются только с пиримидиновыми: А:Т и Г:Ц.


5. Последовательность оснований одной цепи может значительно варьировать, но последовательность их в другой цепи должна быть комплементарна.



Принципы репликации:

- ✓ **комплементарности,**
- ✓ **антипараллельности цепей,**
- ✓ **прерывистости,**
- ✓ **полуконсервативности.**

Репликация - синтез ДНК.



Инициация - разрыв водородных связей с помощью ферментов и раскручивание цепей ДНК. **Элонгация** - удлинение цепи ДНК в результате последовательных соединений нуклеотидов. **Терминация** - синтез прекращается.

Молекула РНК образована 4 типами нуклеотидов: адениловый, гуаниловый, цитозилловый, уредилловый. Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания (пуринового Г, А или пиримидинового Ц, У), рибозы и остатка фосфорной кислоты.

Виды РНК:

- Рибосомальная**
- Транспортная**
- Информационная**

Все виды РНК синтезируются на ДНК.

Молекула ДНК разделена на участки, содержащие информацию о структуре белка - *гены* и неинформативные отрезки *спейсеры*, которые разделяют гены.

Спейсеры бывают различной длины и регулируют транскрипцию соседнего гена.


***Транскрибируемые* спейсеры копируются при транскрипции вместе с геном, и их комплементарные копии появляются на про-и-РНК.**

***Нетранскрибируемые* спейсеры - встречаются между генами гистоновых белков и -РНК и не копируются.**

И-РНК является копией не всей молекулы ДНК, а только части её - одного гена или группы генов одной функции. Такая группа генов называется *оперон*.

Оперон – единица транскрипции и генетической регуляции. Он включает **структурный ген(гены), несущий информацию о структуре белка и **функциональные** гены, управляющие работой структурных (промотор и терминатор).**

**Синтез иРНК идёт с одной нити ($3' \rightarrow 5'$)
двухцепочечной молекулы ДНК по
принципу комплементарности при
помощи фермента РНК-полимеразы.**




Процессинг про-иРНК:

Первичный транскрипт (про-иРНК) - длинный предшественник РНК, на который списывается полная информация с ДНК.

- 1. Модификация 5' и 3' концов РНК: кэпирование 5' и полиаденилирование 3' концов про-иРНК.**
- 2. Сплайсинг - укорочение первичного транскрипта путем вырезания неинформативных участков РНК (интронов) и сшивание информативных участков (экзонов) и образование зрелой иРНК.**

Схема сплайсинга у эукариот



Ген - это участок молекулы ДНК, детерминирующий синтез определенного полипептида.

Ген – характеризуется специфичной для него последовательностью нуклеотидов.

Ген представляет единицу функции, отличную от функции других генов.

**Генетический код - система
расположения нуклеотидов
в молекулах нуклеиновых
кислот, контролирующая
последовательность
расположения аминокислот
в молекуле полипептида.**

Основные постулаты кода:

1. Генетический код **триплетен**. Три нуклеотида шифруют одну аминокислоту. Триплет и-РНК получил название кодона.
2. Генетический код является **вырожденным**. Аминокислота шифруется более чем одним кодоном (от 2 до 6), кроме метионина и триптофана.
3. Код **однозначен**. Кодон шифрует одну аминокислоту.
4. Кодоны **не перекрываются**. Нуклеотидная последовательность считывается в одном направлении подряд, триплет за триплетом.

- 5. Метиониновый кодон - АУГ является стартовым.**
- 6. Внутри гена нет знаков препинания - стоп кодонов: УАГ, УАА, УГА. Они встречаются в конце генов.**
- 7. Генетический код *универсален*. Система записи наследственной информации одина для всех организмов.**

Спасибо за внимание.