


История развития психопатологии в зарубежных странах

ВЫПОЛНИЛА: МАКСИМОВА ДАРЬЯ СТУДЕНТКА ГРУППЫ 2-СУРДО
РУКОВОДИТЕЛЬ: БУЛГАКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА




Общая психопатология – раздел психиатрии, который занимается изучением отдельных проявлений психических расстройств (симптомов и синдромов).

Выделение и квалификация симптомов представляет собой начальный уровень психиатрической диагностики.

Общая психопатология зародилась в конце 18 века в учении о психических болезнях итальянского психиатра Киаруджи, первым высказавшем мысль о едином психозе.

Основателем общего учения о психических болезнях был выдающийся психиатр Гризингер – середина 19 в., знаменующего собой вершину развития психиатрии. Он говорил о рефлексорной природе психической деятельности.

Следующий этап в развитии общей психопатологии связан с деятельностью английского психиатра Модсли, который применил эволюционный метод Дарвина. Одним из самых важных его утверждений было: клиническая картина психоза зависит не только от особенностей внешних вредностей, но внешние вредности вызывают психоз через внутренние условия деятельности головного мозга.






Большая заслуга Гривингера в том, что он показал, что для познания природы психоза нужно отправляться от психологических явлений в глубину, исследовать психические функции физиологически. Кальбаум писал, что любой симптом психического заболевания относится к особым явлениям природы и при них страдает вся деятельность мозга. Галлюцинации и даже сенестопатии - не есть заболевание только одной какой-нибудь функции. При сенестопатии изменяется не только ощущение, но и отношение субъекта к внешнему миру, изменяется его аффект, его мышление.


Дальнейшее развитие общего учения о психозах связано Мейнертом, Вернике, а также Джексоном. Однако в работах этих трех крупных авторов вы уже не встретите высказываний Гривингера о рефлекторной природе психической деятельности. Психическая деятельность рассматривается ими не как результат соотношения мозга с внешней средой, а как продукт мозговой деятельности. Так, Вернике, занимаясь сейюнкцией, трактует ее как результат возбуждения или перерыва сенсомоторной рефлекторной дуги.

В начале XIX века представители «Психической школы» — И. Гейнрот (1773—1843), рассматривавший религиозную мораль как причину психических расстройств, В. Иделер (1795-1860), отстаивавший в этом качестве чистую мораль, Бенекке (1789-1854), видевший в крайнем психологизме ответ на вопрос об этиологии психических расстройств, и др. — этиологию психических расстройств сводили к психическим факторам.





Первые серьезные экспериментальные исследования психических процессов связаны с именем немецкого врача и физиолога Вильгельма Вундта (1832-1920), открывшего в 1879 г. в Лейпцигском университете психологическую лабораторию.



В конце XVIII — начале XIX века буржуазная революция во Франции провозгласила защиту прав человека. В соответствии с гуманистическими идеалами того времени Ф. Пинель (1745—1826) в Париже начал превращать полутюремные убежища для сумасшедших в медицинские учреждения для душевнобольных. Одно из важных его нововведений на пути превращения последних из отвергаемых обществом монстров в ранг больных — ликвидация цепей. Все же в обиходе больниц оставались смирительные рубашки и другие меры стеснения больных. Продолжил борьбу с ограничениями свободы больных британский психиатр Д. Конол-ли (1794—1866). В Англии он ввел режим нестеснения психических больных, который оказал большое влияние на создание более гуманного отношения к пациентам психиатрических больниц во всем мире. В начале XX века в развитии общей психопатологии происходит поворот в сторону психологии, исследованиями мозга психопатологи перестают интересоваться. В психопатологии начинают занимать главенствующее место чисто психологические исследования психических расстройств и идеалистическая

философия этих направлений.



Спасибо за
внимание!