

Рецидивирующие афты полости рта (афтозный стоматит)

- ▶ Степени тяжести
- ▶ Легкая
 - ▶ Обострения 1 раз в несколько лет,
 - ▶ Локализация, как правило, в передней части ротовой полости.
- ▶ Среднетяжелая
 - ▶ Обострения 1-3 раза в год.
 - ▶ Проходят за 7-9 дней.
 - ▶ Локализация чаще в передних отделах ротовой полости.
- ▶ Тяжелая
 - ▶ 4 и более обострения в год;
 - ▶ Локализация: передние отделы ротовой полости, твердое и мягкое небо, щеки, дужки.



Рецидивирующие афты полости рта (афтозный стоматит)

- ▶ Диагностика: клинически
- ▶ Консультации специалистов: стоматолога, проведение окклюзиограммы*.
- ▶ Лечение: ретинол, солкосерил.
- ▶ Гигиена полости рта! В легких-среднетяжелых случаях продолжить чистку зубов щеткой. В тяжелых - использовать салфетки.



Симптом
рецидивирующих афт
в полости рта у детей.

О.П. Максикмова

Журнал «Клиническая
Стоматология»
2001-2-58



Рис. 3. Фрагмент окклюдзограммы в полости рта и на бумаге



Рис. 4. Окклюдзограмма. Отсутствуют контакты во фронтальном участке, что свидетельствует о нарушении функции откусывания