


Final task

Необхідно розробити презентацію на Cobalt фреймворку.


Матеріали для завдання (оновлені):

<https://cloud.viseven.com/s/XcnA0Cely0knvOx>


Inputs




Epidemiology




Blank




Blank



Blank




Blank




Blank


Visuals




Sequences




Treated patients



Blank



Структура презентації




Структура презентації




Структура презентації


Outcomes



Clinical effects



Blank




Blank



Blank




Blank




Blank

References



Blank




Blank




Blank



Blank




Blank



Blank

Hidden chapter



Assumptions

Порожній слайд. Достатньо створити, і додати загальні стилі

Main menu navigation (component)

Для навігації по презентації повинне бути реалізоване меню. Для цього потрібно розробити відповідний компонент. Опис компоненту - на наступному слайді.

Inputs

Visuals

Outcomes

References

Assumptions

Treatment combinations^{4, 26, 29, [b], [f]}

	Lenalidomide + dexamethasone	Bortezomib + dexamethasone	Bendamustine + steroids	Pomalidomide + dexamethasone
	Drug list	Drug list	Drug list	Drug list
cost factor				
Treatment duration (trials)				
2nd line ^[e]	110.029541785132	64.3922886583441	32.3661044103515	28.144438617697
3rd line ^[e]	115.656052444599	52.5140994883583	28.6483762010544	24.9116314791777
4th line ^[e]	92.5248419556789	52.5140994883583	26.3521323070768	22.9148976583276

[b] ASPIRE Clinical Study Report (CSR), 2015
 [e] Adjustment factors to estimate efficacy outcomes by line are based on data from ASPIRE. Adjustment factors were derived from the Rd arm in ASPIRE trial through calculating ratios of the median PFS of each line subgroup versus the median PFS of the overall relapsed MM population. Mean PFS and/or treatment duration by line for Kd, KRd, lenalidomide + dexamethasone and bortezomib + dexamethasone are based on data from the ASPIRE and ENDEAVOR clinical study reports, respectively, without any adjustment by line other than conversion from reported median months to mean weeks.
 [f] ENDEAVOR Clinical study report (CSR), 2016

Patients initiating treatment

2017

Sequences

Treated patients

Cohorts

Outcomes

References

Assumptions

Legend:
 ■ Included in budget impact
 ■ Includes Kyprolis®

Flowchart Data:


- 1st line: Non-K 4 947 (Total: 4 947)
- 2nd line: Kd 76 (3%), Non-K 2 861 (95%) (Total: 3 027)
- 3rd line: Non-K 42, Kd 116 (7%), KRd 17 (1%), Non-K 1 530 (92%) (Total: 1 757)
- 4th line: Non-K 20, Non-K 16, Non-K 43, Non-K 6, Kd 17 (3%), KRd 0 (0%), Non-K 561 (97%) (Total: 664)
- 5th line: Non-K 1, Non-K 1, Non-K 3, Non-K 0, Non-K 1, Non-K 0, Non-K 37 (Total: 44)

Note: Retreatment with Kd or KRd is not possible.

Main menu navigation (component)

Функціональність компонента меню:

1. Меню має двохрівневу структуру:
 - a. Перший рівень - чаптери
 - b. Другий рівень - слайди
2. По кліку на пункт першого рівня, він повинен розкритись (з анімацією).
3. По кліку на пункт другого рівня, повинен відбутись перехід на відповідний слайд.
4. Якщо в чаптері міститься лише один слайд ("References", "Assumptions"), то по кліку на пункт першого рівня, повинен відбутись перехід на цей слайд.



Слайд з анімацією.

Назва дизайну: frontpage.psd

Розкадровка анімації : Screens/Frontpage- animation steps

Country characteristics

Sequences	Value
Treated patients	France
Cohorts	2016

Outcomes: € \$ £

Myeloma patients

Base patient numbers on: Direct input

Treatment free intervals

Treatment free interval after:	Weeks
diagnosis	6
1st line	63
2nd line	31
3rd line	19
4th line	6

Patient characteristics


Variable	Value
Average Body Surface Area (m ²)	1,8
Average body weight (kg)	72,0

Слайд з вхідними даними для калькуляцій.

Назва дизайну: slide2.psd

Калькуляції: Calculations/Task-3.xlsx

Вкладка Country characteristics




Clinical effects				
		Overall response	Complete response	Median PFS (weeks)
Treated patients		77,0%	11,0%	96
Cohorts		87,1%	31,8%	114
Outcomes	amethasone	66,7%	9,3%	77
References	hethasone	62,4%	6,2%	41
Assumptions	roids	31,0%	1,0%	17



Слайд з розрахунками калькуляцій.
 Назва дизайну: slide3.psd
 Калькуляції: Calculations/Task-3.xlsx
 Вкладка Clinical effects
 Результати рахуються (і перераховуються)
 відповідно із введеними значеннями на
 попередньому слайді

* Comparisons are assumed to be naïve compared to Kd and KRd regimen, given lack of direct head to head data or indirect treatment comparisons.



Слайд з розрахунками калькуляцій.

Назва дизайну: slide4.psd

Калькуляції: Calculations/Task-3.xlsx

Вкладка Total budget



Графіки повинні будуватися (та перебудовуватися) динамічно, відповідно зі змінами у розрахунках на попередніх слайдах




- Inputs
- Visuals
- Outcomes
- References
- Assumptions**

Patients initiating treatment

Year: 2017
 Proportion relative to diagnosis
 Patient numbers

 Included in budget impact
 Includes kyprolis



Статичний слайд
 Назва дизайну: slide5.psd

