


Внутрикостная или спонгиозная анестезия

Выполнили студенты группы 2-004
Стом: Акимжанов А.М., Елеулова М.С,
Исмагулов К.Н., Касымов А.А.




- Современная стоматология обладает значительным количеством средств для обезболивания зубов. Это связано как с появлением новейших местных анестетиков Современная стоматология обладает значительным количеством средств для обезболивания зубов. Это связано как с появлением новейших местных анестетиков, техник выполнения анестезии, так и с применением адьювантов к местным анестетикам Современная стоматология обладает значительным количеством средств для обезболивания зубов. Это связано как с появлением новейших местных анестетиков, техник выполнения анестезии, так и с применением адьювантов к местным анестетикам, которые усиливают





Иглы различных размеров, используемые при карпульной технологии. Крупным планом показана канюля с указанием скоса иглы.














Анестетики

- Существуют 3 формы выпуска

Ультракаина:

- ультракаин ДС форте (с концентрацией эpineфрина 1:100.000),
- ультракаин ДС (с концентрацией эpineфрина 1:200.000),
- ультракаин Д (без эpineфрина/адреналина).





SKANDINIBSA®

Мепивакаин
100 картриджей по 1,8 мл
для инъекций
Стерильно

Inibsa
LABORATORIOS



