

ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г.
ПЕТРОВСКОГО»**

Кафедра математического анализа, алгебры и геометрии
**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)**

по направлению 01.04.01. Математика, направленность (профиль)

Комплексный анализ и алгебра

на тему: «Исследование нормального строения конечных групп»

Выполнила:
Леонова Екатерина Сергеевна
студентка 2 курса 2 группы
Комплексный анализ и
алгебра

Научный руководитель:
Путилов Сергей Васильевич
к.ф.-м.н., доцент кафедры
математического анализа,
алгебры и геометрии

Брянск 2019 г

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из двух глав, в начале каждой главы дается краткий обзор рассматриваемых в ней вопросов и полученных основных результатов, заключения и списка литературы в количестве 27 наименований. Объем диссертации – 55 страниц.

Целью

диссертационного исследования является исследование нормального строения конечных групп, а также изучение конечных групп с заданными максимальными подгруппами и с некоторыми подгруппами простых индексов. При этом в диссертации решаются следующие задачи:

- изучение нормального строения конечных групп с некоторыми подгруппами простых индексов;
- изучение нормального строения конечных групп с заданными максимальными подгруппами;
- анализ и обобщение некоторых известных результатов о конечных группах с заданными максимальными подгруппами;
- доказательство новых свойств конечной группы, в которой ненормальные максимальные подгруппы нильпотентные или простые.

– подробное изложение в диссертации с доказательствами результатов из научных работ:

- В. С. Монахов, В. Н. Тютянов, “О конечных группах с некоторыми подгруппами простых индексов”, Сиб. матем. журн., 48:4 (2007), 833–836.
- В. С. Монахов, В. Н. Тютянов, “О конечных группах с заданными максимальными подгруппами”, Сиб. матем. журн., 55:3 (2014), 553–561.
- В. С. Монахов, “О разрешимости группы с перестановочными подгруппами”, Матем. заметки, 93:3 (2013), 436–441
- В. С. Монахов, И. К. Чирик, « О сверхразрешимости конечной факторизуемой группы с циклическими силовскими подгруппами в сомножителях», Матем. заметки, 2014, том 96, выпуск 6, 911–920

Для написания диссертации были изучены следующие статьи:

- «Сибирский математический журнал» 2007 год статья [2] белорусских математиков В.С. Монахова и В.Н. Тютянова «О конечных группах с некоторыми подгруппами простых индексов».

В данной статье получена разрешимость конечной группы, в которой всякая собственная не максимальная подгруппа содержится в подгруппе простого индекса.

Также в [2] доказывается теорема о том, что если G – конечная группа, у которой любая собственная не максимальная подгруппа содержится в подгруппе простого индекса, то фактор-группа $G/F(G)$ сверхразрешима. Обратно, если M – максимальная подгруппа конечной группы G и $G/F(G)$ сверхразрешима, то каждая не максимальная подгруппа в фактор-группе G/M_G содержится в подгруппе простого индекса. Здесь $F(G)$ – подгруппа Фиттинга группы G , а $M_G = \bigcap_{g \in G} M^g$ – ядро подгруппы M в группе G .

- **«Сибирский математический журнал» 2014 год
статья [3] В.С. Монахов и В.Н. Тютянов «О конечных
группах с заданными максимальными
подгруппами»**

В данной статье исследуются конечные группы с определенными максимальными подгруппами. В [3] доказано, что конечная ненильпотентная группа, в которой каждая максимальная подгруппа простая или нильпотентная является группой Шмидта.

- **«Математические заметки» 2013 год статья [19]**

В.С.

Монахова

«О разрешимости группы с перестановочными подгруппами».

В этой статье В.С. Монахов доказал разрешимость конечной группы $G = PS$ при условии, что подгруппы P и S разрешимы и картеровы подгруппы из P перестановочны с картеровыми подгруппами из S .

- **«Математические заметки» 2014 год статья [20]
В.С. Монахова и И.К. Чирик
«О сверхразрешимости конечной
факторизуемой группы с циклическими
силовскими подгруппами в сомножителях».**

В данной статье авторы, наряду с другими результатами, доказали сверхразрешимость конечной p - разрешимой 2-замкнутой группы $G = PS$, если силовские p -подгруппы в P и в S циклические.

В итоге мною была доказана теорема:

Теорема 2.5.1. Если каждая ненормальная максимальная подгруппа группы G нильпотентна или проста, то группа G разрешима или является группой Шмидта.

Доказательство. Допустим, что теорема неверна и группа G - контрпример минимального порядка. Пусть N и G/N - соответственно минимальная нормальная подгруппы группы G и произвольная факторгруппа группы G . Очевидно, что группа G/N наследует условия теоремы. Тогда по индукции G/N разрешима или группа Шмидта. Поэтому, если подгруппа $S(G) \neq 1$, то группа G разрешима. Значит, $S(G) = 1$. Тогда все нильпотентные максимальные подгруппы в G сопряжены, как нормализаторы силовских 2-подгрупп. Кроме того, каждая нильпотентная максимальная подгруппа является силовской 2-подгруппой в G .

Пусть A - ненормальная простая неабелева максимальная подгруппа группы G и M - максимальная нормальная подгруппа в G . Тогда $G = AM$ и $A \cap M = 1$, а также $|G : M| = p \in P$. Так как порядок A равен p , то подгруппа A нильпотентна. Значит, в группе G все ненормальные максимальные подгруппы имеют порядок $p=2$. Тогда каждая силовская q -подгруппа, $q \in P$, $q \neq 2$, нормальна в G , что противоречиво.

Пусть в G все максимальные подгруппы нильпотентные. Тогда по [4] G - нильпотентная группа или группа Шмидта.

Пусть G - простая группа. Тогда каждая нильпотентная максимальная подгруппа в G будет силовской 2-подгруппой и по теореме 1.3.31 $G = PSL(2, q)$ с $q = 9$ или простым числом $q = 2^n \pm 1 \geq 17$.

Пусть $G \cong PSL(2, 9)$. Так как $|G| = |PSL(2, 9)| = ((9-1) \cdot (9+1) \cdot 9) / 2 = 8 \cdot 5 \cdot 9$, то $|G : N_G(G_3)| = q + 1 = 10$, откуда $|N_G(G_3)| = 36$. Так как $N_G(G_3)$ - максимальная подгруппа в G , то по условию $N_G(G_3)$ - простая группа, что противоречиво. Следовательно, $q \neq 9$.

Пусть простое число $q = 2^n + 1$. Тогда $|N_G(G_q)| = (q-1)q/2 = (2^n + 1 - 1)(2^n + 1)/2 = 2^{n-1} \cdot (2^n + 1)$ и $N_G(G_q)$ - простая максимальная подгруппа в G , что невозможно. Значит, $q \neq 2^n + 1$.

Пусть $q = 2^n - 1$. Тогда в G есть непростая максимальная диэдральная подгруппа порядка $(q-1)$. Значит, $q \neq 2^n - 1$. Значит, группа G непростая. #

Заключение

В диссертации решены следующие задачи:

- изучено строение некоторых конечных групп с заданными подгруппами;
- изучены и изложены с подробными доказательствами результаты из научных работ слайд 4;
- проведен анализ результатов о конечных группах с заданными подгруппами из работ слайда 4 и получено обобщение теоремы 1 из статьи В. С. Монахова, В. Н. Тютянова, «О конечных группах с заданными максимальными подгруппами»;
- доказана теорема о том, что если каждая ненормальная максимальная подгруппа конечной группы G нильпотентна или проста, то группа G разрешима или группа Шмидта.

ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г.
ПЕТРОВСКОГО»**

Кафедра математического анализа, алгебры и геометрии
**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)**

по направлению 01.04.01. Математика, направленность (профиль)

Комплексный анализ и алгебра

на тему: «Исследование нормального строения конечных групп»

Выполнила:
Леонова Е.С.
студентка 2 курса 2 группы
Комплексный анализ и
алгебра

Научный руководитель:
Путилов С.В.
к.ф.-м.н., доцент кафедры
математического анализа,
алгебры и геометрии

Брянск 2019 г