

Анксиолитики (транквилизаторы)

лс, депрессирующие чувство тревоги и страха.

1. Противодействие бензодиазепинам

- хлорепид

- сибазон * ? (диазепам)

- феназепам *

- нозепам

- гидразепам

- тюбазепам

- петразепам и др.

2. Харбамиловые антирызимические замещённого пропанола

- спироган

- амиутил

- гидроксизин

3. Противодействие андренинитетана


- гуспирон

4. Гранкин. разных хим. групп
- гуспирон - афобазол (фабомоглон)

- мебикар

БЕНЗОДИАЗЕПИНЫ.

1126




The diagram illustrates a cross-section of a tank car. It features two main horizontal compartments separated by a vertical wall. The left compartment is labeled "Углеводородное" (Petroleum) and the right compartment is labeled "Газоконденсатное" (Gasoline). A vertical pipe extends from the top of the right compartment, ending in a valve. The entire structure is bounded by a thick black outline.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

БЕЗОДИНАЗЕПИНОВ

Гидравлическое замыкание. Гипотетическое
транзитическое & кис-

гликозидное гемоди-



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ГОРЯЧ. №№. 761
БЕНЗОДИАЗИПИНЫ.

1. Бензодиазепин. Эфедрол
2. Седативный эфедрол
3. Анксиолитический эфедрол
4. Отиреотактический эфедрол
5. Противосудорожный эфедрол
6. Антисептический эфедрол


Побочные эффекты бензодиазепинов

- сонливость, головокружение, \downarrow концентрации внимания

- снижение libido, нарушение эрекции
- депрессия и расстроиможность
- гипотония
- угнетение выхаживания
- инциденты
- лек. зависимости
- антероградная амнезия

Дизазепам (снбазон) Снбазонум

· иномибл: валиум, реланиум,
седуксен и др.



· транквилизатор, имеющий широкое применение в мед. практике

· эффекты:

- снятие эмоционального
- подавление чувства тревоги
- седативный эфф.
- миорелаксант.
- уменьшение синтетическое D-ре
- противосудорожное

· применение: при неврозах, психопатиях, реактивной депр.,
навязчивые и фобические расстройства, при наркоз. сна,


внутр, в/в, в/м

max доза 0,06 г (60 мг). Кфт. доза 2-3 приема.

? купир. опиоидную симптоматику

Феназепам (phenazepam)

относится. препарат



• действие:

выраженное П/С


тиодиаксантиные

седативное

снотворное

- применение: психопатия, навязчивость, фобии, психозы, панические атаки; сульф. алкогольной абсентиозной
- побочные эффекты: от. поб. эффектыベンゾдиазепинов но в большей степени выразена вынуждость, алексия, мышечная слабость, головокружение

АФБАЗОН (ФАБОМОТИНО)



стаб. преп. ?

• активен sigma-1-рец.
побуждает симпатико-адр. рабк к

гипок-рец.

• ингибитор МАО_A

• не вызывает привыкание и зависимости.

• применение: тревожные +-ва; исключительная зависимость

• поб. эффекты: аллергич. реакции, голова, боли

3 эффект развивается на 3-4 день приема

менее эффективен при панич. атаках, чем
при других тревожных расстройствах