

ПРОБЛЕМЫ
БЕСПЛОДИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ
СЕМЬИ

КРИВОШЕЕВА В. А.
13.2-804

2020



БЕСПЛОДИЕ

— НЕСПОСОБНОСТЬ ПАРЫ В ДЕТОРОДНОМ ВОЗРАСТЕ ЗАЧАТЬ РЕБЁНКА ПРИ РЕГУЛЯРНОЙ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ.



ПРИЧИНОЙ БЕСПЛОДИЯ ПАРЫ МОЖЕТ БЫТЬ *МУЖЧИНА (30 %), ЖЕНЩИНА (30 %)*, ЛИБО МОЖЕТ ИМЕТЬ МЕСТО **СМЕШАННЫЙ ФАКТОР**, КОГДА ПРИЧИНОЙ БЕСПЛОДИЯ ЯВЛЯЮТСЯ МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА ОДНОВРЕМЕННО. В **ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ПРИЧИНА БЕСПЛОДИЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕОБЪЯСНИМОЙ.**

В 80 % случаев факторами женского бесплодия являются:

ВОЗРАСТ: НАЧИНАЯ С 35 ЛЕТ РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖЕНЩИНЫ СНИЖАЕТСЯ, И ПОСЛЕ 40 ЛЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ 10 %.

ТРУБНЫЙ ФАКТОР: В СИЛУ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЧИН У ЖЕНЩИНЫ ИМЕЮТСЯ НАРУШЕНИЯ СТРОЕНИЯ ИЛИ ФУНКЦИЙ МАТОЧНЫХ ТРУБ.

ЭНДОМЕТРИОЗ: ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ СЛИЗИСТАЯ МАТКИ (ЭНДОМЕТРИЙ) РАЗРАСТАЕТСЯ ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ.

ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ РИСКА: МИОМЫ; БОЛЕЗНИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ; ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТАКИЕ КАК ДИАБЕТ, РАК, ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, АСТМА И ДЕПРЕССИЯ. ПРИЕМ АНТИДЕПРЕССАНТОВ.

ПРИЧИНЫ

ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

- АНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРОЕНИИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ МУЖЧИНЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ СПЕРМА ВО ВРЕМЯ ПОЛОВОГО АКТА НЕ ПОПАДАЕТ ВО ВЛАГАЛИЩЕ ЖЕНЩИНЫ.

- ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ.

- ПАТОЛОГИИ ВЫРАБОТКИ СПЕРМЫ (СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА СПЕРМЫ).

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА (ПРИВОДЯЩИЕ К ОБСТРУКЦИИ СЕМЯВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И СНИЖЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ СПЕРМЫ).

ЛИШНИЙ ВЕС.

ПРИЧИНЫ

В 20 % случаев причина бесплодия остается неизвестной, поскольку ее не удалось диагностировать

В А Ш И В О П Р О С Ы

В А Ш И В О П Р О С Ы

В А Ш И В О П Р О С Ы

В А Ш И В О П Р О С Ы

В А Ш И В О П Р О С Ы

В А Ш И В О П Р О С Ы