

Уравнение с параметром

алгебра 8 класс

учитель: А. В. Панченко

Мне приходится делить все время между политикой и уравнениями. Однако уравнения, по-моему, гораздо важнее, потому что политика существует только для данного момента, а уравнения будут существовать вечно.

А.
Энштейн

Линейное уравнение

$$a x = b$$

1. $-3,4 x = 16$

2. $2,8 x = 0$

3. ~~$68,4 x \pm 68$~~

4. ~~$37x = 37 x$~~

3. $6x = 3 + 6x$

4. $37 x = 37 x$

5. $9 x + 7 - 9 x = 0$

6. $71 x - 71 x = 0$

7. $5 x - 3 x = 260$

8. $2 - 3 x = 8 - 3x$

При каких значениях t корень уравнения равен нулю?

$$\text{а) } (8t - 16) x = 0$$

$$t = 2$$

$$\text{б) } (9 - t^2) x = 0$$

$$t = 3$$

Квадратное уравнение

$$a x^2 + b x + c = 0$$

$$a \neq 0$$

2

1. $x^2 - 4x + 3 = 0$

5. $8x^2 + 4x = 0$

2. $x^2 - 7x = 0$

6. $3x^2 - 27 = 0$

3. $x^2 - 2x + 8 = 0$

7. $5x^2 - 2x - 3 = 0$

4. $x^2 - 25 = 0$

8. $2x^2 + 8 = 0$

при каких значениях m один корень уравнения равен нулю

$$\text{а) } 3x^2 + x + (3m - 6) = 0$$

$$m = 2$$

$$\text{б) } 2x^2 - 3x + (m^2 - 16) = 0$$

$$m = 4$$

При каких значениях m , корни уравнения противоположны

$$3x^2 + (m^2 - 4m)x - 1 = 0$$

$$m = 4$$

Решим уравнение:

1. $a(x - a) = 3x - 9,$
с параметром a .

2. $tx^2 + (t^2 - 1)x + (t - 1) \stackrel{?}{=} 0,$
с параметром t .

Работа с учебником

№ 640, 641(б)

Домашнее задание

Решите уравнение с параметром a :

$$1. (a - 4)x^2 + (2a - 4)x + a = 0$$

$$2. ax^2 + (2a + 2)x + a + 2 = 0$$

$$3. a^2(x - 1) = (a + 2)x^3 + a$$