

Семей Мемлекеттік Медицина  
Университеті  
Балалар жұқпалы аурулар кафедрасы

# ИӨЖ

Тақырыбы: Вирусты гепатитпен  
Қазақстандағы балалардың  
аурушаңдылығы.

Дайындаған: Мырзағали Ж.М.  
704 – топ; ЖТД  
Тексерген: Курманова Б.Р.

- Вирусты гепатиттер медицина ғылымында және дүниежүзілік денсаулық сақтаудағы маңызды актуальді проблеманың бірі болып табылады.
- Бұл кең таралуына, аурушаңдылықтың жоғары деңгейіне, полиэтиологиялығына, созылмалы ағымға ауысу мүмкіндігінің жоғары болуына, одан бауыр циррозы және гепатокарциномаға айналуы және де жоғары өлімділік қауіпіне байланысты.



Рисунок 1 - Динамика заболеваемости ВГ по Семипалатинскому региону за 2000-2011 гг.



Рисунок 2 - Динамика заболеваемости ВГА и ВГВ детей до 14 лет за 2000-2011 гг.




Рисунок 3 - Пути передачи вирусного гепатита А (в %)




Рисунок 4 - Пути передачи вирусного гепатита В (в %)




Рисунок 5 - Динамика заболеваемости ХВГ за 2000-2011 гг. (на 100 тыс. населения)

- Қазақстан Республикасының Денсаулық Сақтау Министрлігінің ақпараты бойынша 2012 жылы “созылмалы вирусты гепатит В, С” диагнозымен диспансерлік есепте 13 701 ересек адам және **2034 бала** есепте тұрған.
- 2012 жылы вирусты гепатитке **120 696** бала және 278 мыңға жуық ересек адамдар тексерілген. Вирус **484** балада және 2870 ересек адамда анықталған .



- 2015 жылы вирусты гепатит «В» балалар арасында 2 жағдай тіркелген ( 100 мың тұрғынға шаққанда аурушаңдылық көрсеткіші – 0,04) ал 1991 жылы 2 469 жағдай (100 мың тұрғынға шаққанда аурушаңдылық көрсеткіші – 46,1).

- Балаларда вакцинацияның кең ауқымдылығына байланысты соңғы 25 жылда вирусты гепатит «В» мен Қазақстандағы балалардағы аурушандылық 1234,5 есе төмендеген.
- Вирусты гепатит «В»-ға өарсы вакцинациялық комплекс 12 айға дейін үш иммунизациядан тұрады.
- Алғашқы екпені туғаннан кейін бірден 12 сағат ішінде және кейін 2 және 4 айында.
-

- Вирусты гепатиттер ішінде ВГА гепатиттерінің үлес салмағы жоғары, А және В гепатитімен ауру жиілігі айқын төмендеген, әсіресе ВГВ 14 жастағы балалар арасында, ВГА берілу жолдары арасында тұрмыстық-қатынастық, ал ВГВ және ВГС – жыныстық қатынас арқылы берілетіні анықталған.

# Қолданылған материалдар:

- Л.А.МУКОВОЗОВА, Е.М.СМАИЛ, А.З.ТОКАЕВА, СЫДЫКОВА М.М., Ж.С.КАБАСОВА, А.Л. АЛИМБЕКОВА, Э. К. ИСАБАЕВА Государственный медицинский университет г. Семей ГУ «УГСЭН по г. Семей»  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В СЕМИПАЛАТИНСКОМ  
РЕГИОНЕ
- [https://tengrinews.kz/kazakhstan\\_news/kazahstane-ejegovno-rasti-chislo-bolnyih-gepatitom-i-220369/](https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstane-ejegovno-rasti-chislo-bolnyih-gepatitom-i-220369/)
- <https://www.caravan.kz/gazeta/gepatit-nikogo-ne-shhadit-71470/>
- [http://www.inform.kz/ru/50-tysyach-pacientov-s-gepatitom-stoyat-na-uchete-v-kazahstane\\_a2979485](http://www.inform.kz/ru/50-tysyach-pacientov-s-gepatitom-stoyat-na-uchete-v-kazahstane_a2979485)
-