

Антибиотики.

1. Макролиды и азолиты.

Спектр антимикробного действия макролидов близок к спектру действия пенициллинов. Они способны подавлять размножение микроорганизмов, устойчивых к пенициллину и другим антибиотикам, однако в процессе лечения к ним быстро развивается устойчивость микроорганизмов. Они не разрушаются в желудочно-кишечном тракте, поэтому их можно использовать внутрь.

Побочное действие препаратов этой группы проявляется в основном аллергическими реакциями и диспепсическими нарушениями. При длительном применении возможны нарушения функции печени. Поэтому препараты этой группы противопоказаны при серьезных заболеваниях печени.

Относятся:

Эритромицин

Олеандомицин

Мидекамицин (макропен)

Кларитромицин

Рокситромицин (рулид)

Азитромицин (сумаamed)

**препараты нового
поколения**

Преимуществами препаратов нового поколения являются: улучшенная фармакокинетика, лучшая переносимость и меньшая кратность применения.

Мидекамицин.

(макропен) Таб. 400мг №16, сухое вещество для приготовления суспензии во флаконах объемом 115 мл.

В низких дозах препарат оказывает бактериостатическое действие, в высоких – бактерицидное. Препарат принимают перед едой. Режим дозирования устанавливают индивидуально. Взрослым назначают макропен обычно по 400мг 3 раза в день в таблетках. Детям препарат назначают в зависимости от массы тела, в виде суспензии.

2. Тетрациклины.

Это антибиотики широкого спектра действия. К ним чувствительны многие грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, а также некоторые простейшие (**трихомонады и амебы**). Тетрациклины не разрушаются в пищеварительном тракте, поэтому могут использоваться внутрь. Им свойственна перекрестная устойчивость:

микроорганизмы, устойчивые к одному из тетрациклинов, устойчивы также и к другим антибиотикам этой группы.

Побочные эффекты: наиболее частое осложнение при приеме тетрациклинов – **кандидомикоз**. Для предупреждения развития **кандидомикоза** их сочетают с противогрибковым антибиотиком – **нистатином**. Также они могут нарушить функции печени и почек и развитие зубов у детей. Тетрациклины повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам. Имеются данные о тератогенном действии препаратов.

Противопоказания: беременным и кормящим матерям, детям до 8 лет и при тяжелых нарушениях функции печени и почек.

Относятся: **тетрациклин, доксициклин.**

Тетрациклин. Т. п. об. 0,1 и 0,25

Мазь 3%-30,0

Гл. мазь 1% - 3г и 10г

Тетрациклин внутрь назначают довольно редко, т. к. к нему устойчиво большинство ранее чувствительных микроорганизмов. Наибольший практический интерес из этой группы представляет препарат – **Доксициклин** К 0,05 и 0,1 гр №10.

Препарат длительного действия. По антимикробным и фармакокинетическим свойствам превосходит другие тетрациклины. Он быстро всасывается и медленно выводится из организма, хорошо проникает в органы и ткани.

Назначается внутрь после еды. В первый день суточная доза для взрослых составляет 0,2 гр. Ее можно принять сразу или по 0,1 гр каждые 12 часов. В последующие дни – по 0,1 гр 1 раз в день. Побочные эффекты проявляются реже, чем при использовании других тетрациклинов.

3. Левомецетины.

Это антибиотики широкого спектра действия. Проявляют значительную активность при лечении кишечных инфекций и пищевых интоксикаций. При этих заболеваниях они используются как основные антибиотики, а при других инфекционных заболеваниях – как резервные в связи с тем, что могут вызвать серьезные

побочные эффекты в виде нарушений кроветворения. Поэтому применение левомицетина требует регулярного контроля картины крови. Кроме того, левомицетин вызывает диспепсические расстройства, дисбактериозы и аллергические реакции.

Противопоказания: беременным и новорожденным, при псориазе, выраженной лейкопении и анемии. Его не следует назначать совместно с препаратами, угнетающими кроветворение (сульфаниламиды, бутадиион, цитостатики и др.).

Относятся:

Левомицетин Таб. 0,25 и 0,5 гр К 0,25 гр Гл.
к. 0,25% - 10 мл

Синтомицин . Лин. 5% и 10% - 25гр

Левомецетин входит в состав комбинированных мазей: «Левомеколь», «Левосин» и аэрозоля «Левовинизоль».

4. Аминогликозиды.

Это антибиотики широкого спектра действия. Эффективны в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, некоторые обладают высокой эффективностью при туберкулезе (**стрептомицина сульфат и др.**). Действуют бактерицидно. Практически не всасываются из ЖКТ, поэтому внутрь не назначаются, а вводятся парентерально. Существенным недостатком **аминогликозидов** является их **нефротоксичность и ототоксичность.**

Нефротоксичность – это нарушение функции

Ототоксичность – нарушение слуха и вестибулярные нарушения.

Эти побочные эффекты чаще встречаются у детей и у людей пожилого возраста.

Противопоказаны:

- Нарушения функции почек
- Нарушения слуха и вестибулярной функции
- При беременности (**назначение аиногликозидов беременным женщинам может привести к рождению глухого ребенка**)
- Маленьким детям
- При миастении

Относятся:

стрептомицин

канамицин

гентамицин

нетилмицин

более

амикацин

тобрамицин

препараты I поколения, токсичны
используются при туберкулезе

препараты нового поколения,
более эффективны и менее токсичны

5. Принципы комбинированного применения антибиотиков.

В современной практике часто прибегают к назначению комбинаций антибиотиков с целью повышения эффективности лечения и предупреждения развития устойчивости микрофлоры. При одновременном назначении двух и более антибиотиков между ними могут быть **индефферентные** отношения, явления синергизма и антагонизма.

- а) **При индефферентных** отношениях эффект одного антибиотика не зависит от присутствия другого.
- б) **Явления синергизма** между антибиотиками приводят к усилению их терапевтического эффекта и способствуют уничтожению

в) Явления антагонизма между антибиотиками приводят к ослаблению их терапевтического эффекта. Антагонизм проявляется, как правило, при совместном применении бактерицидных и бактериостатических антибиотиков.

Нельзя комбинировать антибиотики, вызывающие сходные побочные эффекты, т. к. при этом побочное действие препарата на больного усиливается .

6. Осложнения при лечении антибиотиками.

В процессе лечения антибиотики могут оказывать нежелательное действие на организм и вызывать различные осложнения. Среди осложнений, возникающих при антибиотикотерапии различают:

1. Побочные эффекты, специфичные для каждой группы антибиотиков. Они во многом определяются особенностями химического строения препаратов. Частота и степень их проявления зависят от величины дозы, длительности применения и путей введения препарата. Например, **ототоксическое** и **нефротоксическое** действие **гентамицина** и других **аминогликозидов**.

2. **Неспецифические побочные эффекты** чаще всего проявляются в виде аллергических реакций и не зависят от дозы. Наиболее часто аллергические реакции вызывают антибиотики – пенициллины, особенно у детей. При возникновении у больного аллергической реакции следует прекратить лечение антибиотиком, вызвавшим эту реакцию, и заменить его на антибиотик другой группы. Для лечения аллергических реакций противоаллергические препараты.
3. **Побочные эффекты, связанные с влиянием антибиотиков на микрофлору.** К такого рода осложнениям относятся: **дисбактериозы,** реакции

обострения и угнетение иммунитета.

Дисбактериоз – это нарушение нормального состава естественной микрофлоры организма. Он возникает вследствие того, что антибиотики подавляют размножение каких-либо одних видов микроорганизмов, создавая тем самым условия для избыточного роста других видов, нечувствительных к применяемым препаратам. Так могут чрезмерно развиться грибы рода *Candida*, что приводит к развитию **кандидомикозов**, т. е. грибковых поражений различных органов. Чаще всего **кандидомикозы** и другие формы **дисбактериоза** встречаются при длительной терапии антибиотиками широкого спектра действия. С целью профилактики и лечения **кандидомикозов** используются

противогрибковые средства.

Реакции обострения – это временное усиление симптомов инфекционного заболевания.

Причиной этого является массовая гибель микроорганизмов под влиянием антибиотиков, которая сопровождается повышенным выделением их токсинов. Реакция обострения наблюдается лишь в первые дни лечения и не требует отмены препарата. Для уменьшения проявлений реакции обострения назначают средства симптоматической терапии (жаропонижающие препараты при лихорадке, антигистаминные и др.).

Угнетения иммунитета – наблюдаются при длительном использовании антибиотиков, поэтому в комплекс лечебных мероприятий