


Школа безопасности

Оказание первой помощи
при кровотечении


Кровотечение – истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок.

Артериальное



Кровь ярко-красного цвета.
Изливается пульсирующей струей

Венозное



Кровь темно-красного цвета.
Изливается медленной струей

Капиллярное



**Способы остановки
кровотечения, порядок
действий при
оказании помощи**



Венозное кровотечение

1. Придание возвышенного положения поврежденной конечности
2. Пальцевое прижатие
3. Наложение давящей повязки
4. Максимальное сгибание конечности
5. Доставить пострадавшего в медучреждение



Артериальное кровотечение

1. Придание возвышенного положения поврежденной конечности
2. Пальцевое прижатие
3. Наложение кровоостанавливающего жгута

4. Доставить пострадавшего в больницу



НАЛОЖЕНИЕ ЖГУТА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ



Прижать пальцем артерию выше кровотечения

На расстоянии 3-5 см выше раны вокруг конечности наложить любую чистую и мягкую материю


Растянуть жгут двумя руками в средней части. Плотнo приложить жгут к конечности. Сделать оборот вокруг конечности, затем второй, третий и т.д.

Прикрепить к жгуту записку с указанием точного времени (часы и минуты) и даты наложения

Доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медучреждение

Ошибки при наложении жгута

- 1. Наложение без показаний
- 2. Наложён на голое тело
- 3. Затянут слабо - кровотечение усиливается, сильно – паралич и некроз
- 4. Нет записки с указанием времени наложения жгута
- 5. Жгут закрыт одеждой.



Капиллярное кровотечение

1. Придать возвышенное положение.
2. Обработать края раны дезинфицирующим раствором.
3. Наложить стерильную салфетку и прижать к ране.
4. Наложить повязку.

▣ Слабое кровотечение из небольшой раны, кровь сочится из раны медленно, не пульсирует



Остановка носового кровотечения

- Усадить больного, слегка наклонив его голову вперед.
- Прижать крыло носа к перегородке.
- Положить холод на затылок и переносицу, примерно, на 20мин.
- Если кровотечение не останавливается, ввести в носовые ходы ватные тампоны, смоченные 3% раствором перекиси водорода.

Носовое кровотечение, ошибки при оказании помощи

- Нельзя запрокидывать голову пострадавшего.
- В момент кровотечения из носа нельзя сморкаться.

