

Сестринский процесс при эндокринных заболеваниях


Подготовила Воронцова И. В.

Врожденный гипотериоз


- В основе заболевания лежит полная или частичная недостаточность тиреоидных гормонов, приводящая к задержке развития и дифференцировки всех органов и систем
- В первую очередь у плода, новорожденного ребенка «страдает» от недостатка тиреоидных гормонов центральная нервная система




- Установлена тесная взаимосвязь между сроками от начала заместительной терапии и индексом интеллектуального развития ребенка в дальнейшем
- Благоприятное умственное развитие можно ожидать только при начале лечения в первый месяц жизни ребенка



Клиника в ранний постнатальный период

- -переношенная беременность (более 40 недель)
 - -большая масса тела при рождении (более 3.500 гр.)
 - -отечное лицо, губы, веки, полуоткрытый рот с широким, «распластанным» языком,
 - - локализованные отеки в виде плотных «подушечек» в надключичных ямках, тыльных поверхностях кистей, стоп
 - -признаки незрелости при доношенности по сроку беременности
- 

- -низкий грубый голос при плаче, крике
- -позднее отхождение мекония
- -позднее отпадение пупочного канатика (остатка), плохая эпителизация пупочной ранки
- -затянувшаяся желтуха



На 3-4 месяце жизни

- -сниженный аппетит, затруднение при глотании
- -плохая прибавка массы тела
- -метеоризм, запоры
- -сухость, бледность, шелушение кожных покровов
- -гипотермия (холодные кисти, стопы)
- -ломкие, сухие, тусклые волосы
- -мышечная гипотония



- После 5-6 месяца жизни на первый план выступает нарастающая задержка психомоторного, физического развития
 - Пропорции тела у детей с гипотериозом без лечения приближаются к хондродистрофическим, отстает развитие лицевого скелета (широкая запавшая переносица, гипертелоризм, позднее закрытие родничков). Запаздывает прорезывание, а позднее и смена зубов
- Кардиомегалия, брадикардия, грубый низкий голос, стридорозное дыхание, цианоз носогубного треугольника

Шкала Апгар для скрининга

| Клинический признак | Количество баллов |
|---|-------------------|
| Пупочная грыжа | 2 |
| Отечное лицо | 2 |
| Запоры | 2 |
| Женский пол | 2 |
| Бледность, гипотермия кожи | 1 |
| Макроглоссия | 1 |
| Мышечная гипотония | 1 |
| Желтуха более 3-х недель | 1 |
| Шелушение и сухость кожи | 1 |
| Открытый задний родничок | 1 |
| Беременность более 40 недель | 1 |
| Масса тела при рождении более 3.500 грамм | 1 |

Неонатальный скрининг

1 этап- родильный дом

- У всех новорожденных на **4-5 день жизни** (у недоношенных детей на 7-14 день жизни) берется кровь (чаще из пятки) и в виде капель (6-8 капель) наносится на специальную пористую, фильтровальную бумагу
- Все полученные и высушенные образцы крови отсылаются в специализированную лабораторию, где проводится определение ТТГ

Иммунологическая система « Дельфия»

- -Уровень ТТГ до **20 мкЕД/мл** – вариант нормы
- - Концентрация ТТГ : **20-50- мкЕД/мл**- нужно проверить повторно, уведомить поликлинику по месту жительства для определения концентрации ТТГ в сыворотке крови
- -Концентрация ТТГ: **50-100 мкЕД/ мл**- можно заподозрить врожденный гипотериоз
- -Концентрация ТТГ: **более 100 мкЕД/мл** – сразу же начинать лечение

2 этап- детская поликлиника

- Динамическое диспансерное наблюдение- проводится контрольное исследование концентрации гормонов ТТГ, Т3,Т4 в следующие сроки: через 2 недели и 1,5 месяцев после заместительной терапии, затем в 3 мес, 6 мес, 9 мес
- Затем в 1 год проводится уточнение диагноза
- Лечение L – тироксином. Доза подбирается индивидуально



Группы риска новорожденных по развитию транзиторного гипотериоза

- -недоношенные дети
- -новорожденные с низким весом при рождении, внутриутробной гипотрофией
- -Новорожденные с внутриутробными вирусно-бактериальными инфекциями
- -Новорожденные от матерей, получавших во время беременности тиреостатические препараты
- -новорожденные от матерей с эндемическим зобом, не получавшим во время беременности йодную профилактику
- -Новорожденные от матерей с заболеваниями щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит, гипотериоз)


Лечение

- Должно быть начато не позднее первого месяца
- Препарат I – Тироксин выпускается в дозе 25 мкг, 50 мкг, 100 мкг
- -Всю суточную дозу необходимо давать утром натощак, за 30 минут до завтрака, желательно в неразжеванном виде с небольшим количеством жидкости
- В крови создается «депо» этого препарата, которое расходуется по мере необходимости
- Показателем адекватности получаемого лечения при гипотериозе(у детей старше года) служит нормальный уровень ТТГ в сыворотке крови




Рекомендуемые дозы L- тироксина

| возраст | Мкг/сутки | Мкг/кг/сут |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 0-3 мес | 15-50 | 10-15, недоношенные -8-10 |
| 3-6 мес | 25-50 | 8-10 |
| 6-12 мес | 50-75 | 6-8 |
| 1-3 года | 75-100 | 4-6 |
| 3-10 лет | 100-150 | 3-4 |
| 10-15 | 100-150 | 2-4 |
| Старше 15 лет | 100-200 | 2-3 |



Низкорослость и лечение гормоном роста



Информация
для врачей
и пациентов

Факторы, влияющие на рост

- - **Семейная предрасположенность** (генетические факторы) – ростовые показатели обоих родителей одинаково важны для растущего ребенка (Если рост обоих родителей ниже среднего, нередко мальчики имеют рост даже ниже, чем рост отца, а девочки – ниже, чем рост матери).
- - **Внутриутробные факторы** (наиболее интенсивный рост как раз происходит во время беременности). Рост ребенка будет ниже ожидаемого, если внутриутробно не получал адекватного питания или испытывал какие-либо другие проблемы

- Наиболее высокие темпы роста во внутриутробном периоде отмечаются в середине беременности, т. е. между **3-м и 6-м** месяцами
- Если в течение этого периода имеются повреждения плаценты, ребенок может родиться с дефицитом роста и низкой массой тела



Рост после рождения

- **Период младенчества** – в течение которого рост зависит преимущественно от внутриутробного фактора и адекватного питания- очень быстрый рост(1 год – 25 см, 2 год- 12-10 см)
- **-Период детства** - в течение которого рост регулируется преимущественно гормоном роста,, относительно постоянный рост . Если в организме не вырабатывается достаточное количество гормона роста, скорость роста снижается с 5-7 см/год до 3-4 см/год

- **Период подросткового развития** - в течение которого рост регулируется как гормоном роста, так и половыми гормонами (эстроген и тестостерон).
- **Подростковый скачок.** У девочек эта стадия обычно начинается за год до первого менструального цикла. У девочек - между 12-13 годами, у мальчиков - с 14-15 лет. Сроки могут варьировать



- Таким образом, если мы хотим своевременно диагностировать те случаи низкорослости, при котором может быть оказана медицинская помощь, необходимо регулярное измерение роста и оценка его динамики каждого ребенка. Чем раньше заподозрено замедление роста, и начато лечение(т. е. чем больше времени оставлено для роста), тем выше может быть конечный рост



- Щитовидная железа вырабатывает тироксин, а гипофиз- гормон роста
- Гипофиз находится под контролем гипоталамуса, расположенного в срединных структурах мозга



- Гормон роста необходим для нормального физического развития
- Гормон роста вырабатывается в гипофизе, откуда он эпизодически высвобождается в кровеносное русло.
- В дневное время секретруется лишь незначительное количество гормона роста, тогда как ночью его концентрации максимальны



Гипофизарный нанизм

- Задержка роста у детей может быть связана с несколькими причинами. Одна из них- неспособность гипофиза вырабатывать достаточное количество гормона роста
- Ребенок «выпадает» из своего нормального графика роста



Лечение гормоном роста

- Гормон роста представляет собой белок, поэтому при приеме внутрь, как и другие белки, он переваривается
- Инъекции делают в вечернее время, в бедро, может делать сам ребенок
- Гормон роста **генотропин16 МЕ/Мл- на 10-20 дней терапии**



Сахарный диабет

- -заболевание поджелудочной железы, развивающееся вследствие относительной или абсолютной недостаточности инсулина, приводящее к нарушению утилизации углеводов, нарушению жирового и белкового обмена, проявляющаяся гипергликемией

Исследование углеводного обмена

Глюкометры




Проведение анализа



Тест на толерантность к глюкозе

| | | |
|---|-------------|-----------------|
| Количество глюкозы зависит от возраста ребенка: | 0 – 5 лет | 2 – 2,5 г/кг |
| | 5 – 10 лет | 1,25 – 1,5 г/кг |
| | 10 – 15 лет | 1,5 – 1,75 г/кг |



Этиология

У детей развивается СД 1 типа – инсулинзависимый вариант вследствие нарушения деятельности бета-клеток островкового аппарата поджелудочной железы, приводящие к дефициту инсулина

Доказана генетическая предрасположенность Она реализуется под воздействием пусковых механизмов (триггеров):

- 1) вирусы (краснуха, эпидемический паротит, грипп),
- 2) лекарственные препараты
- 3) травмы, 4) стрессы,
- 5) ожирение, 6) заболевания поджелудочной железы,
- 7) муковисцидоз
- 8) токсические и лекарственные вещества

Сахарный диабет типа 1 (СД1)

- может манифестировать в любом возрасте, но наиболее часто — в детском и юношеском.
- **А. Аутоиммунный сахарный диабет** характеризуется гибелью бета-клеток, наличием аутоантител к бета-клеткам, абсолютной инсулиновой недостаточностью, полной инсулинозависимостью, тяжелым течением с тенденцией к кетоацидозу, ассоциацией с генами главного комплекса гистосовместимости (HLA).
- **В. Идиопатический сахарный диабет** также протекает с гибелью бета-клеток и склонностью к кетоацидозу, но без признаков аутоиммунного процесса (специфических аутоантител и ассоциации с HLA-системой). Эта форма заболевания характерна для пациентов африканского и азиатского происхождения

- **Сахарный диабет типа 1 (СД1)** — аутоиммунное заболевание, развивающееся у генетически предрасположенных к нему лиц, при котором хронически протекающий лимфоцитарный инсулит приводит к опосредованной Т-лимфоцитами деструкции бета-клеток с последующим развитием абсолютной инсулиновой недостаточности со склонностью к развитию кетоацидоза.
- **СД1** — многофакторное, полигенно наследуемое заболевание

Патогенез

- На фоне триггеров под воздействием макрофагов происходит аутоиммунное разрушение бета-клеток, при котором снижается уровень инсулина
- Глюкоза перестает утилизироваться тканями и накапливается в крови – развивается гипергликемия. Она приводит к глюкозурии, которая тянет за собой воду – развивается полиурия. Ткани испытывают недостаток воды – отмечается жажда
- Для компенсации энергетического голодания клеток включаются механизмы эндогенного синтеза глюкозы из жиров и белка
- Голод клеток из-за липолиза и протеолиза приводит к повышенному аппетиту (полифагия)

Фазы течения СД

- доклинический диабет;
- манифестация, или дебют сахарного диабета;
- частичная ремиссия, или фаза «медового месяца»;
- хроническая фаза пожизненной зависимости от инсулина;
- нестабильный этап препубертатного периода;
- стабильный период, наблюдающийся после периода полового созревания.

Доклинический диабет может длиться месяцы или годы.



Клиника (проблемы пациента)

Потенциальный диабет - стадия генетической предрасположенности, наблюдается у детей из группы риска:

- -наличие СД у родственников, близнецов
- -ожирение, хронический панкреатит
- -рецидивирующие стоматиты
- - частые гнойно- воспалительные заболевания

Латентный диабет - нарушается толерантность к глюкозе, клиники нет.

- Через 2 часа после нагрузки сахаром уровень глюкозы не возвращается к норме (3,5-5,5 ммоль/л)

Глюкозотолерантный тест - определяют уровень сахара в крови утром натощак и через 2 часа после приема раствора глюкозы (1,75 г на 1 кг фактической массы)

| Время определения | Концентрация глюкозы в венозной крови, ммоль/л |
|--|--|
| <u>Сахарный диабет</u> | |
| Натощак | Больше или равно 6,7 |
| Через 2 часа | Больше или равно 11,1 |
| <u>Нарушение толерантности к глюкозе</u> | |
| Натощак | Меньше 6,7 |
| Через 2 часа | 6,7- 11,1 |



Диагностические критерии оценки глюкозотолерантного теста (Комитет экспертов ВОЗ по сахарному диабету, 1999)

| Результаты оценки | Глюкоза капиллярной крови, ммоль/л (мг%) | |
|---------------------------------------|--|--|
| | Натощак | Через 2 часа |
| Здоровые | < 5,5 ммоль/л (< 100 мг%) | < 7,8 ммоль/л (< 140 мг%) |
| Нарушенная толерантность к глюкозе | < 6,1 ммоль/л (< 110 мг%) | > 7,8 < 11,1 ммоль/л (> 140 < 200 мг%) |
| Сахарный диабет | > 6,1 ммоль/л (> 110 мг%) | > 11,1 ммоль/л (> 200 мг%) |

Явный СД- проявляется полидипсией (жажда), полиурией, снижением массы тела на фоне чрезмерного аппетита (полифагия)

Особенности СД у детей школьного и дошкольного возраста

- Недомогание, слабость, повышенная утомляемость, головокружение, снижение умственной и физической активности, выпивают 5-6 литров воды, никтурия, похудение ребенка на фоне повышенного аппетита
- -сухость кожи, слизистых, присоединение грибковой инфекции, опрелости, у девочек-вульвит, себорея на волосистой части головы, язык вишневый, диабетический румянец на щеках, лбу, веках, подбородке

Особенности СД детей грудного возраста

- Заболевание проявляется резким беспокойством, дети жадно захватывают соску и грудь, успокаиваются на короткое время только после питья
- -Отмечается снижение массы тела
- -Родители обращают внимание на «накрахмаленные пеленка» - из- за отложения кристаллов сахара
- -Характерны стойкие опрелости
- -Часто присоединяется гнойная инфекция

Частичная ремиссия или фаза «медового месяца»

- Наблюдается после начала лечения инсулином примерно у 80% детей, продолжительность составляет от нескольких недель до полугода, редко — год и дольше. Фаза ремиссии сахарного диабета является временной и не означает излечения (Е).
- **полная ремиссия** — прекращение введения инсулина без ухудшения показателей гликемии;
- **частичная ремиссия** — потребность в инсулине составляет менее 0,5 ЕД/кг, а концентрация гликированного гемоглобина (HbA1c) в крови — менее 7%.

Осложнения

- -Жировая инфильтрация печени – развивается вследствие истощения запасов гликогена и избыточного поступления нейтрального жира в гепатоциты. Печень увеличена, плотная



- -Диабетическая микроангиопатия

Генерализованное поражение мелких сосудов, выражающееся в утолщении базальной мембраны с нарушением кровоснабжения и функции органов (нефропатия, ретинопатия, ангиопатия н/ конечностей с развитием трофических язв)


Цели лечения детей и подростков с СД1:

- достижение максимально близкого к норме уровня углеводного обмена;
- нормальное физическое и соматическое развитие ребенка;
- развитие самостоятельности и мотивации к самоконтролю;
- профилактика специфических осложнений сахарного диабета.



Принципы лечения

- 1. Заместительная терапия препаратами инсулина:
- -ультракороткого (хумалог, новорапид, апидра) – через 5-15 мин, пик действия 1-2 часа
- -короткого (актрапид)- действие через 15-30мин, пик-2-4 часа
- -продленного действия (хумулин Н, лантус)– через 1-2ч, длительность -18-24 часа



- **Аналоги ультракороткого действия**

— аспарт (НовоРапид), глулизин (Апидра), лизпро (Хумалог) (-0,15—0,35мин, пик- 1—3часа, длительность- 3—5ч)

- Простой — **короткого действия** (Актрапид НМ, Хумулин Регулар, Инсуман Рапид) (начало-0,5—1 , пик-2—4ч, длит- 5—8ч)

- **Средней длительности действия** (Протафан НМ, Хумулин НПХ, Инсуман Базал) (начало-2—4 , пик-4—12ч, длит- 12—24)

- **Базальные аналоги инсулина** Аналог инсулина гларгин (Лантус) (начало-2—4, пик Нет, длит- 24ч)

- **Аналог инсулина детемир** (Левемир) (начало-1—2, пик- 6—12ч, длит- 20—24ч)



Инсулины вводят п/к, доза суточная – 0,5-0,7 ЕД/кг (В первые 1—2 года, Через 5 лет до 1 ЕД/кг), зависит от срока заболеваемости, степени тяжести, подбирается в стационаре, на 1 ХЕ требуется 2 ЕД инсулина

Соматические заболевания. Эндокринные заболевания Педиатрия

Сборка шприц-ручки

- 

Отвинтите металлический наконечник. Снимите колпачок
- 

Удалите защитный колпачок и плотно заведите иглу на шприц-ручку
- 

Отвинтите цилиндр корпуса
- 

Продерживайте резиновую мембрану флакона
- 


Вставьте флакон металлическим концом вперед
- 

Плотно навинтите металлический наконечник на цилиндр корпуса. Пуговчатая юбка выдвигается

ИПНО Госучрежд. 45(080), Челябинск, пр. Ленина, 76, ЮУрГУ, тел. (351) 342-9958, факс: www.kidmed.ru

Соматические заболевания. Эндокринные заболевания Педиатрия


Места для введения инсулина



ИПНО Госучрежд. 45(080), Челябинск, пр. Ленина, 76, ЮУрГУ, тел. (351) 342-9958, факс: www.kidmed.ru

Аналоги ультракороткого действия (Хумалог, НовоРапид и Апидра) вводятся непосредственно перед приемом пищи (С), обладают сходными временными профилями действия вне зависимости от дозы (С). Применение аналогов ультракороткого действия снижает частоту гипогликемии (А, В).

Беспиковые аналоги инсулина продленного действия: Лантус вводится 1 раз в сутки, может назначаться 2 раза в сутки для обеспечения оптимального базального уровня инсулина в крови (С).



2.Диетотерапия

- Питание должно быть сбалансировано по б, ж, у - стол №9
- -Исключают легоусвояемые углеводы- сахар, мед, конфеты, манная, рисовая крупа, виноград, бананы, хурма
- -Они заменяются на углеводы, содержащие клетчатку (ржаная мука, гречневая крупа, овощи, фрукты, ягоды)
- -Сахар заменяют сорбитом, ксилитом



- **Хлебная единица** – условное понятие, которое содержит 12 г углеводов (один кусок хлеба)
- 1 ХЕ повышает глюкозу крови на 2,8 ммоль/л

Таблица замены хлебных единиц
1 хлебная единица (ХЕ) содержится в:

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Молоко, кефир, сливки любые | 1 стакан (250 мл) |
| Творожистая масса (сладкая) | 100 г |
| Сырники | 1 средний (85г) |
| Мороженое | 65 г |
| Хлеб, булки любые (кроме одобрных) | 1 кусок (25 г) |
| Крупа любая вареная | 2 ст. ложки горячей (50 г) |
| Вермишель, лапша, рожки | 1,5 ст. ложки (15 г) |
| Сахар: - песок | 1 ст. ложка горячей (15 г) |
| - кусковой | 1 ст. ложка |
| Сухари | 20 г |
| Блин | 1 большой |
| Оладьи | 1 средний |
| Гельмечи | 4 шт. |
| Картофель: - пюре | 2 ст. ложки |
| - жареный | 1,5 - 2 ст. ложки (40 г) |
| Вареники | 2 шт. |
| Котлета | 1 средняя |
| Пирожок с мясом | Менее 1/2 шт. |
| Дыня | 300 г с кожурой |
| Абрикос | 3 средних (110 г) |
| Ананас | 1 ломтик (90 г) |
| Апельсин | 1 средне-крупный (170 г) |
| Арбуз | 400 г с кожурой |
| Банан | 0,5 крупного |
| Груша | 1 маленькая |
| Клубника | 10 средних |
| Мандарины | 3 мелких (170 г) |
| Яблоко | 1 среднее (100 г) |
| Финики | 3шт. (15 - 17 г) |
| Сок арбузно-фруктовый | 1/2 стакана (130 мл) |
| Сок апельсина | 1/2 стакана (100 мл) |
| Сок яблочный | Менее 1/3 стакана (80 мл) |
| Квас | 1 стакан (250 мл) |

Завтрак: белый хлеб – 2 ХЕ

- Салат листовой-0 ХЕ
- Яйцо всмятку- 0ХЕ
- Масло сливочное -0ХЕ
- Чай с сахарозаменителем- 0ХЕ

2 завтрак : апельсин 1 штука- 1ХЕ

Обед: рис отварной 4 ст л. – 2ХЕ

- Хлеб ржаной – 2ХЕ
- Суп говяжий с лапшой и овощами – 0,5 ХЕ
- Грудки куриные - 0ХЕ
- Чай с сахарозаменителем -0ХЕ

Полдник: яблоко среднее – 1ХЕ

Ужин: картофель отварной 2штуки – 2ХЕ

- Хлеб белый – 1ХЕ
- Горох с морковью – 0,5 ХЕ

2 ужин: йогурт – 2ХЕ



Физическая нагрузка

- ЛФК – как метод снижения уровня сахара в крови – проводят в период максимального повышения глюкозы
- Рекомендуют гигиеническую гимнастику, ходьбу на 4-5 км, плавание, игру в бадминтон



Диагностика:

- жалобы и анамнез
- определение уровня сахара в крови глюкометром
- определение уровня сахара в моче глюкотестом
- определение кетоновых тел



Гипергликемия — главный лабораторный признак СД. Нормальные показатели уровня глюкозы в капиллярной крови: новорожденные — 1,6—4,0 ммоль/л; доношенные грудные дети — 2,78—4,4 ммоль/л; дети раннего возраста и школьники — 3,3—5,0 ммоль/л.

Глюкозурия. В норме у здорового человека глюкоза в моче отсутствует

Кетоны. Определяют уровни ацетоацетата в моче и -оксибутирата в крови. Уровень -оксибутирата в крови выше 0,5 ммоль/л является повышенным

Уровень гликированного гемоглобина отражает состояние углеводного обмена в течение последних трех месяцев. Оценка уровня HbA1c используется для подтверждения диагноза СД и оценки степени компенсации углеводного обмена у больных СД, получающих лечение. Нормальный уровень HbA1c составляет 4—6%, HbA1 — 5—7,8%.

Инсулиновая помпа –носимый дозатор
инсулина- через установленную в теле иглу в
течение суток вводят инсулин короткого
действия



Инсулиновая помпа — мобильное электронное устройство, постоянно носимое пациентом, весом 65—100 г. В ней используется только один вид инсулина, в основном быстродействующие аналоги инсулина, который подается в двух режимах — базисном и болюсном.

Преимущества инсулиновых помп: индивидуальный подбор базисной скорости введения инсулина;

-возможность уменьшить скорость базисной подачи при физической нагрузке вплоть до отмены;

-расширенные возможности болюсного режима (стандартный, пролонгированный и многоволновой);

-- снижение вариабельности действия вследствие использования аналогов инсулина ультракороткого действия;

-- возможность подачи малых доз инсулина с точностью до 0,01 ЕД;

--уменьшение количества инъекций.

Показания к использованию помповой терапии: невозможность достижения компенсации углеводного обмена, большая вариабельность уровня глюкозы в течение суток вне зависимости от уровня HbA1c (С); «феномен утренней зари» (Е); снижение качества жизни (Е); частые гипогликемии (С); дети младшего возраста с низкой потребностью в инсулине, особенно младенцы и новорожденные — не существует возрастных ограничений использования помп (Е); иглофобия (Е); регулярные занятия спортом (Е)

Диабетический кетоацидоз

- острое осложнение сахарного диабета являющееся следствием абсолютной или относительной инсулиновой недостаточности и резкого снижения утилизации глюкозы тканями организма.
- Причины: несвоевременная диагностика СД, ошибки в введении инсулина, нарушения диеты, физическое и психическое перенапряжение, инсулинорезистентность, хирургические операции, травмы, острые воспалительные процессы и инфекции.

- Клиника: кома с утратой сознания, кожа сухая, бледная, «диабетический румянец», тургор тканей снижен, «мягкие» глазные яблоки, ЧСС ↑, АД↓, олигоурия, запах ацетона изо рта.
- Лабораторно: гликемия 20-30 ммоль/л, глюкозурия




Неотложная помощь

- 1. Определить глюкозу в крови (глюкометр).
- 2. Обеспечить проходимость дыхательных путей.
- 3. Оксигенотерапия.
- 4. 0,9% физ.раствор в/в капельно 20 мл/кг в течение 1 часа. Если гликемия $< 16,7$ ммоль/л 5% р-р глюкозы. (t р-ра 37°C)
- 5. Инсулин короткого действия (актрапид, хумулин в/в в дозе 0,1 ЕД/кг час в 20 мл 0,9% физ.р-ра)
- 6. Транспортировка в ОРИТ.

Гипогликемическая кома

- – острое осложнение сахарного диабета, обусловленное резким падением сахара в крови с последующим снижением утилизации глюкозы мозгом и гипоксией мозга.
- Причины: передозировка инсулина, повышенная чувствительность к инсулину, несвоевременный прием пищи после введения инсулина, психоэмоциональные перегрузки, острые заболевания.



- **Клиника**: внезапное начало, сознание отсутствует, гипотония, арефлексия, бледность кожи, профузный пот, тахикардия, АД N, дыхание частое, поверхностное.
- **Лабораторно**: гипогликемия меньше 3,5 ммоль/л, сахара в моче нет.



Неотложная помощь

- 1. Определение сахара в крови, моче.
- 2. В/в струйно 20-40% р-р глюкозы 2мл/кг, но не более 60-80 мл. При отсутствии эффекта через 10-15 минут повторить в той же дозе.
- 3. При отсутствии эффекта введение глюкагона 0,5-1,0 мл п/к, в/в капельно 10% р-р глюкозы 20 кап. в минуту 100-200 мл.
- 4. Транспортировка в ОРИТ.
- 5. При восстановлении сознания: накормить – сахар, конфеты, сладкий чай, варенье, мед.

