
★ ★ ★ ★

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

★ ★ ★ ★

Презентацию выполнил ученик
6-1 класса

Калугин Виктор

Наружные кровотечения (истечение крови с непосредственным контактом с внешней средой)

1. Капиллярные;
2. Артериальные;
3. Венозные;
4. Смешанные.


Внутренние кровотечения (излитая кровь не имеет непосредственного контакта с окружающей средой)

1. В свободную брюшную полость;
2. Кровоизлияния во внутренние органы (внутриорганные гематомы);
3. Желудочно-кишечные кровотечения.

По величине кровопотери при любом кровотечении

1. Легкая кровопотеря;
2. Кровопотеря средней тяжести;
3. Тяжелая кровопотеря;
4. Крайне тяжелая кровопотеря.


Как отличить артериальное кровотечение от венозного.



Если человек потеряет более 1 литра крови - он может умереть. При ранении крупной артерии такое количество крови может вытечь за несколько минут.

Для остановки кровотечения (в общем случае) нужно:

1. Зажать рану рукой, платком или куском ткани.



Если есть возможность - поднять раненую конечность вверх, чтобы уменьшить давление крови в месте ранения.

Если ранена рука ниже локтя или нога ниже колена - согните локоть или колено. Таким образом, можно снизить ток крови к кровоточащей ране.

2. Наложить давящую повязку

Положите на рану марлевую салфетку или сложенный платок. На салфетку подложить что-то твердое, например моток бинта или мобильный телефон. Забинтовывать следует по направлению от раны к сердцу - чтобы в конечности осталось как можно меньше крови - это поможет снизить боль. Если нет под рукой бинта - используйте кусок ткани или туалетную бумагу. Закрепить повязку можно булавкой или пластырем.



3. При сильном кровотечении необходимо пережать артерию при помощи жгута. На теле человека есть только 4 места, где можно успешно наложить жгут - вверху ноги и вверху руки. Даже если кровотечения в области кисти или стопы, жгут накладывают в верхней части конечности. Жгут можно сделать из ремня, веревки, скрученного куска ткани. Под жгут нужно положить полотенце или кусок ткани. Жгут необходимо снять через 30 минут, чтобы он не привел к атрофии нерва. Если при снятии жгута возобновляется кровотечение - необходимо наложить поверх раны еще одну давящую повязку.



Спасибо за внимание!!!

- **Берегите себя и своих близких!!!**