

Эпидемиологически безопасные стандарты и алгоритмы медицинской помощи

Техова И.Г.
Центр инфекционного контроля
Санкт-Петербург

Эффективные стандарты и
алгоритмы медицинской
помощи - краеугольный
камень эффективной
программы инфекционного
контроля

Назначение:

- ◆ Стандарты (стандартные руководства)
– определяют основные моменты выполнения лечебных и диагностических мероприятий
- ◆ Алгоритмы – устанавливают рекомендуемые, обоснованные способы выполнения соответствующих задач, обеспечивающих соблюдение стандартов инфекционного контроля

Разработка стандартов и алгоритмов

- ◆ Методы обучения медицинского персонала
- ◆ Оценка уровня их готовности к выполнению новых задач
- ◆ Пересмотр и переработка на регулярной основе (каждые 1-3 года)
 - Используются наиболее современные научные данные
 - Письменные инструкции выполняются и имеют смысл в **конкретных условиях данного стационара**

Кто должен писать стандарты и алгоритмы?

- ◆ Эксперт в области инфекционного контроля
- ◆ Представитель администрации
- ◆ Представитель исполнителей алгоритмов
- ◆ Врач-клиницист (при необходимости)

Какие виды стандартов и алгоритмов нужны?

- ◆ Для тех видов деятельности, которые особенно важны
- ◆ Для тех видов деятельности, которые нуждаются в уточнении
- ◆ Для видов деятельности, практика которых противоречива

Документы практического характера

- ◆ Предназначены для конкретных отделений\подразделений больницы
- ◆ Отвечают на вопросы:
 - «зачем?»
 - «кто?»
 - «когда?»
 - «что?»
 - «где?»
- ◆ Определяют перечень необходимого оснащения и оборудования

Эпидемиологически безопасные стандарты и алгоритмы

- ◆ Описание процедуры (что требуется и что нужно делать)
- ◆ Цель (необходимость написания стандарта)
- ◆ Перечень оборудования
- ◆ Детальные инструкции (последовательность действий)

Внедрение и информирование

- ◆ Кто отвечает за информацию?
- ◆ Как информация будет доведена до сведения заинтересованных лиц?
- ◆ Когда стандарт\алгоритм вступает в действие?
- ◆ Кто отвечает за утверждение и внедрение стандарта?

Обучение персонала

- ◆ Кто будет учиться?
- ◆ Кто проводит обучение?
- ◆ Каков необходимый для обучения период времени?

Алгоритмы лечебных и диагностических манипуляций

- ◆ Разработка эпидемиологически безопасных алгоритмов
- ◆ Обучение персонала
- ◆ Контроль выполнения
- ◆ Пересмотр

**Алгоритм обработки рук при проведении различных манипуляций
в отделении для новорожденных МУЗ ГКБ № 7**

Название манипуляций	Мытье рук		Антисептика		Перчатки	
	до *	после	до	после	чистые	стерильные
Безинвазивные манипуляции						
Взвешивание	+		+	+	+ полотыни	
Пеленание	+		+	+	+ полотыни	
Аускульт	+		+	+	+ полотыни	
Пальпация	+		+	+	+ полотыни	
Обработка кожи	+		+	+	+ полотыни	
Фототерапия	+		+	+	+ полотыни	
Дача лекарственных препаратов	+		+	+		
Обработка глаз	+		+	+	+ полотыни	
Перед выходом из палаты				+		
Приход на работу	+					
Манипуляции с повреждением кожи						
Внутримышечные, подкожные, внутривенные инъекции	*		*	*	+ дактиловые	
Забор крови пункцией	+			+	+ дактиловые	
Отсечение пуповинного остатка	+		+	+	+ полотыни	
Вакцинация БЦЖ, ПГ, «В»	+		+	+		*
Обработка пупочной ранки	+		+	+	+ полотыни	
Безинвазивные манипуляции, приводящие к контаминации рук медперсонала биологическими материалами						
Удаление желудочного зонда	*			+	+ полотыни	
Удаление мочевого катетера	+			+	+ полотыни	
Эктубация	+			+	+ полотыни	
Клизма, газоотв. трубка	+			+	+ полотыни	
Манипуляции, сопровождающиеся проникновением в органы и системы						
Постановка внутривенного катетера	+		*	*		+
Удаление внутривенного катетера	+		+	+		*
Интубация	+		*	*		*
Санация ТБД	+		*	+	+ полотыни	
Постановка мочевого катетера	+	*	*	*		*
Люмбальная пункция	+	*	*	*		*
Постановка желудочного катетера	+		+	+		*
Зондовое кормление	+		+	+		*
Промывание желудка	+		+	+		*
Манипуляции, требующие асептических условий						
Приготовление молочных смесей	*	*	*			
Заправка внутривенной системы	*	*	*	*		*
Замена внутривенной системы	*		*	*		*
Приготовление в/в растворов	*	*	*			*

* мытье рук может быть заменено антисептикой

АЛГОРИТМ проведения обхода в отделении совместного пребывания матери и ребенка

1. Перед проведением обхода врач и медсестра тщательно моют руки с мылом и надевают чистый халат.
2. Медсестра готовит специальную укладку для обхода. Все предметы размещает на каталке, предварительно обработанной дез.раствором « для текущей обработки».
Перечень предметов укладки для обхода:
На верхней полке укладка размещается на стерильной пеленке:
 - набор стерильных пинцетов для взятия стерильных материалов;
 - набор стерильных ватных шариков;
 - стерильные ножницы;
 - лигатура в ампуле, предварительно ампула обработана спиртовым раствором хлоргексидина ;
 - стерильная баночка со стерильной водой для обработки глаз;
 - стерильная баночка с 0,5% спиртовым раствором хлоргексидина для обработки кожи новорожденного, флаконы с 3% раствором перекиси водорода, 5% раствором перманганата калия, стерильной водой, стерильным маслом;Rядом со стерильной укладкой размещаются:
 - спиртовый кожный антисептик для обработки кожи во флаконе с дозаторным устройством – «лизанин» ;
 - одноразовые перчатки чистые.
- На нижней полке каталки размещается:
 - емкость для сбора использованных перчаток;
 - лоток для сбора используемого материала, инструментов;
3. Обработка пеленального стола проводится родильницей дез.раствором из емкости с маркировкой «текущая обработка» после осмотра или пеленания ребенка.
4. Медсестра обрабатывает руки антисептиком.
 - 4.1. Вытряхивает на стерильный стол ватные шарики из одного крафт-пакета.
 - 4.2. Раскладывает стерильные палочки поперек края стола.











INFANT INCUBATOR
CHOONGWA MEDICAL CORPORATION

ПИП



«СОГЛАСОВАНО»

Заведующий _____ отделением

« ____ » 2000г.

Памятка

для медицинских сестер отделения реанимации новорожденных в целях профилактики внутрибольничного инфицирования.

Перчатки являются средством профилактики профессионального заражения. Их использование **обязательно** при обслуживании детей, инфицированных любым видом возбудителя: вирусы гепатитов, ВИЧ; возбудители кишечных инфекций, сифилиса; условно-патогенная микрофлора, а также при обслуживании детей, больных или подозрительных на заболевание ВИЧ, ВГ, ОКИ, ГСИ.

Обязательное использование перчаток при проведении инвазивных манипуляций, при которых имеется опасность инфицирования больного.

Помните о том, что антисептик для обработки рук гораздо надежнее мыла.

Его необходимо обязательно использовать после проведения любой манипуляции с больным, а также перед любым подходом к больному.

Медсестра несет ответственность за ребенка, поэтому она обязана контролировать правильность обработки рук всех тех, кто проводит с ребенком любые манипуляции.

Я, медсестра _____

С инструкцией ознакомлена.

Дата _____ Подпись _____