

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ



БЫВАЮТ:

- Индивидуальные:
 1. средства защиты органов дыхания
 2. средства защиты кожи
 3. медицинские средства защиты
 - Коллективные



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Наиболее доступные, простые и надежные в эксплуатации средства защиты органов дыхания (СИЗОД) фильтрующего типа это противогазы и респираторы.



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОТИВОГАЗОМ:

1. Необходимо проверить исправность всех частей противогаза.
2. Удалить мокрой тряпочкой тальк с внутренней поверхности противогаза.
3. Бывшую в употреблении лицевую часть противогаза в целях дезинфекции протереть спиртом или 2%-ным раствором формалина.
4. Надеть противогаз.
5. Убедиться в герметичности противогаза. Для этого закройте отверстие на дне коробки пробкой и сделайте глубокий вдох. Если вдох получается, то маска прилегает не плотно к коже лица. Если вдох не получается, то маска подобрана правильно.



КАК ПРАВИЛЬНО НАДЕТЬ ПРОТИВОГАЗ:

1. Достаньте противогаз из сумки.
2. Задержите дыхание и закройте глаза.
3. Наденьте противогаз. Для этого шлем- маску взять обеими руками за нижнюю часть, так чтобы большие пальцы были снаружи, а все остальные внутри. Подвести шлем-маску к подбородку и резким движением рук вверх и назад натянуть ее на голову так, чтобы не было складок, а очки находились на уровне глаз.
4. Сделайте полный выдох, откройте глаза.



СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ КОЖИ

используют изолирующие плащи и костюмы



МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ

1. пакет перевязочный индивидуальный
2. аптечку индивидуальную
3. индивидуальный противохимический пакет



ПАКЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



Применяется для наложения первичных повязок на раны. Он состоит из бинта (шириной 10 см и длиной 7 м) и двух ватно-марлевых подушечек. Одна из подушечек пришита около конца бинта неподвижно, а другую можно передвигать по бинту. Обычно подушечки и бинт завернуты в воощеную бумагу и вложены в герметичный чехол из прорезиненной ткани, целлофана или пергаментной бумаги. В пакете имеется булавка. На чехле указаны правила пользования пакетом.



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАКЕТОМ

При пользовании пакетом его берут в левую руку, правой захватывают надрезанный край наружного чехла, рывком обрывают склейку и вынимают пакет в вощенной бумаге с булавкой. Из складки бумажной оболочки достают булавку и временно прикалывают ее на видном месте к одежде. Осторожно разворачивают бумажную оболочку, в левую руку берут конец бинта, к которому пришита ватно-марлевая подушечка, в правую — скатанный бинт и разворачивают его. При этом освобождается вторая подушечка, которая может перемещаться по бинту. Бинт растягивают, разводя руки, вследствие чего подушечки расправляются.

Одна сторона подушечки прошита красными нитками. Оказывающий помощь при необходимости может касаться руками только этой стороны. Подушечки кладут на рану другой, не прошитой стороной. При небольших ранах подушечки накладывают одна на другую, а при обширных ранениях или ожогах — рядом. В случае сквозных ранений одной подушечкой закрывают входное отверстие, а второй — выходное, для чего подушечки раздвигаются на нужное расстояние. Затем их прибинтовывают круговыми ходами бинта, конец которого закрепляют булавкой.

Наружный чехол пакета, внутренняя поверхность которого стерильна, используется для наложения герметических повязок. Например, при простреле легкого.

Хранится пакет в специальном кармане сумки для противогаза или в кармане одежды.

К каждому пакету прикрепляется рекомендация по его вскрытию и употреблению.



АПТЕЧКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ



предназначена для оказания самопомощи и взаимопомощи при ранениях и ожогах (для снятия боли), предупреждения или ослабления поражения радиоактивными, отравляющими или сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ), а также для предупреждения заболевания инфекционными болезнями. В аптечке находится набор медицинских средств, распределенных по гнездам в пластмассовой коробочке. Размер коробочки 90x100x20 мм, масса 130 г. Размер и форма коробочки позволяют носить ее в кармане и всегда иметь при себе.

В холодное время года аптечка носится во внутреннем кармане одежды, чтобы исключить замерзание жидкого лекарственного средства.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ



При пользовании необходимо вскрыть оболочку пакета, извлечь флакон и тампоны, отвинтить пробку флакона и его содержимым обильно смочить тампон. Смоченным тампоном тщательно протереть подозрительные на заражение открытые участки кожи и шлем-маску (маску) противогаза. Снова смочить тампон и протереть им края воротника и манжеты, прилегающие к коже. При обработке жидкостью может возникнуть ощущение жжения кожи, которое быстро проходит и не влияет на самочувствие и работоспособность.

Необходимо помнить, что жидкость пакета ядовита и опасна для глаз. Поэтому кожу вокруг глаз следует обтирать сухим тампоном и промывать чистой водой или 2% раствором соды.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

