

Ацетонемічний криз

Запах ацетону з рота

Висока гарячка

Безперервна блювота

**Дитина не п'є, не їсть,
слабне на очах**

Причини ацетономічного кризу

- 1. неправильне харчування (надто жирна їжа, солодощі, голодування);
- 2. Надмірні фізичні навантаження;
- 3. Емоційний стрес;
- 4. Хімічні середники (шампуні із содіум-лаурил-сульфатом (SLS));

Механізми розвитку ацетономічного кризу

- Організм людини одержує енергію з глюкози, яка накопичується в печінці у вигляді ГЛІКОГЕНУ
- В крові людини накопичується велика кількість кетонових тіл (ацетон, ацетооцтова кислота), які блокують вироблення глюкози;
- Запаси глікогену виснажуються (у дітей вони незначні);
- Організм пробує одержати енергію з жирів. Жир розкладається на 3 молекули глюкози і ацетон;

Дії

при ацетономічному кризі:

Викликати

невідкладну швидку допомогу

До приїзду лікаря невідкладна допомога

- 1) Сорбент: Сорбефлор 1-2 таблетки, щогодини;
- 2) Еліксири: для печінки, антианемічний, для підшлункової, для шлунку, очщаючий, по 1-2-3-4-5 крапельок кожні 5 хв + 1 чайна ложка води з еліксами;
- 3) Екстракти: Бетулін, Солодка, Нагідки, Деревій, Ромашка, Артишок, Льон, Чорниця, Розторопша, Лопух, шавлія, М'ята, Пустирник, Валеріана, по 1-2-3-4-5 крапель + 1 чайна ложка води кожні 5 хв.;
- 4) Таблетки: Янтарна формула, апіфлор (+), гастрофлор, гепатофлор, по 1 таблетці під язик щогодини;

До приїзду лікаря невідкладна допомога

- 5) Солодкий чай в мікродозах. (Солодкі напитки чай, компот, узвар);
- 6) Не старайтесь накормити дитину, як їй стане краще, вона сама попросить їсти;
- 7) Якщо блювота не припиняється: очисна клізма (2 тбл. Сорбефлору + 2 чайні ложечки соди на 200 мл прохолодної, літеплої води)

Діагностичні аналізи

- Цукор крові;
- α -амілаза крові;
- Діастаза сечі;
- Експрес-метод: спеціальні тест-полоски на наявність ацетону в сечі; (3-4 плюси – стаціонарне лікування; 1-2 плюси – домашнє лікування)