

Профилактика заболеваний передающихся половым путем

11 класс



Что такое ЗППП?

Заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП), или **инфекции, передаваемые половым путём (ИППП)** — под этими терминами понимают инфекционные заболевания, наиболее частым путём заражения которых является половой контакт.

К инфекционным заболеваниям, передающимся половым путём относятся:

1. **бактериальные инфекции:** паховая гранулёма, сифилис, хламидиоз, гонорея, микоплазмоз, уреаплазмоз;
2. **вирусные инфекции:** ВИЧ, генитальный герпес, гепатит В, цитомегаловирус, Саркома Капоши;
3. **протозойные инфекции:** трихомониаз;
4. **грибковая инфекция:** кандидоз (молочница);
5. **паразитарные заболевания:** фтириаз, чесотка;

Такие заболевания, как кандидозный кольпит, неспецифический уретрит и бактериальный вагиноз, вызываемые условно-патогенной и сапрофитной микрофлорой, **не относятся** к заболеваниям, передающимся половым путём, но нередко рассматриваются в совокупности с ними (и неспециалистами ошибочно причисляются к ним).

ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ




ЕЖЕГОДНО

448



НОВЫХ СЛУЧАЕВ ИЗЛЕЧИМЫХ ИППП:
СИФИЛИС, ГОНОРЕЯ, ХЛАМИДИОЗ И ТРИХОМОНИАЗ

ИППП являются основной предотвратимой причиной бесплодия, особенно у женщин.



ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЕЧЕНИЯ ИППП МОГУТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ

ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОВЫЙ КОНТАКТ. В НЕКОТОРЫХ ИНФЕКЦИЯХ ВОЗМОЖНЫ И ДРУГИЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ: КОНТАКТНО-ВНУТРИУТРОБНЫЙ, ЧЕРЕЗ КРОВЬ.



ПЕРВЫМИ ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИИ МОГУТ БЫТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ МОЧЕПОЛОВОЙ ПУТИ, ЯЗВОЧКИ, ПОКРАСНЕНИЯ, ПУЗЫРЬКИ, МИКРОТРЕЩИНЫ НА КОЖЕ ИЛИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, ЗУДИЛИ ИЛИ ЖЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ИЛИ ПОЛОВОГО КОНТАКТА.



ВАЖНО О ПЕРЕДАВАЕМОСТИ ПРОИСХОЖДЕНИИ ИНФЕКЦИИ ВРЕМЯ СИМПТОМОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ



КОМУ НЕОБХОДИМО СДАТЬ АНАЛИЗЫ?



ИНФЕКЦИИ ВИРУСА ПЕРИВИДИС ОРГАНИЗМА МАТКИ У

ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ХОТЯ БЫ РАЗ В ЖИЗНИ ВСТУПАЛ В НЕЗАЩИЩЕННЫЙ КОНТАКТ БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА



AIDS HEALTHCARE FOUNDATION



НАДЕЖНОСТЬ ИППП ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛОВЫМ ПРЕЗЕРВАТИВом ПРИ КОНТАКТЕ ИППП.



Любой вид половой жизни более или менее связан с риском заражения заболеваниями, передающимися половым путем. Многие считают, что заразиться от человека, у которого нет явных признаков воспаления в области половых органов, невозможно. Однако очень многие инфекции протекают вообще без симптомов, поэтому отсутствие симптомов – еще не повод доверять человеку свое здоровье. Кроме того, половые инфекции передаются далеко не только половым путем, но и через кровь (ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты В и С – при переливании крови, при пользовании общими нестерильными иглами). Сифилис на некоторых своих стадиях даже способен передаваться через поцелуй.



МИФ или ФАКТ?



Лишь 18% опрошенных из России знают, что ЗППП можно заразиться при поцелуе. Менее осведомлены только представители Сербии - 17%, Италии - 15%, Польши - 13%.


Профилактика:



Всегда используйте презерватив при половом контакте



Обращайтесь к врачу при любых симптомах ЗППП



Отказывайтесь от случайных половых связей



Соблюдение правил личной гигиены в интимной жизни (зубные щетки, полотенца, мочалки)

Симптомы у мужчин



PUS

1. Выделения из уретры




PAINFUL URINATION

2. Болезненность в уретре при мочеиспускании

Симптомы у женщин



1. Зуд и жжение во влагалище




2. Выделения из влагалища


Симптомы ЗППП

Наиболее часто наблюдаемые симптомы ЗППП:

1. Выделения из половых органов,
2. Сыпь на лице, губах или в районе гениталий,
3. Запах от половых органов,
4. Покраснение или отек в районе гениталий,
5. Зуд,
6. Боль,
7. Жжение,
8. Увеличение или болезненность лимфоузлов.



Факторы риска ЗППП




Беспорядочные
половые связи



Нерегулярное использование
презервативов



Поврежденная кожа



Наличие сопутствующих ИППП у вас
или у вашего партнера



В чем же опасность ЗППП? +

Проблема, связанная с заболеваниями, передающимися половым путем, намного серьезнее, чем боль и дискомфорт, вызванные инфекцией. Основная опасность таится в последствиях ИППП – в их осложнениях. Они опасны как для мужского здоровья, так и для женского.



Но особенно опасны ИППП для женского здоровья, для последующей беременности – многие инфекции могут передаваться через плаценту или в процессе родов плоду, вызывая у новорожденных серьезные заболевания и осложнения.

Эти инфекции вызывают многочисленные воспалительные заболевания, поражения жизненно важных внутренних и внешних органов и систем организма, нарушают их функции, особенно существенно – репродуктивную функцию, как мужчин, так и женщин, вплоть до бесплодия.



Мифы о ЗППП:

ЗППП у партнера можно определить «на глаз»

Так - надо

Проверяться на ЗППП слишком дорого

ЗППП можно заразиться только при вагинальном сексе

Прерванный половой акт защищает от ЗППП

Спринцевание влагалища после секса защищает от ЗППП

Если у партнера хорошие анализы, значит, все нормально и у меня



А так...
Прошу, не надо!

Спасибо за внимание!



thameerkatguy.com

Ссылки на источники информации:

<https://www.google.ru/imghp?hl=ru>

<https://xn--l1aks.64.xn--b1aew.xn--p1ai/document/6654416>

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Заболевания, передающиеся половым путём#:~:text=Заболевания%2C%20перед ающиеся%20половым%20путём%20\(ЗППП, заражения%20которых%20является%20половой%20онтакт.](https://ru.wikipedia.org/wiki/Заболевания,_передающиеся_половым_путём#:~:text=Заболевания%2C%20перед%20ающиеся%20половым%20путём%20(ЗППП,%20заражения%20которых%20является%20половой%20контакт.)

<https://en.ppt-online.org/250542>

<https://en.ppt-online.org/291135>

<https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zppp-2354841.html>

<https://lusana.ru/presentation/34126>