

БРЮШНОЙ ТИФ

Антропонозное острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением лимфатического аппарата кишечника, бактериемией, выраженной интоксикацией, увеличением печени и селезенки, розеолезной сыпью и в ряде случаев энтеритом

ВОЗБУДИТЕЛЬ

Подвижная палочка рода
САЛЬМОНЕЛЛА

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ

Человек (больной или
бактериовыделитель)

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ

Фекально-оральный, реализуется
водным, пищевым и бытовым путями

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

От нескольких дней до 3 недель (в
среднем 10-14 суток)

ВЫДЕЛЯЮТ ПЕРИОДЫ

Начальный

Период разгара

Период реконвалесценции

ОСЛОЖНЕНИЯ

Инфекционно-токсический шок

Перфорация тонкой кишки

Кишечное кровотечение

СЕСТРИНСКИЙ УХОД

Диета- стол №4 , Пища должна носить механически и химически щадящий характер. Блюда должны быть отварными или протертыми через сито.

Питание дробное, малыми порциями, пищу следует запивать большим количеством жидкости. Режим постельный , обусловлен необходимостью избегать напряжения мышц живота, что может вызвать перфорацию кишки и кровотечение.

Диета и режим должны соблюдаться до конца 4 – недели болезни.