

# **1. Психопатологическая семиотика. Психопатологическая синдромология. 2. Первая помощь при эпилепсии.**

Работу выполнила:  
студентка 2 курса,  
группы 2об-лого2  
Сокол Ольга Павловна

# **Психопатологическая семиотика (психопатологические симптомы)**

**Семиотика** – учение о признаках заболевания, которое объясняет факты, полученные с помощью разных методов обследования больного.

**Симптом** – клиническое проявление, единичный признак (паттерн) нарушения, болезненного состояния какой-либо функции организма.

**Психопатологический симптом** – признак нарушения какой-либо психической функции (например, галлюцинация, бредовая идея, депрессия и т. п.)

# Психопатологическая синдромология

**Синдром** («совместный бег» симптомов) – совокупность симптомов, имеющих общий механизм развития.

**Синдромология** – это область этиологически ясно определяемых заболеваний с многообразными клиническими проявлениями; это область нозологических заболеваний с поражением 2-х и более органов или систем человеческого организма.

# Первая помощь при эпилепсии

Эпилепсия — хроническое, полиэтиологическое заболевание, характеризующееся повторными судорожными и (или) психопатологическими пароксизмами и нередко изменением личности.


Главные компоненты приступа — это:

- судороги;
- потеря сознания;
- нарушение дыхания.




# Первая помощь при эпилепсии

1. Необходимо убедиться, что пациент не травмируется. Поэтому следует уложить пациента на плоскую поверхность, подальше от предметов мебели и других вещей, об которые можно удариться.
2. Поверните голову пациента на бок и подложите под неё что-нибудь мягкое. Так мы не позволим пациенту задохнуться рвотными массами и обезопасим от удара головой об пол.
3. Расстегните одежду на шее и груди пациента.
4. Вызывайте скорую помощь.



# Первая помощь при эпилепсии

1. Не следует пытаться удерживать пациента в неподвижном состоянии. Это не спасёт от судорог, а вот кости вполне можно переломать.
2. Не пытайтесь разжать челюсти пациента. Если они сомкнуты, то настолько сильно, что без травмы вы их не раскроете. Также не стоит вставлять в рот пациента твёрдые предметы, поскольку это грозит сломанными зубами.
3. После завершения припадка положите человека в удобное положение. Лучше всего будет положить его на бок. Не покидайте пострадавшего до приезда врача.



# ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ


## Первая помощь при приступе эпилепсии




МЯГКОЕ ПОД ГОЛОВУ



РАЗВЯЖИТЕ ГАЛСТУК



НАКЛОНИТЕ НА БОК



ЗАФИКСИРУЙТЕ  
ВРЕМЯ ПРИПАДКА




В РОТ НИЧЕГО НЕ  
ВСТАВЛЯТЬ



НЕ ДАВИТЬ



ПОСЛЕ ПРИСТУПА ...



... ПРЕДЛОЖИТЬ  
ПОМОЩЬ

## ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ В ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИПАДКЕ



СЛЕДИТЬ ЗА ГОЛОВОЙ,  
ПОДЛОЖИТЬ МЯГКОЕ



ЗАСЕЧЬ ВРЕМЯ



ПОВЕРНУТЬ НА БОК

НЕ КЛАСТЬ НИЧЕГО В РОТ!

НЕ ДЕРЖАТЬ ТЕЛО

**НЕ**

НЕ ПЕРЕНОСИТЬ ЧЕЛОВЕКА

НЕ ПОДПУСКАТЬ ТОЛПУ