

1. Психопатологическая семиотика. Психопатологическая синдромология. 2. Первая помощь при эпилепсии.

Работу выполнила:
студентка 2 курса,
группы 2об-лого2
Сокол Ольга Павловна

Психопатологическая семиотика (психопатологические симптомы)

Семиотика – учение о признаках заболевания, которое объясняет факты, полученные с помощью разных методов обследования больного.

Симптом – клиническое проявление, единичный признак (паттерн) нарушения, болезненного состояния какой-либо функции организма.

Психопатологический симптом – признак нарушения какой-либо психической функции (например, галлюцинация, бредовая идея, депрессия и т. п.)

Психопатологическая синдромология

Синдром («совместный бег» симптомов) – совокупность симптомов, имеющих общий механизм развития.

Синдромология – это область этиологически ясно определяемых заболеваний с многообразными клиническими проявлениями; это область нозологических заболеваний с поражением 2-х и более органов или систем человеческого организма.

Первая помощь при эпилепсии

Эпилепсия — хроническое, полиэтиологическое заболевание, характеризующееся повторными судорожными и (или) психопатологическими пароксизмами и нередко изменением личности.


Главные компоненты приступа — это:

- судороги;
- потеря сознания;
- нарушение дыхания.




Первая помощь при эпилепсии

1. Необходимо убедиться, что пациент не травмируется. Поэтому следует уложить пациента на плоскую поверхность, подальше от предметов мебели и других вещей, об которые можно удариться.
2. Поверните голову пациента на бок и подложите под неё что-нибудь мягкое. Так мы не позволим пациенту задохнуться рвотными массами и обезопасим от удара головой об пол.
3. Расстегните одежду на шее и груди пациента.
4. Вызывайте скорую помощь.




Первая помощь при эпилепсии

1. Не следует пытаться удерживать пациента в неподвижном состоянии. Это не спасёт от судорог, а вот кости вполне можно переломать.
2. Не пытайтесь разжать челюсти пациента. Если они сомкнуты, то настолько сильно, что без травмы вы их не раскроете. Также не стоит вставлять в рот пациента твёрдые предметы, поскольку это грозит сломанными зубами.
3. После завершения припадка положите человека в удобное положение. Лучше всего будет положить его на бок. Не покидайте пострадавшего до приезда врача.



ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ


Первая помощь при приступе эпилепсии




МЯГКОЕ ПОД ГОЛОВУ



РАЗВЯЖИТЕ ГАЛСТУК



НАКЛОНИТЕ НА БОК




ЗАФИКСИРУЙТЕ
ВРЕМЯ ПРИПАДКА




В РОТ НИЧЕГО НЕ
ВСТАВЛЯТЬ



НЕ ДАВИТЬ



ПОСЛЕ ПРИСТУПА ...



... ПРЕДЛОЖИТЬ
ПОМОЩЬ

ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ В ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИПАДКЕ



СЛЕДИТЬ ЗА ГОЛОВОЙ,
ПОДЛОЖИТЬ МЯГКОЕ



ЗАСЕЧЬ ВРЕМЯ



ПОВЕРНУТЬ НА БОК

НЕ КЛАСТЬ НИЧЕГО В РОТ!

НЕ ДЕРЖАТЬ ТЕЛО

НЕ

НЕ ПЕРЕНОСИТЬ ЧЕЛОВЕКА

НЕ ПОДПУСКАТЬ ТОЛПУ