

Тақырып: Брилл-Цинссер ауруы

Пән: Жұқпалы аурулар.

Топ: 2-ЛД-АК-11

Орындаған: Амантаева Эльмира

Тексерген: Искаков К.А

Анықтамасы

Брилль – Цинссер ауруы


Бөрітпе сүзектің эндогенді рецидив түрі.

Қайталма (5 жылдан соң)

трансмиссивті ауру. Бөрітпе сүзекке

қарағанда ағымы жеңіл, бірақ ауру

белгілері ұқсас.



Эпидемиологиясы

Инфекция көзі: ауру адам.

Берілу механизімі: трансмиссивти(қан арқылы)

Жолы: қан арқылы.




Этиологиясы

- Қоздырғышы; *правачека рикетсиясы*
- Киімде 3 айдан көп
- 56⁰ С 10мин өледі



Патогенезі

Риккетсиялар лимфа түйіндерінің жасушаларында, бауырда, өкпеде ұзақ сақталады. Қоздырғыш қанға түсіп, ауру шақырады. Индетті бөртпе сүзегінің қайталмасы.



Клиникасы

Брилл – Цинссер ауруы

Жасырын кезеңі: ұзақ-5 жыл.

*Синдром: дене қызу 37-38*С 2-3 күн қысқа*



Күтімі


Дене қызуын қадағалау, киім, төсек орнын ауыстыру. Диета №13,15 бортпе байқалғанда тері қабатын күту



Диагностикасы

Эпиданамнез: бұрын індетті бөртпе сүзегімен ауырдыма, жоқ па? Дене қызуы барма, жоқ па?

Серологиялық әдіс: қанды тексереміз. Қанның диагностикалық титрын зерттеу.



Емі

□ Антибиотиктер:

1. Пенициллин
2. Тетрациклин
3. Эритромицин

□ Симптоматикалық:

1. Витаминдер
2. Жүрек-тамыр препараттарын

□ Интоксикациялық:

1. Парацетамол
2. Аспирин



Алдын алу

- ◆ *Науқастардың киімдеріне камералы дезинсекция жүргізіледі.*
- ◆ *Тазалық-киімін уақытылы жуып, киімнің іш жағынан үтіктеу керек.*



*Назар
аударғандарыңызға
РАХМЕТ !*