


8.3 Криволинейные интегралы

8.3.1 Определение криволинейного интеграла по координатам.



- *Интеграл по координате x.*

Пусть AB – дуга непрерывной кривой на плоскости OXY , а $z = P(x, y)$ – произвольная функция, определенная на этой кривой. Разобьем дугу AB на конечное число частичных дуг $M_{i-1}M_i$ с длинами Δl_i ($1; n$). Составим сумму произведений значений функции в каждой точке $(\xi_i, \eta_i) \in M_{i-1}M_i$ на длину Δx_i проекции

дуги $M_{i-1}M_i$ на ось ox :

$$S_n = \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i$$

Если при стремлении к нулю $l = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta l_i$ интегральные суммы S_n имеют конечный предел, то этот предел называется *криволинейным интегралом по переменной x от функции P(x, y) по кривой AB* и обозначается

$$\int_{AB} P(x, y) dx = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max \Delta x_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i$$

• **Криволинейные интегралы по координата общего вида**
(криволинейные интегралы второго рода)

Аналогично вводится криволинейный интеграл по переменной y от функции $Q(x, y)$ по кривой AB

$$\int_{\overline{AB}} Q(x, y) dy = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ (l \rightarrow 0)}} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i$$

Криволинейные интегралы по координата общего вида определяются равенством

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

В случае, если AB – плоская кривая, заданная уравнением $y = f(x)$, то

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{x_A}^{x_B} [P(x, f(x)) + Q(x, f(x)) f'(x)] dx.$$

Если кривая AB задана параметрическими уравнениями

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \quad \text{где } t_1 \leq t \leq t_2, \text{ то}$$

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{t_1}^{t_2} [P[x(t), y(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t)]y'(t)] dt.$$

- **Свойства криволинейного интеграла второго рода.**

1) Криволинейный интеграл при перемене направления кривой меняет знак.

$$\int_{AB} P(x, y) dx = - \int_{BA} P(x, y) dx$$

$$2) \int_{AB} kP(x, y) dx = k \int_{AB} P(x, y) dx,$$

$$3) \int_{AB} (P_1(x, y) + P_2(x, y)) dx = \int_{AB} P_1(x, y) dx + \int_{AB} P_2(x, y) dx$$

$$4) \int_{AB} P(x, y) dx = \int_{AC} P(x, y) dx + \int_{CA} P(x, y) dx$$

5) Криволинейный интеграл по замкнутой кривой L не зависит от выбора начальной точки, а зависит только от направления обхода кривой.

$$\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

Направление обхода контура L задается дополнительно. Если L – замкнутая кривая без точек самопересечения, то направление обхода контура против часовой стрелки называется положительным.

6) Если AB – кривая, лежащая в плоскости, перпендикулярной оси Ox , то

$$\int_{AB} P(x, y) dx = 0.$$

Аналогичные соотношения справедливы при интегрировании по переменным y .

Пример.

Вычислить криволинейный интеграл $\int_L x^2 y dx + x^3 dy$. L – контур, ограниченный параболой $y^2 = x$; $x^2 = y$. Направление обхода контура положительное.


Решение

Представим замкнутый контур $L = O m B n O$ как сумму двух дуг

$$L_1 = O m B: y = x^2 \quad \text{и} \quad L_2 = B n O: y = \sqrt{x}$$

$$\begin{aligned} \oint_L x^2 y dx + x^3 dy &= \int_{L_1} x^2 y dx + \int_{L_1} x^3 dy + \int_{L_2} x^2 y dx + \int_{L_2} x^3 dy = \int_0^1 x^4 dx + \int_0^1 x^3 \cdot 2x dx + \int_1^0 x^2 \sqrt{x} dx + \\ &+ \int_1^0 \frac{x^3}{2\sqrt{x}} dx = \frac{x^5}{5} \Big|_0^1 + \frac{2x^5}{5} \Big|_0^1 + \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{7} \Big|_1^0 + \frac{x^{\frac{3}{2}}}{7} \Big|_1^0 = \frac{3}{5} - \frac{3}{7} = \frac{6}{35}; \end{aligned}$$

$$\text{О т в е т: } \int_L x^2 y dx + x^3 dy = \frac{6}{35}.$$



• Случай параметрически заданной кривой

Если дуга AB непрерывной кривой задана параметрическими уравнениями

$$x=x(t), \quad y=y(t), \quad \text{где } t_1 \leq t \leq t_2, \text{ то}$$

Сделать чертеж.


$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{t_1}^{t_2} [P[x(t), y(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t)]y'(t)]dt.$$

Пример. Вычислить криволинейный интеграл $I = \int_L (xy - 1)dx + x^2 y dy$

по дуге эллипса $x = \cos t, \quad y = 2 \sin t$ от точки $A(1; 0)$ до точки $B(0; 2)$.

Решение:


$$\begin{aligned} \int_L (xy - 1)dx + x^2 y dy &= \int_{t_A}^{t_B} (\cos t \cdot 2 \sin t - 1)(-\sin t dt) + \\ &+ \cos^2 t \cdot 2 \sin t \cdot 2 \cos t dt = \int_0^{\pi/2} (4 \cos^3 t \sin t dt + \sin t - \\ &- 2 \sin^2 t \cos t) dt = \left(-\cos^4 t - \cos t - \frac{2}{3} \sin^3 t \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$



Ответ: $I = \frac{2}{3}$.

Формула Остроградского – Грина

Формула Остроградского – Грина устанавливает связь между криволинейным интегралом и двойным интегралом, т.е. дает выражение интеграла по замкнутому контуру через двойной интеграл по области, ограниченной этим контуром.



Область, ограниченная контуром

Будем считать, что рассматриваемая область **односвязная**, т.е. в ней нет исключенных участков.

Если участки АВ и CD контура принять за произвольные кривые, то, проведя соответствующие преобразования, получим формулу для контура произвольной формы:

$$\oint_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_{\Delta} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dydx$$

Формула Остроградского – Грина во многих случаях позволяет значительно упростить вычисление криволинейного интеграла.

Пример.

Вычислить криволинейный интеграл $\int_L x^2 y dx + x^3 dy$. L – контур, ограниченный параболой $y^2 = x$; $x^2 = y$. Направление обхода контура положительное.


Решение

Найдём интеграл по формуле Остроградского – Грина

$$\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_{\Delta} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dy dx$$

$$\begin{aligned} \oint_L x^2 y dx + x^3 dy &= \iint_{\Delta} (3x^2 - x^2) dy dx = \iint_{\Delta} 2x^2 dy dx = \int_0^1 2x^2 y \Big|_{x^2}^{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 2(x^{\frac{5}{2}} - x^4) dx = \\ &= 2 \left(\frac{2}{7} x^{\frac{7}{2}} - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1 = 2 \left(\frac{2}{7} - \frac{1}{5} \right) = \frac{6}{35}. \end{aligned}$$

О т в е т: $\int_L x^2 y dx + x^3 dy = \frac{6}{35}$.



8. Теория рядов.

8.1. Числовые ряды. Необходимое и достаточные условия сходимости.

Признак Лейбница.

• Числовые ряды.

Сумма членов бесконечной числовой последовательности $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$

называется **числовым рядом** $u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$

Числа u_1, u_2, \dots называют *членами ряда*, а $u_n = \boxed{}$ – *общим членом ряда*.

Суммы $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n = \sum_{k=1}^n u_k$, $n = 1, 2, \dots$ называются **частичными (частными) суммами** ряда.

Ряд $u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ называется **сходящимся**, если сходится

последовательность его частичных сумм $\boxed{}, \boxed{}, \boxed{}, \dots, \boxed{}, \dots \boxed{}$. **Сумма сходящегося ряда** – предел последовательности его частичных сумм на

бесконечности $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, $S_n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$.

Если последовательность частных сумм ряда расходится, т.е. не имеет предела, или имеет бесконечный предел, то ряд называется **расходящимся** и ему не ставят в соответствие никакой суммы.

Свойства рядов.

1) Сходимость или расходимость ряда не нарушится если изменить, отбросить или добавить конечное число членов ряда.

2) Рассмотрим два ряда $\sum u_n$ и $\sum Cu_n$, где C – постоянное число.

3) Если ряд $\sum u_n$ сходится и его сумма равна S , то ряд $\sum Cu_n$ где $C = \text{const}$, тоже сходится, и его сумма равна CS . ($C \neq 0$)

4) Рассмотрим два ряда $\sum u_n$ и $\sum v_n$. **Суммой** или **разностью** этих рядов будет называться ряд $\sum (u_n \pm v_n)$, где элементы получены в результате сложения (вычитания) исходных элементов с одинаковыми номерами.

5) Если ряды $\sum u_n$ и $\sum v_n$ сходятся и их суммы равны соответственно S и σ , то ряд $\sum (u_n \pm v_n)$ тоже сходится и его сумма равна $S \pm \sigma$:

$$\sum (u_n \pm v_n) = \sum u_n \pm \sum v_n = S \pm \sigma$$

6) Сумма сходящегося и расходящегося рядов будет расходящимся рядом.

Замечание. О сумме двух расходящихся рядов общего утверждения сделать нельзя.

• Гармонические

ряды

Гармонические ряды $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ при $p \geq 1$ сходятся, а при $p < 1$ расходятся

Примеры.

А) Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сходится, так как $p = 2$, а $2 > 1$.

В) Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ расходится, так как $p = \frac{1}{2}$, а $\frac{1}{2} < 1$.

• Признак сравнения рядов с неотрицательными членами

Пусть даны два ряда $\sum u_n$ и $\sum v_n$ с неотрицательными членами.

Если начиная с некоторого номера $n \geq n_0$ справедливо равенство $u_n \leq v_n$, то из сходимости ряда $\sum v_n$ следует сходимость ряда $\sum u_n$, а из расходимости ряда $\sum u_n$ следует расходимость ряда $\sum v_n$.

Пример.

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-2}{n^3-3}$ — сходится, так как

$$\begin{cases} n-2 < n \Rightarrow \frac{n-2}{n^3+3} < \frac{n}{n^3+3}; \\ n^3+3 > n^3 \Rightarrow \frac{n}{n^3+3} < \frac{n}{n^3}. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{n-2}{n^3-3} < \frac{n}{n^3+3} < \frac{n}{n^3}.$$

Гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сходится, потому что $p=2, 2>1$.