
Иррациональные уравнения и их системы. Иррациональные неравенства.

Повторение Φ ункция $y = x^n$.

- Сколько корней имеет уравнение $x^n = 10$ при n четном? n нечетном?
- Какие из графиков функций имеют центр симметрии; ось симметрии?



Сравните:

•
$$f(x) = x^{10}$$

a) $f(2) < f(3)$

b) $f(-2) < f(-3)$

e) $f(-2) = f(2)$

e) $f(-2) > 0$

a) $f(3) < f(5)$

e) $f(-3) > f(-5)$

e) $f(-3) < f(3)$

e) $f(-3) < 0$

Найдите ошибку:

1.
$$\frac{((5^3))^2 \cdot 5^4}{5^7} = \frac{5^6 \cdot 5^4}{5^7} = \frac{5^{190}}{5^7} = 5^2 = 1255$$

$$2. \qquad \frac{3^{5} \cdot 27}{81^{2}} = \frac{3^{5} \cdot 3^{3}}{(33^{6})^{2}} = \frac{3^{8}}{3^{8}} = 13^{2} = 9$$

$$3 \cdot \frac{5^6 \cdot 125}{25^4} = \frac{5^6 \cdot 5^3}{\left(5^2\right)^4} = \frac{5^9}{5^8} = 5$$

Решите уравнения:

1.
$$x^2 = 1$$
 Ombem: $x_1 = -1$; $x_2 = 1$


2.
$$x^4 = 16$$
 Omeem: $x_1 = -2$; $x_2 = 2$

3.
$$x^4 = -36$$
 Ответ: Корней нет

4.
$$x^3 = -64$$
 Omeem: $x = -4$

5.
$$x^7 = 0$$
 Omeem: $x = 0$

Задача на внимание



ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ U HEPABEHCTBA

§ 14. ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ и их системы

Вы ознакомитесь с понятием иррационального уравнения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Уравнение, иррациональное уравнение, область допустимых значений переменной, посторонний корень, решение уравнения

вы знаете:

Способы решения рациональных уравнений и их систем.

Теперь перейдем к рассмотрению иррациональных уравнений и их систем.

Иррациональным уравнением называется уравнение, содержащее неизвестное под знаком радикала или под знаком возведения в дробную степень.

Так, иррациональными являются уравнения:

$$\sqrt{x+3} = 2x - 1; \qquad \sqrt{x-1} - 12\sqrt[3]{x} = 3;$$

$$2x^{\frac{1}{3}} - 5 = 0; \qquad (2x - x)^{\frac{1}{3}} = (x+6)^{\frac{1}{4}} + 7x.$$

Для того, чтобы решить иррациональное уравнение, вначале нужно обратить внимание на вид данного уравнения. Это позволяет выяснить, есть ли смысл решать уравнение вообще, а если да, то каким способом. К примеру, нет смысла приступать к решению уравнения $\sqrt[4]{x+3} = -2$,

так как значение арифметического корня не может быть отрицательным

Вы расширите знания по нахождению области допустимых значений переменной.

При решении иррациональных уравнений корни (радикалы), входящие в уравнения, всегда рассматриваются как арифметические корни. Поэтому нужно определить ОДЗ переменной, содержащейся под знаком

Вы научитесь решать иррациональные уравнения методом возведения обеих

Общий метод решения иррациональных уравнений заключается в следующем:

1) если иррациональное уравнение содержит только один радикал, то нужно преобразовать уравнение так, чтобы в одной его части оказался только этот радикал. Затем обе части уравнения возводят в одну и ту же степень, чтобы получилось рациональное уравнение;

2) если в иррациональном уравнении содержится два или более радикала, то сначала изолируется один из радикалов, затем обе части уравнения возводят в одну и ту же степень и повторяют операцию возведения в степень до тех пор, пока не получится рациональное уравнение.

При возведении обеих частей уравнения в одну и ту же степень иногда получается уравнение, не равносильное данному. Поэтому необходимо проверить, удовлетворяют или не удовлетворяют найденные значения переменной искомому уравнению. Проверка является составной частью решения, поскольку некоторые найденные значения переменной могут не удовлетворять исходному уравнению.

Такие значения переменной называют посторонними корнями.

Рассмотрим примеры решения иррациональных уравнений.

ПРИМЕР

1. Решим уравнение $\sqrt{x+2} = x$.

Решение. Возведем обе части уравнения $\sqrt{x+2} = x$ в квадрат. Тогда получим: $x + 2 = x^2$. Квадратное уравнение $x^2 - x - 2 = 0$ имеет корни: $x_1 = 2, x_2 = -1.$

Проверка. 1) x = 2, тогда $\sqrt{2+2} = 2$; 2 = 2 — верно.

2)
$$x = -1$$
, тогда $\sqrt{-1+2} = -1$; $1 = -1$ — неверно.

Следовательно, x = -1 — посторонний корень.

Omeem: 2.

TIPVINIEP

2. Решим уравнение $(x-5)(x+2)\sqrt{x-7}=0$.

Решение. Найдем ОДЗ переменной $x-7\geqslant 0$ или $x\geqslant 7$. Следовательно, $x\in [7;+\infty)$. Исходное уравнение может быть заменено совокупностью уравнений x-5=0,

 $x+2=0, \ \sqrt{x-7}=0.$

Решая эти уравнения, получим: $x_1 = 5, x_2 = -2, x_3 = 7$ (x_1 и x_2 не входят в область допустимых значений данного уравнения).

Omeem: 7.

ПРИМЕР

3. Решим уравнение $\sqrt{x^2 + 5x + 1} + 1 = 2x$. Решение. Уравнение содержит всего один радикал; оставляем

его в левой части равенства, или, как говорят, отделяем радикал, перенося единицу в правую часть: $\sqrt{x^2 + 5x + 1} = 2x - 1$. Возведем обе части полученного уравнения

 $-x^2 + 5x + 1 = 4x^2 - 4x + 1$ в квадрат и получим:

Отсюда $3x^2 - 9x = 0$, $x^2 - 3x = 0$, x(x - 3) = 0, $x_1 - 0$ и x_2

Проверка. $\sqrt{0^2 + 5 \cdot 0 + 1} + 1 \neq 2 \cdot 0$. Следовательно, первый корень x = 0Проверка. $\sqrt{0^2 + 5 \cdot 0} + 1 + 1 \neq 2$ 0. Отбронним корнем (этот корень x = 0 не удовлетворяет уравнению и является посторонним корнем (этот корень де не удовлетворяет уравнению и является поверить). Таким же путем убеждаем принадлежит ОДЗ переменной, что легко проверить). Таким же путем убеждаем ся, что второй корень x=3 удовлетворяет заданному уравнению.

Ответ: 3.



Вы научитесь решать иррациональные уравнения методом замены переменной.

При решении иррациональных уравнений в отдельных случаях используется метод введения новых переменных.

Этот метод применяется с целью приведения иррационального уравнения сложного вида к более простому.

PHMEP

4. Решим уравнение $\sqrt[4]{x} + \sqrt[8]{x} - 2 = 0$.

Pewenue. Обозначим: $y=\sqrt[8]{x}$. Получим уравнение: $y^2+y-2=0$.

которое имеет корни: $y_1 = 1$, $y_2 = -2$.

Следовательно, $\sqrt[8]{x} = 1$ или $\sqrt[8]{x} = -2$. Корень первого уравнения $x_1 = 1$. Второе уравнение не имеет корней, так как $\sqrt[8]{x} \geqslant 0$. Таким образом, решением исходного уравнения является число 1.

Ответ: 1.

TIPUMEP

5. Решим уравнение $\sqrt{1 - x\sqrt{x^2 - 1}} = x - 1$.

Решение. Возведем обе части уравнения в квадрат:

$$1-x\sqrt{x^2-1}=x^2-2x+1$$
 или $-x\sqrt{x^2-1}=x(x-2)$.

Было бы ошибкой "сократить" обе части уравнения на х, так как при этом можно потерять корень, поэтому преобразуем:

$$-x\sqrt{x^2-1}-x(x-2)=0$$
или $-x\left(\sqrt{x^2-1}+(x-2)\right)=0,$

$$-x=0$$
или $\sqrt{x^2-1}+x-2=0,$

$$x=0$$
или $\sqrt{x^2-1}=-x+2.$

Возведем обе части последнего уравнения в квадрат:

$$x^2-1=x^2-4x+4$$
, отсюда $x=\frac{5}{4}$.

Проверка. Найденные значения переменной х подставляем в исходное уравнение. Выясняем, что x = 0 не удовлетворяет данному уравнению, а при $x = \frac{5}{100}$ получаем верное числовое равенство. Следовательно, корнем исходного уравнения является число 5.

Ответ: 7

6. Решим уравнение $(x + 34)^{\frac{1}{3}} - \sqrt[3]{x - 3} = 1$.

решение. Вначале степень с дробным показателем запишем в виде корня. Тогда получим уравнение $\sqrt[3]{x} + 34 - \sqrt[3]{x} - 3 = 1$. Последнее уравнение приведем к виду: $\sqrt[3]{x} + 34 = 1 + \sqrt[3]{x} - 3$ и возведем обе части уравнения в третью степень:

$$x+34=1+3\sqrt[3]{x-3}+3\sqrt[3]{(x-3)^2}+x-3,$$
 $36=3\sqrt[3]{x-3}+3\sqrt[3]{(x-3)^2}$ или $\sqrt[3]{(x-3)^2}+\sqrt[3]{x-3}-12=0.$

Обозначив $y=\sqrt[3]{x-3}$, получим квадратное уравнение $y^2+y-12=0$, которое имеет корни: $y_1=3,\ y_2=-4$. Таким образом, исходное уравнение равносильно совокупности уравнений:

$$\sqrt[3]{x-3} = 3$$
 или $\sqrt[3]{x-3} = -4$.

Возведя обе части уравнений в третью степень, соответственно, получаем: x-3=27 или x-3=-64; отсюда, x=30 или x=-61.

Так как для $y = (x + 34)^{\frac{1}{3}}$ областью допустимых значений является $x + 34 \ge 0$ или $x \ge -34$, то решением уравнения будет число 30.

Ответ: 30.



Вы научитесь решать системы иррациональных уравнений.

Система уравнений, содержащая иррациональные уравнения, на зывается системой иррациональных уравнений.

При решении системы иррациональных уравнений в основног используются методы решения рациональных уравнений и систег рациональных уравнений.

ПРИМЕР

7. Решим систему уравнений
$$\begin{cases} \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = 5, \\ x + y = 35. \end{cases}$$

Решение. Вначале введем новые переменные: $\sqrt[3]{x} = a$, $\sqrt[3]{y} = b$. Тогда данная система уравнений примет вид:

$$\begin{cases} a+b=5, \\ a^3+b^3=35 \end{cases}$$
 или $\begin{cases} a+b=5, \\ a^2-ab+b^2=7. \end{cases}$

Решая методом подстановки последнюю систему уравнений, получим a=2 b=3 и a=3, b=2. Перейдя к замене $\sqrt[3]{x}=a$ и $\sqrt[3]{y}=b$, имеем $\sqrt[3]{x}=2$, $\sqrt[3]{y}=3$ г $\sqrt[3]{x}=3$, $\sqrt[3]{y}=2$. Чтобы найти значения переменных x и y, каждое полученно иррациональное уравнение возводим в третью степень.

Тогда: $x_1 = 8$, $y_1 = 27$ и $x_2 = 27$, $y_2 = 8$.

Проверка: 1)
$$x = 8$$
 и $y = 27$, тогда $\begin{cases} \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{27} = 5, \\ 8 + 27 = 35; \end{cases}$

2)
$$x = 27$$
 и $y = 8$, тогда
$$\begin{cases} \sqrt[3]{27} + \sqrt[3]{8} = 5, \\ 27 + 8 = 35. \end{cases}$$

Все найденные значения переменных x и y удовлетворяют системе уравнений. Ответ: (8; 27) и (27; 8).

- ?
- 1. Какие уравнения могут быть получены в ходе решения иррационального уравнения?
- 2. Почему при решении иррационального уравнения уделяется внимание области допустимых значений переменной?

Упражнения

A

Решите уравнения (14.1—14.4):

14.1. 1)
$$\sqrt{x} = 3$$
;

$$3) \sqrt{x} = 2 - x;$$

14.2. 1)
$$\sqrt[3]{x+2} = 3$$
;

3)
$$3 + \sqrt{x+3} = x$$
:

2)
$$\sqrt{x-3} = 2$$
;

$$4) \sqrt{x-2} = \frac{x}{3}.$$

2)
$$\sqrt[4]{x-3} = 2$$
;

4)
$$5 + \sqrt{x+1} = x$$
.

Решите уравнения

И	A	В
1	$\sqrt{x^2} = 9$	$\sqrt{x^2} = -2$
2	$\sqrt{x} = 4$	$\sqrt[3]{x} = 2$
3	$\sqrt[4]{x+1} = 1$	$\sqrt{4-x}=7$
4	$\sqrt{2x} = -1$	$\sqrt{3x} = 2$
5	$\sqrt[5]{x+7} = 1$	$\sqrt{x-3}=1$
6	$\sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{8}$	$\sqrt[3]{x^2 - 2} = \sqrt[3]{7}$
7	$\sqrt{1-x^2} = 2$	$\sqrt{2-y^2} = 3$
8	$2 + \sqrt{x} = 0$	$-8+\sqrt{y}=0$
9	$\sqrt{x+4}=5$	$\sqrt{x-7} + 3 = 0$
10	$\sqrt{5x-1} = \sqrt{3x+1}$	$(x-4)(x+1)\sqrt{1-x} = 0$
11	$\sqrt[6]{1-y} = 2$	$\sqrt{x+1} + \sqrt{x-2} = -3$
12	$\sqrt{z+2} = \sqrt{2z+3}$	$\sqrt{1-y} = \sqrt{y+4}$