

Отряд воробьиных



(Американский воробей)

Воробьинообразные — это птицы средней и мелкой величины. Самый крупный это ворон, его масса достигает до 1600 грамм. Самые маленькие представители имеют 5-7 грамм и даже некоторые нектарницы 3-4 грамма.





У большинства видов бывает не менее двух кладок за сезон, у некоторых до 5. Насиживание и инкубация яиц длится 11-14 дней. Птенцы вылупляются голыми или слабо опушёнными. Выкармливание выводка в гнезде продолжается 14—17 дней.





Яйца у воробьиных некрупные, обычно пестро окрашенные, но иногда, чаще у видов, гнездящихся в дуплах, однотонные. В кладке чаще бывает 4—6 яиц, у некоторых видов синиц их бывает до 15—16

К воробьиным относят шесть родов, насчитывающих 45 видов.

1) Короткопалые воробьи

2) Снежные вьюрки

3) Настоящие воробьи


4) Каменные воробьи



На основании строения голосовых связок, пальцев ног и других особенностей строения и образа жизни воробьинообразные птицы подразделяются на 4 подотряда: ширококлювы, или рожеклювы; кричащие, или тиранны; полупевчие; певчие.



Ареал обитания воробьиных



Спасибо за внимание.

