

# Чесотка в аспекте инфекций, передаваемых половым путем (по материалам Смоленской области)

Торшина И.Е., Войтенкова Т.А.


Судакова Е.В.

Кафедра дерматовенерологии СГМА  
Областной Центр Госсанэпиднадзора

Чесотка – истинный  
паразитоз кожи,  
вызываемый чесоточным  
клещем – зуднем  
(Sarcoptes Scabies).

**Заражение чесоткой**  
происходит путем **прямого —**  
**тесного и длительного -**  
**контакта, в том числе и**  
**полового, а также**  
**опосредованно через**  
**предметы обихода.**


## Заболѐваемость чесоткой в РФ и Смоленской области (на 100 тыс населения)




# Частота встречаемости чесотки в регионе в 2001 году (100 000)




## Частота встречаемости чесотки среди детского и взрослого населения РФ и Смоленской области (на 100 000)



## Помесячная частота выявления чесотки в Смоленском регионе в 2001 г (%)




**Частота встречаемости чесотки среди больных стационара Смоленского КВД (2001 - 10 мес 2002 г)**




- Все госпитализированные больные
- Больные чесоткой


**Распределение стационарных больных  
чесоткой  
по полу (2001-10 мес 2002 г)**



**Удельный вес городских и сельских жителей,  
больных чесоткой, лечившихся в стационаре  
Смоленского КВД (за 2001 г и 10 мес 2002г)**




## Социальный статус больных чесоткой (%)



■ безработные


■ не состоящие в браке

## Как выявлены больные чесоткой




**Сроки обращения за  
медицинской помощью от  
начала заболевания –  
от 2 недель до года**

## Сочетание чесотки и ИППП (%)



**Количественное соотношение чесотки и других ИППП у стационарных больных за 2001-10 мес 2002 гг (%)**



## Осложнения чесотки:

- распространенная глубокая *пиодермия* у 83 (58%);
- медикаментозный контактный *дерматит* – у 11 (7,7 %);
- *токсидермия* – у 2 больных чесоткой (1,4%)