

Чесотка в аспекте инфекций, передаваемых половым путем (по материалам Смоленской области)

Торшина И.Е., Войтенкова Т.А.


Судакова Е.В.

Кафедра дерматовенерологии СГМА
Областной Центр Госсанэпиднадзора

Чесотка – истинный
паразитоз кожи,
вызываемый чесоточным
клещем – зуднем
(Sarcoptes Scabies).

Заражение чесоткой
происходит путем **прямого —**
тесного и длительного -
контакта, в том числе и
полового, а также
опосредованно через
предметы обихода.


Заболѐваемость чесоткой в РФ и Смоленской области (на 100 тыс населения)



Частота встречаемости чесотки в регионе в 2001 году (100 000)




Частота встречаемости чесотки среди детского и взрослого населения РФ и Смоленской области (на 100 000)



Помесячная частота выявления чесотки в Смоленском регионе в 2001 г (%)




Частота встречаемости чесотки среди больных стационара Смоленского КВД (2001 - 10 мес 2002 г)




- Все госпитализированные больные
- Больные чесоткой


**Распределение стационарных больных
чесоткой
по полу (2001-10 мес 2002 г)**



**Удельный вес городских и сельских жителей,
больных чесоткой, лечившихся в стационаре
Смоленского КВД (за 2001 г и 10 мес 2002г)**




Социальный статус больных чесоткой (%)



■ безработные


■ не состоящие в браке

Как выявлены больные чесоткой




**Сроки обращения за
медицинской помощью от
начала заболевания –
от 2 недель до года**

Сочетание чесотки и ИППП (%)



Количественное соотношение чесотки и других ИППП у стационарных больных за 2001-10 мес 2002 гг (%)



Осложнения чесотки:

- распространенная глубокая *пиодермия* у 83 (58%);
- медикаментозный контактный *дерматит* – у 11 (7,7 %);
- *токсидермия* – у 2 больных чесоткой (1,4%)