

Издательство «Легион»



# Задачи с параметром в ОГЭ



докладчик: Кулабухов Сергей Юрьевич

# Основные виды задач с параметром

1. Линейные уравнения
2. Линейные неравенства
3. Графики уравнений на плоскости  $Oxy$
4. Графики неравенств на плоскости  $Oxy$
5. Квадратные уравнения
6. Разложение квадратного трехчлена на множители.  
Формулы Виета
7. Расположение корней квадратного уравнения относительно заданных точек
8. Дробно-рациональные уравнения. Отбор корней
9. Использование свойств функций и алгебраических выражений
10. Задачи с модулем

# 1. Линейные уравнения

5. Найдите, при каких значениях параметра  $a$  уравнение  $2a^2(x - 1) = a - 3(ax + 1)$  имеет корень, принадлежащий промежутку  $[-3; 2)$ .

*Решение:* Выясним, при каких значениях параметра  $a$  уравнение имеет корни.

$$2a^2x - 2a^2 = a - 3xa - 3;$$

$$2a^2x + 3ax = 2a^2 + a - 3;$$

$$ax(2a + 3) = 2a^2 + a - 3.$$

Если  $a(2a + 3) \neq 0$ , то есть  $a \neq 0$  и  $a \neq -1,5$ , то  $x = \frac{2a^2 + a - 3}{a(2a + 3)}$ ;

$x = \frac{(2a + 3)(a - 1)}{a(2a + 3)}$ ;  $x = \frac{a - 1}{a}$ . Найдём, при каких значениях  $a$  корень

уравнения принадлежит промежутку  $[-3; 2)$ .

$-3 \leq \frac{a-1}{a} < 2$ . Решим систему неравенств:

$$\begin{cases} \frac{a-1}{a} \geq -3, \\ \frac{a-1}{a} < 2; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{4a-1}{a} \geq 0, \\ \frac{-a-1}{a} < 0; \end{cases} \quad \begin{cases} a < 0 \text{ или } a \geq 0,25, \\ a < -1 \text{ или } a > 0. \end{cases}$$

$$a < -1 \text{ или } a \geq 0,25$$

Учитывая, что  $a \neq -1,5$  и  $a \neq 0$ , получим

$$a \in (-\infty; -1,5) \cup (-1,5; -1) \cup [0,25; +\infty).$$

Если  $a = 0$ , уравнение принимает вид  $0 \cdot x = -3$ , корней нет.

Если  $a = -1,5$ , уравнение превращается в тождество  $0 \cdot x = 0$ . Корнем уравнения является любое действительное число, то есть при  $a = -1,5$  уравнение имеет корни, принадлежащие промежутку  $[-3; 2)$ .

Значит, искомые  $a \in (-\infty; -1) \cup [0,25; +\infty)$ .

*Ответ:*  $a \in (-\infty; -1) \cup [0,25; +\infty)$ .

## 2.1. Линейные неравенства

6. Найдите все значения параметра  $p$ , при которых хотя бы одно значение переменной  $x$  из промежутка  $[-3; 2)$  является решением неравенства  $8(-x + p) > 5$ .

*Решение:* Решим неравенство.

$$-8x + 8p > 5;$$

$$-8x > -8p + 5;$$

$$x < \frac{-8p + 5}{-8};$$

$$x < p - \frac{5}{8}.$$

Нам нужно, чтобы хотя бы одно значение из промежутка  $[-3; 2)$  являлось решением неравенства  $x < p - \frac{5}{8}$ . Чтобы понять, какие  $p$  нам подходят, рассмотрим ряд случаев.



1. Все значения  $[-3; 2)$  являются решениями неравенства (см. рис. 3).

В этом случае  $2 \leq p - \frac{5}{8}$  и такие  $p$  нам подходят.




Рис. 3.

2.  $-3 < p - \frac{5}{8} < 2$ . В этом случае часть чисел из промежутка  $[-3; 2)$  являются решениями неравенства, а часть не являются (см. рис. 4). Эти  $p$  нам тоже подходят.






Рис. 4.

3.  $p - \frac{5}{8} = -3$ . Видим, что  $x = -3$  не является решением неравенства в этом случае, а  $x > -3$  не являются решениями тем более (см. рис. 5). Такое  $p$  нам не подходит.



4.  $p - \frac{5}{8} < -3$ . В этом случае ни одно из чисел из промежутка  $[-3; 2)$  не является решением неравенства (см. рис. 6), значит при  $p - \frac{5}{8} < -3$  условие не выполняется.



Мы получили, что при  $p - \frac{5}{8} > -3$ , т.е.  $p > -2\frac{3}{8}$ , условие выполнено.

Ответ:  $p > -2\frac{3}{8}$ .

# 2.2. Системы линейных неравенств

3. При каких значениях параметра  $a$  система неравенств

$$\begin{cases} 3x \leq 5 + ax, \\ 17(x - a) \geq 2(5x + 7) - 17a \end{cases} \quad \text{имеет хотя бы одно решение?}$$

*Решение:* Преобразуем систему:

$$\begin{cases} 3x \leq 5 + ax, \\ 17x - 17a \geq 10x - 17a + 14; \end{cases} \quad \begin{cases} 3x - ax \leq 5, \\ 7x \geq 14; \end{cases} \quad \begin{cases} (3 - a)x \leq 5, \\ x \geq 2. \end{cases} \quad (1)$$

Рассмотрим систему (1).

$$1) a = 3, \quad \begin{cases} 0 \leq 5, \\ x \geq 2; \end{cases} \quad x \geq 2.$$

При  $a = 3$  система (1) имеет решение.



$$2) a < 3, \begin{cases} x \leq \frac{5}{3-a} \\ x \geq 2. \end{cases}$$

Эта система имеет хотя бы одно решение, если  $\frac{5}{3-a} \geq 2$  (см. рис. 11).




Рис. 11.

Так как в этом случае  $a < 3$ , т.е.  $3-a > 0$ , можно неравенство  $\frac{5}{3-a} \geq 2$  умножить на  $3-a$ , получим  $5 \geq 2(3-a)$ ,  $5 \geq 6-2a$ ,  $2a \geq 1$ ,  $a \geq 0,5$ .

При  $\begin{cases} a \geq 0,5, \\ a < 3 \end{cases}$  система (1) имеет решения.

$$3) a > 3. \text{ В этом случае } \begin{cases} x \geq \frac{5}{3-a}, \\ x \leq 2. \end{cases}$$

Эта система при любом  $a > 3$  имеет решения.

Учитывая все рассмотренные случаи, получаем, что исходная система имеет решения при  $a \geq 0,5$ .

*Ответ:*  $a \geq 0,5$ .

# 3.1. Уравнение прямой

1. При каких значениях  $a$  прямая  $y = 2ax + 7$

а) параллельна прямой  $y = (a + 5)x - 3a$ ?

б) совпадает с этой прямой?

*Решение:* Прямые параллельны, если их угловые коэффициенты равны, но свободные коэффициенты не равны:

$$\begin{cases} 2a = a + 5, \\ 7 \neq -3a; \end{cases} \quad \begin{cases} a = 5, \\ a \neq -\frac{7}{3}; \end{cases} \quad a = 5.$$

При  $a = 5$  прямые параллельны.

Прямые совпадают, если равны и угловые, и свободные коэффициенты соответственно, то есть  $\begin{cases} 2a = a + 5, \\ 7 = -3a. \end{cases}$

Эта система не имеет решений, поэтому эти прямые не могут совпадать.

*Ответ:* а)  $a = 5$ , б) нет таких  $a$ .

## 3.2. Взаимное расположение ПРЯМЫХ

3. Найдите все значения параметра  $a$ , при которых прямая  $y = a(x - 2) + 3$  имеет не менее двух общих точек с квадратом, вершины которого находятся в точках  $(-5; 0)$ ,  $(0; 3)$ ,  $(-1; -1)$ .

*Решение:* Построим квадрат  $BCDE$  с заданными вершинами (см. рис. 17).

Найдём координату точки  $D$ . Так как  $DC = BE$  и  $DC \parallel BE$ , то вектор  $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{CD}$ . Координаты  $\overrightarrow{BE} \{-4; 1\}$ , координаты  $\overrightarrow{CD} \{x_D - x_C; y_D - y_C\}$ , то есть  $\{x_D - 0; y_D - 3\}$ . У равных векторов — равные координаты, поэтому  $x_D - 0 = -4$ ,  $x_D = -4$ ,  $y_D - 3 = 1$ ,  $y_D = 4$ . Получим  $D(-4; 4)$ .




Рис. 17.

$y = a(x - 2) + 3$  — семейство прямых, проходящих через точку  $A(2; 3)$ .

По рисунку 17 видно, что при  $a \in (a_1; a_2)$  прямая имеет с квадратом более одной общей точки.



Найдём  $a_1$ . Прямая  $y = a(x - 2) + 3$  проходит через точку  $(-4; 4)$ .

$$a(-4 - 2) + 3 = 4,$$

$$-6a = 1,$$

$$a = -\frac{1}{6}.$$

Найдём  $a_2$ . Прямая проходит через точку  $(-1; -1)$ .

$$a(-1 - 2) + 3 = -1,$$

$$-3a = -4,$$

$$a = \frac{4}{3}.$$

Значит, искомые  $a \in \left(-\frac{1}{6}; \frac{4}{3}\right)$ .

*Ответ:*  $a \in \left(-\frac{1}{6}; \frac{4}{3}\right)$ .

## 3.3. График функции $y=k/x$

4. Найдите, при каких значениях параметра  $p$  уравнение  $p \cdot |x| = \frac{3x - 6}{x^2 - 2x}$  имеет один корень.

*Решение:* Решим задачу графически.

Уравнение  $p \cdot |x| = \frac{3x - 6}{x^2 - 2x}$  имеет столько решений, сколько общих

точек имеют графики  $y = p \cdot |x|$  и  $y = \frac{3x - 6}{x^2 - 2x}$ .

При  $x \geq 0$  график  $y = p \cdot |x|$  — часть прямой  $y = px$ , при  $x < 0$  — часть прямой  $y = -px$ . Несколько графиков такого вида можно увидеть на рисунке 20а.




Рис. 20.

Построим график функции  $y = \frac{3x - 6}{x^2 - 2x}$ . (1)

Найдём область допустимых значений аргумента  $x^2 - 2x \neq 0$ ,  $x \neq 0$ ,  $x \neq 2$ . Упростим уравнение (1):

$$\frac{3x - 6}{x^2 - 2x} = \frac{3(x - 2)}{x(x - 2)} = \frac{3}{x}, \quad y = \frac{3}{x}.$$

График уравнения (1) — гипербола с выколотой точкой (так как  $x \neq 2$ ). По рисунку 20б видно, что графики имеют одну общую точку, если  $p \neq 0$  и если график  $y = p_1 \cdot |x|$  не проходит через точку  $A\left(2; \frac{3}{2}\right)$ .

Найдём  $p_1$ .  $y = p_1|x|$ ,  $\frac{3}{2} = p_1 \cdot |2|$ ,  $p_1 = \frac{3}{2} : 2 = \frac{3}{4}$ .

Значит, исходное уравнение имеет один корень при  $p \neq 0$  и  $p \neq \frac{3}{4}$ .

*Ответ:*  $p \neq 0, p \neq \frac{3}{4}$ .

## 3.4. Окружность

7. Найдите все значения параметра  $a$ , при которых система

$$\begin{cases} y = \sqrt{-x^2 - 6x - 5}, \\ y = a(x - 3) + 2 \end{cases} \text{ имеет решения.}$$

*Решение:* Построим график уравнения

$$y = \sqrt{-x^2 - 6x - 5}, \quad y = \sqrt{4 - (x^2 + 6x + 9)}.$$

Если  $y \geq 0$ , то  $y^2 = 4 - (x + 3)^2$ ,  $(x + 3)^2 + y^2 = 4$ . При  $y < 0$  нет точек, удовлетворяющих уравнению. Получилась полуокружность с центром  $(-3; 0)$  и радиусом 2 (см. рис. 23).




Рис. 23.



$y = a(x - 3) + 2$  — семейство прямых с угловым коэффициентом  $a$ , проходящих через точку  $B(3; 2)$ .

Рассмотрим рисунок 23.

Видно, что кривые имеют общие точки, то есть система уравнений имеет решения, если  $a \in [a_1; a_2]$ .

$a_1 = 0$ . Найдём  $a_2$  из условия, что прямая проходит через точку с координатами  $(-1; 0)$ .

$$a(-1 - 3) + 2 = 0; \quad -4a = -2, \quad a = \frac{1}{2}.$$

Значит, система имеет решения при  $a \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$ .

*Ответ:*  $a \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$ .

# 3.5. Парабола


8. Найдите значение параметра  $a$ , при котором система

$$\begin{cases} y = 2x^2 + 4x - 3, \\ y = ax - 5 - 3a \end{cases} \text{ имеет ровно одно решение.}$$


*Решение:* Уравнение  $y = ax - 5 - 3a$  запишем в виде  $y = a(x - 3) - 5$ .

$y = 2x^2 + 4x - 3$  — парабола с вершиной с координатами

$$x_0 = -\frac{4}{2 \cdot 2} = -1, y_0 = -5 \text{ (см. рис. 29).}$$



а)



б)

Рис. 29.

$$2x^2 + 4x - 3 = ax - 5 - 3a, \quad 2x^2 + (4 - a)x + 3a + 2 = 0.$$

Найдём дискриминант.

$$D = (4 - a)^2 - 4 \cdot 2(3a + 2) = 16 - 8a + a^2 - 24a - 16 = a^2 - 32a = a(a - 32).$$

Квадратное уравнение имеет один корень при  $a = 0$  и  $a = 32$ .

*Ответ:*  $a = 0, a = 32$ .

## 3.6. Кусочные графики

10. Постройте график функции

$$y = \begin{cases} x, & \text{если } x \leq 2, \\ (x - 3)^2 - 1, & \text{если } 2 < x \leq 5, \\ 5,5 - 0,5x, & \text{если } x > 5. \end{cases} \quad (1)$$

При каких значениях  $t$  график уравнения  $y = t$  имеет ровно три общие точки с графиком функции (1)?

*Решение:* Построим график (1).

$y = x$  и  $y = -0,5x + 5,5$  — прямые.

$y = (x - 3)^2 - 1$  — парабола с вершиной  $(3; -1)$ .

График функции (1) изображен на рисунке 30.




Рис. 30.

Прямые вида  $y = t$  параллельны оси абсцисс. По рисунку видно, что три общие точки графики имеют при  $t \in \{-1\} \cup [0; 2]$ .

*Ответ:*  $t \in \{-1\} \cup [0; 2]$ .



## 4. Графики неравенств

11. Найдите все значения параметра  $a$ , при которых неравенство  $x^2 + 4x - 2 + a \geq 0$  не имеет решений, принадлежащих отрезку  $[-3; 0]$ .

*Решение:* Запишем неравенство в виде  $a \geq -x^2 - 4x + 2$  и построим на плоскости  $Oxa$  график этого неравенства.

$a = -x^2 - 4x + 2$  — парабола с вершиной  $(-2; 6)$ ,  $a(-3) = 5$ ,  $a(0) = 2$ .

Множество точек, удовлетворяющих неравенству, показано на рисунке 48.




Рис. 48.

Проведём прямую  $a = a_0$  для нескольких значений параметра  $a$ , например при  $a = -3, a = 2, a = 5$  и  $a = 7$ . При  $a = -3$  все решения неравенства лежат на лучах  $(-\infty; -5]$  и  $[1; +\infty)$ , то есть все точки прямой  $a = -3$ , попадающие в заштрихованную зону.

Соответственно если  $a = 2$ , то  $x \in (-\infty; -4] \cup [0; +\infty)$ ; если  $a = 5$ , то  $x \in (-\infty; -3] \cup [-1; +\infty)$ ; если  $a = 7$ , то  $x$  может быть любым числом.

По рисунку определяем, что при  $a < 2$  неравенство не имеет решений на отрезке  $[-3; 0]$ , при  $a = 2$  имеет одно такое решение  $x = 0$ , при  $a > 2$  таких решений уже бесконечно много.

*Ответ:*  $a < 2$ .

# 5. Квадратные уравнения с параметром

4. При каких значениях параметра  $a$  уравнение  $(a - 8)x^2 + 2ax + a + 1 = 0$  имеет корни?

*Решение:* Если  $a - 8 = 0$  ( $a = 8$ ), то уравнение не является квадратным. Подставим  $a = 8$  в исходное уравнение  $16x + 8 + 1 = 0$ ,  $x = -\frac{9}{16}$  — корень уравнения.

Если  $a \neq 8$ , то уравнение имеет корни при  $D \geq 0$ .

$$D = (2a)^2 - 4 \cdot (a - 8) \cdot (a + 1) = 4a^2 - 4(a^2 - 7a - 8) = 28a + 32.$$

$D \geq 0$  при  $28a + 32 \geq 0$ , т.е.  $a \geq -\frac{32}{28}$ ,  $a \geq -1\frac{1}{7}$ . В этом случае мы должны были бы исключить  $a = 8$ , но при этом значении параметра уравнение тоже имеет корень, значит подойдут все  $a \geq -1\frac{1}{7}$ .

*Ответ:*  $\left[-1\frac{1}{7}; +\infty\right)$ .

# 6.1. Разложение квадратного трехчлена на множители

3. При каких числовых значениях  $m$  выражение  $(4 - m)x^2 + (m + 2)x + m$  является полным квадратом?

*Решение:* Квадратный трёхчлен является полным квадратом, если его можно представить в виде  $(px + q)^2$  или (что то же самое) в виде  $a(x - x_0)^2$ , где  $a > 0$ . Значит, заданное выражение является полным квадратом, если  $4 - m > 0$  и при этом дискриминант  $D$  квадратного уравнения  $(4 - m)x^2 + (m + 2)x + m = 0$  равен нулю.

Найдём  $D$ .

$$D = (m + 2)^2 - 4(4 - m) \cdot m = m^2 + 4m + 4 - 16m + 4m^2 = 5m^2 - 12m + 4.$$

$$5m^2 - 12m + 4 = 0, \text{ если } m = 2 \text{ или } m = \frac{2}{5}.$$

$4 - m > 0$  при  $m < 4$ . Очевидно, что оба значения  $m$  удовлетворяют требуемому условию.

*Ответ:*  $2; \frac{2}{5}$ .



## 6.2. Теорема Виета

4. Дано уравнение  $x^2 - (3p^2 - p + 2)x + 7p + 3 = 0$ . Известно, что сумма его корней равна 4. Найдите произведение его корней и число  $p$ .

*Решение:* По теореме Виета, если данное квадратное уравнение имеет корни  $x_1$  и  $x_2$ , то

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3p^2 - p + 2, \\ x_1 x_2 = 7p + 3. \end{cases}$$

По условию  $x_1 + x_2 = 4$ , тогда  $3p^2 - p + 2 = 4$ ,  $3p^2 - p - 2 = 0$ ,  $p_1 = 1$ ,  $p_2 = -\frac{2}{3}$ .

Если  $p = 1$ ,  $x_1 x_2 = 7 \cdot 1 + 3 = 10$ , если  $p = -\frac{2}{3}$ ,  $x_1 x_2 = 7 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + 3 = -1\frac{2}{3}$ .

Однако мы не нашли  $x_1$  и  $x_2$ , а потому нельзя утверждать, что уравнение будет иметь вещественные корни при найденных значениях  $p$ . При  $p = 1$  уравнение  $x^2 - 4x + 10 = 0$  не имеет вещественных корней, при  $p = -\frac{2}{3}$  уравнение  $x^2 - 4x - \frac{5}{3} = 0$  имеет вещественные корни.

*Ответ:*  $x_1 x_2 = -1\frac{2}{3}$ ,  $p = -\frac{2}{3}$ .

# 7.1. Поиск корней и ограничения

2. Найдите все значения параметра  $m$ , при которых один из корней уравнения  $x^2 - (m + 3)x - 2m^2 + 3m + 2 = 0$  находится между числами 2 и 4, а второй — между числами  $-2$  и 1.

*Решение:* Данное квадратное уравнение имеет дискриминант  $D = (m + 3)^2 - 4 \cdot (-2m^2 + 3m + 2) = m^2 + 6m + 9 + 8m^2 - 12m - 8 = 9m^2 - 6m + 1 = (3m - 1)^2 \geq 0$ , поэтому его корни

$$x_1 = \frac{m + 3 + (3m - 1)}{2} = 2m + 1, \quad x_2 = \frac{m + 3 - (3m - 1)}{2} = -m + 2.$$

Мы не знаем, какой из корней больше, поэтому разберём два случая, чтобы найти искомые значения параметра.

$$1) \begin{cases} 2 < 2m + 1 < 4, \\ -2 < -m + 2 < 1; \\ 1 < m < 1,5. \end{cases} \quad \begin{cases} 1 < 2m < 3, \\ -4 < -m < -1; \end{cases} \quad \begin{cases} 0,5 < m < 1,5, \\ 1 < m < 4; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 2 < -m + 2 < 4, \\ -2 < 2m + 1 < 1; \\ -1,5 < m < 0. \end{cases} \quad \begin{cases} 0 < -m < 2, \\ -3 < 2m < 0; \end{cases} \quad \begin{cases} -2 < m < 0, \\ -1,5 < m < 0; \end{cases}$$

*Ответ:*  $-1,5 < m < 0$  или  $1 < m < 1,5$ .



## 7.2. Сравнения корней с нулем

3. Найдите  $p$ , при которых корни уравнения  $3x^2 + (p + 6)x + p = 0$ :
- а) разного знака (один положительный, другой — отрицательный);
  - б) положительные;
  - в) отрицательные.

*Решение:* Найдём дискриминант уравнения

$$D = (p + 6)^2 - 12p = p^2 + 36.$$

Уравнение при любом значении  $p$  имеет два различных корня, т.к.  $D > 0$ .

а) Корни разного знака (один положительный, другой — отрицательный), если  $x_1 \cdot x_2 = \frac{p}{3} < 0$ , то есть при  $p < 0$ .

б) Оба корня положительные, если  $x_1 \cdot x_2 = \frac{p}{3} > 0$  и

$$x_1 + x_2 = -\frac{p+6}{3} > 0; \quad \begin{cases} p > 0, \\ p + 6 < 0; \end{cases} \quad \begin{cases} p > 0, \\ p < -6; \end{cases} \quad \text{таких } p \text{ нет.}$$

в) Оба корня отрицательные, если

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 \cdot x_2 = \frac{p}{3} > 0, \\ x_1 + x_2 = -\frac{p+6}{3} < 0; \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} p > 0, \\ p+6 > 0; \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} p > 0, \\ p > -6; \end{array} \right. p > 0.$$

Ответ: а)  $p < 0$ ; б) нет таких  $p$ ; в)  $p > 0$ .

## 7.3. Расположение корней квадратичной функции

6. При каких значениях  $a$  любой корень уравнения  $x^2 + 6x + 5 = 0$  меньше любого корня уравнения  $(a - 3)x^2 + 2x - 1 = 0$ ?

*Решение:* Корнями уравнения  $x^2 + 6x + 5 = 0$  являются числа  $-1$  и  $-5$ . Значит, нам нужно, чтобы все корни второго уравнения были больше числа  $\beta = -1$ .

Рассмотрим  $f(x) = (a - 3)x^2 + 2x - 1$ .

Если  $a - 3 = 0$ , то  $x = 0,5$  и этот случай нам подходит.

Обозначим через  $D$  дискриминант, а через  $x_0$  — абсциссу вершины параболы  $y = f(x)$ .

Если  $a - 3 \neq 0$ , то уравнение квадратное и имеет корень, только если  $D \geq 0$ .

$$-1 < x_1 < x_2 \text{ (см. рис. 35), если } \begin{cases} D \geq 0, \\ (a - 3)f(-1) > 0, \\ x_0 > -1. \end{cases}$$




Рис. 35.

$$D = 4 - 4 \cdot (a - 3) \cdot (-1) = 4a - 8, \quad f(-1) = (a - 3) \cdot (-1)^2 + 2 \cdot (-1) - 1 = a - 6,$$

$$x_0 = -\frac{2}{2 \cdot (a - 3)} = -\frac{1}{a - 3}.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 4a - 8 \geq 0, \\ (a - 3)(a - 6) > 0, \\ -\frac{1}{a - 3} > -1; \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} a \geq 2, \\ a < 3 \text{ или } a > 6, \\ 1 - \frac{1}{a - 3} > 0; \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} 2 \leq a < 3 \text{ или } a > 6 \\ \frac{a - 4}{a - 3} > 0; \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 2 \leq a < 3 \text{ или } a > 6 \\ a < 3 \text{ или } a > 4; \end{array} \right. \quad 2 \leq a < 3 \text{ или } a > 6.$$

Учитывая, что  $a = 3$  подходит, получаем  $2 \leq a \leq 3$  или  $a > 6$ .

*Ответ:*  $2 \leq a \leq 3$  или  $a > 6$ .

# 8.1. Простейшие дробно-рациональные уравнения

2. Найдите все значения параметра  $a$ , при которых уравнение  $\frac{(x + a + 1)(x - 3)}{x - 3a} = 0$  имеет только один корень.



*Решение:* Уравнение равносильно системе  $\begin{cases} (x + a + 1)(x - 3) = 0, \\ x - 3a \neq 0. \end{cases}$

Уравнение имеет корни  $x_1 = -a - 1$  или  $x_2 = 3$ , если для них выполняется условие  $x \neq 3a$ .

Рассмотрим те случаи, при которых исходное уравнение может иметь единственный корень. Это возможно, если один из корней уравнения  $(x + a + 1)(x - 3) = 0$  удовлетворяет условию  $x \neq 3a$ , а другой нет или если корни равны, то есть  $x_1 = x_2$ .

$$1) \begin{cases} x_1 = 3a, & \begin{cases} -a - 1 = 3a, \\ 3 \neq 3a; \end{cases} & \begin{cases} a = -0,25, \\ a \neq 1; \end{cases} & a = -0,25. \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x_1 \neq 3a, & \begin{cases} 3 = 3a, \\ -a - 1 \neq 3a; \end{cases} & \begin{cases} a = 1, \\ a \neq -0,25; \end{cases} & a = 1. \end{cases}$$

$$3) -1 - a = 3; a = -4.$$

Значит, уравнение имеет единственный корень при  $a = -4, a = -0,25, a = 1$ .

*Ответ:*  $-4; -0,25; 1$ .

## 8.2. Дробно-рациональные уравнения. Отбор корней

4. Найдите все значения параметра  $a$ , при которых уравнение

$$\frac{x^2 + 6x - 2a}{x^2 + a - 12} = 0 \text{ имеет только один корень.}$$

*Решение:* Попробуем решить задачу аналитически.

Уравнение равносильно системе 
$$\begin{cases} x^2 + 6x - 2a = 0, \\ x^2 + a - 12 \neq 0. \end{cases}$$

Корень в уравнении единственный в одном из двух случаев — если числитель имеет один корень, и этот корень не обращает в нуль знаменатель или если числитель имеет два корня, но один из этих корней обращает знаменатель в нуль, а другой нет.

Проблемы возникают, когда мы найдём нули числителя и знаменателя.

$x^2 + 6x - 2a = 0$ ,  $x_1 = -3 - \sqrt{9 + 2a}$ ,  $x_2 = -3 + \sqrt{9 + 2a}$ , если  $9 + 2a \geq 0$ , то есть  $a \geq -4,5$ .

Корень единственный, если  $9 + 2a = 0$ ,  $a = -4,5$ , тогда  $x = -3$ .

Проверим, обратит ли  $x = -3$  знаменатель в нуль при  $a = -4,5$ .

$$x^2 + a - 12 = (-3)^2 - 4,5 - 12 = -7,5 \neq 0.$$

Значит, при  $a = -4,5$  уравнение  $\frac{x^2 + 6x - 2a}{x^2 + a - 12} = 0$  имеет единственный корень.

Перейдём ко второму случаю. Один корень в заданном уравнении будет, если  $x_1$  и  $x_2$  удовлетворяют таким условиям:

$$\begin{cases} x_1^2 + a - 12 = 0, \\ x_2^2 + a - 12 \neq 0; \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x_2^2 + a - 12 = 0, \\ x_1^2 + a - 12 \neq 0. \end{cases}$$

Видим, что при подстановке  $x_1 = -3 - \sqrt{9 + 2a}$ ,  $x_2 = -3 + \sqrt{9 + 2a}$  системы превращаются в иррациональные и их решение непросто.

Попробуем решить задачу графически.

Построим графики  $x^2 + 6x - 2a = 0$  и  $x^2 + a - 12 = 0$  на плоскости  $Oxa$  (см. рис. 57).

$a = 0,5x^2 + 3x$  — парабола с вершиной  $(-3; -4,5)$ .

$a = 12 - x^2$  — парабола с вершиной  $(0; 12)$ . Она выделена пунктиром, в точках  $A$  и  $B$  решений нет.




Рис. 57.

Найдём точки пересечения этих парабол.

$$0,5x^2 + 3x = 12 - x^2, \quad 1,5x^2 + 3x - 12 = 0,$$

$$x_1 = 2 (a = 8),$$

$$x_2 = -4 (a = -4).$$

$$A(2; 8) \text{ и } B(-4; -4).$$

По рисунку видно, что прямая  $a = a_1$  имеет с параболой  $a = 0,5x^2 + 3x$  одну общую точку (с учётом условия  $a \neq 12 - x^2$ ) при  $a = -4,5$ ,  $a = -4$ ,  $a = 8$ .

*Ответ:*  $-4,5; -4; 8$ .

# 9.1. Использование симметрии алгебраических выражений

1. При каких значениях параметра  $a$  уравнение  $(2a - 3)x^4 + (a + 7)x^2 - 2a^2 - 14a = 0$  имеет единственное решение?



*Решение:* Заметим, что при замене  $x$  на  $-x$  уравнение не изменится, поэтому если  $x_0$  является корнем уравнения, то и  $-x_0$  тоже будет корнем. Значит, необходимое условие единственности корня следующее:  $x_0 = -x_0$ , то есть  $x_0 = 0$  — корень уравнения.

Подставим в уравнение  $x = 0$ .

$$-2a^2 - 14a = 0, \quad -2a(a + 7) = 0, \quad a = 0 \text{ или } a = -7.$$

Теперь нужно проверить, сколько корней при этих значениях  $a$ . Тот факт, что  $x = 0$  является корнем, ещё не означает, что других корней нет.

$$1) \ a = 0, \quad (2 \cdot 0 - 3)x^4 + (0 + 7)x^2 - 0 = 0, \quad -3x^4 + 7x^2 = 0, \\ x^2(7 - 3x^2) = 0, \quad \begin{cases} x^2 = 0, \\ 7 - 3x^2 = 0, \end{cases} \quad x_1 = 0, \quad x_{2,3} = \pm \sqrt{\frac{7}{3}}.$$

Получаем 3 корня.

$$2) \ a = -7, \quad (2 \cdot (-7) - 3)x^4 + 0 - 0 = 0, \quad -17x^4 = 0, \quad x = 0.$$

Получаем 1 корень.

Значит, корень единственный при  $a = -7$

*Ответ:*  $-7$ .

## 9.2. Использование монотонности функций

5. При всех  $a > 0$  найдите корни уравнения  $\frac{a}{x} = x^2 - 2x + a + 1$ , удовлетворяющие условию  $x \geq 1$ .

*Решение:* Попробуем решить эту задачу графически.

Перепишем условие  $\left\{ \begin{array}{l} a > 0, \\ y = \frac{a}{x}, \quad (1) \\ y = (x - 1)^2 + a, \\ x \geq 1. \end{array} \right.$

График уравнения (1) — гипербола, при  $a > 0$  её ветви расположены в *I* и *III* четвертях (см. рис. 38).




Рис. 38.

$y = (x - 1)^2 + a$  — парабола, ветви которой направлены вверх, вершина расположена в точке  $(1; a)$ .

При  $x \geq 1$   $y = (x - 1)^2 + a$  возрастает, а  $y = \frac{a}{x}$  убывает.

Значит, у них не более одной общей точки.

Заметим, что при  $x = 1$  значения этих двух функций совпадают. Значит,  $x = 1$  — единственный корень уравнения, удовлетворяющий заданному условию.

*Ответ:*  $x = 1$ .

## 9.3. Использование ОДЗ и оценка множества значений

6. Решите уравнение  $\sqrt{x-5} + (a-2)x = 7\sqrt{15-3x} + a^2 - 24$  при всех значениях параметра  $a$ .

*Решение:* Найдем ОДЗ.

$$\begin{cases} x - 5 \geq 0; \\ 15 - 3x \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 5; \\ x \leq 5; \end{cases} \quad x = 5.$$

Множество допустимых значений переменной  $x$  состоит из одного числа. Проверим, при каких  $a$  число 5 будет корнем уравнения.

$$\sqrt{5-5} + (a-2) \cdot 5 = 7\sqrt{15-3 \cdot 5} + a^2 - 24,$$

$$5a - 10 = a^2 - 24, \quad a^2 - 5a - 14 = 0, \quad a_1 = -2, \quad a_2 = 7.$$

При других  $a$  корней нет.

*Ответ:* Если  $a = -2, a = 7$ , то  $x = 5$ ; если  $a \neq -2, a \neq 7$ , то корней нет.



7. Найдите, при каких значениях  $m$  и  $n$  выражение  $n^2 + m^2 - 6m + 18n + 3$  принимает наименьшее значение. Какое это значение?

*Решение:* Обозначим через  $A$  и преобразуем заданное выражение.

$$\begin{aligned} A &= n^2 + 18n + m^2 - 6m + 3 = (n^2 + 18n + 81) - \\ &- 81 + (m^2 - 6m + 9) - 9 + 3 = (n + 9)^2 + (m - 3)^2 - 87. \end{aligned}$$

Полный квадрат некоторого выражения принимает наименьшее значение (нуль), если это выражение равно нулю. Так как  $(n + 9)^2 \geq 0$ ,  $(m - 3)^2 \geq 0$ , то  $A \geq -87$ , причём  $A = -87$ , только если

$$\begin{cases} n + 9 = 0, & \begin{cases} n = -9, \\ m = 3. \end{cases} \\ m - 3 = 0; \end{cases}$$

*Ответ:*  $n = -9, m = 3$ ; наименьшее значение  $-87$ .



# 10. Задачи с модулем

6. Найдите все значения параметра  $a$ , при которых уравнение  $|x + 4| + |x - a| = 2a$  имеет корни.

*Решение.*



Запишем уравнение следующим образом:  $|x + 4| + |x - a| - 2a = 0$ . Рассмотрим функцию  $y = |x + 4| + |x - a| - 2a$ . Числовая прямая разбивается на три промежутка, на которых данная функция является линейной.

Если  $\begin{cases} x \leq -4, \\ x \leq a, \end{cases}$  то  $y = -2x - 4 - a$ , функция убывает.

Если  $\begin{cases} x \geq -4, \\ x \geq a, \end{cases}$  то  $y = 2x + 4 - 3a$ , функция возрастает.

Если  $\begin{cases} -4 \leq x \leq a, \\ a \geq -4, \end{cases}$  то  $y = 4 - a$ .

Если  $\begin{cases} a \leq x \leq -4, \\ a \leq -4, \end{cases}$  то  $y = -4 - 3a$ ,



На рисунке а) и б) схематически показан график функции при  $a \geq -4$  и при  $a \leq -4$  соответственно.

Чтобы уравнение  $y(x) = 0$  имело корни, необходимо и достаточно, чтобы график пересекал ось абсцисс.

В случае а)  $\begin{cases} a \geq -4, \\ 4 - a \leq 0, \end{cases} \quad \begin{cases} a \geq -4, \\ a \geq 4, \end{cases} \quad a \geq 4.$

В случае б)  $\begin{cases} a \leq -4, \\ -4 - 3a \leq 0, \end{cases} \quad \begin{cases} a \leq -4, \\ a \geq -\frac{4}{3}, \end{cases} \quad \text{решений нет.}$

Ответ:  $a \geq 4$ .

# Примеры заданий из открытого банка

### Задание 23 (№ 324537)

Постройте график функции  $y = 1 - \frac{x^4 + x^3}{x + x^2}$  и определите, при каких значениях  $m$  прямая  $y = m$  имеет с графиком две общие точки.

### Задание 23 (№ 324550)

Постройте график функции  $y = \frac{(x^2 + 9)(x - 1)}{1 - x}$  и определите, при каких значениях  $k$  прямая  $y = kx$  имеет с графиком ровно одну общую точку.

## Задание 23 (№ 324545)

Найдите  $p$  и постройте график функции  $y = x^2 + p$ , если известно, что прямая  $y = 6x$  имеет с этим графиком ровно одну общую точку.



## Задание 23 (№ 324547)

Постройте график функции  $y = \frac{(x^2 - 2x) |x|}{x - 2}$  и определите, при каких значениях  $m$  прямая  $y = m$  не имеет с графиком ни одной общей точки.