

$L(q(x), h, H)$  шекаралық  
есептің  
меншікті мәндері  
және  
 $\Delta(\lambda)$  характеристикалық  
функцияның нөлдері.

Сонамене

$$\Delta(\lambda) = V(\varphi) = -U(\varphi) \quad (5)$$

$\Delta(\lambda) = \langle \psi, \varphi \rangle$  - характеристикалык түрекүйдөрдөн салынган

Т. 1.1. Характеристикалык  $\Delta(\lambda)$  түрекүйдөрдөн көбінде  $L$  шекаралық есептің  $\{\lambda_n\}$  көбірекшелерін белгесеп.  $\varphi(x, \lambda_n)$ ,  $\psi(x, \lambda_n)$  - мөншікті түрекүйдер болып табылады және

$$\varphi(x, \lambda_n) = \beta_n \psi(x, \lambda_n), \beta_n \neq 0, \exists \{\beta_n\}_{n \geq 0} \quad (6)$$

■ 2)  $\lambda_0$ -санды  $\Delta(\lambda)$  функциясының нөлі, еткеси  $\Delta(\lambda_0)=0$  болса. Сонда  $\langle \psi, \varphi \rangle$  Вронкескин  $x$ -ке тауелсіз болып келет

$$\Delta(\lambda_0)=0=\psi(x, \lambda_0) \cdot \varphi'(x, \lambda_0) - \psi'(x, \lambda_0) \varphi(x, \lambda_0) \Leftrightarrow$$

$$\psi(x, \lambda_0) = \frac{\psi'(x, \lambda_0)}{\varphi'(x, \lambda_0)} \varphi(x, \lambda_0), \text{ еткеси}$$

$$\beta = \frac{\psi'(x, \lambda_0)}{\varphi'(x, \lambda_0)}, \text{ ал } (3) \text{ тәжікік болып келет}$$

$$U(\psi) := \psi(0, \lambda_0) - h \psi(0, \lambda_0) = \begin{cases} \psi(0, \lambda_0) = 1, \\ \psi'(0, \lambda_0) = h, \end{cases} = 0,$$

$$V(\psi) := \psi(\pi, \lambda_0) + H \psi(\pi, \lambda_0) = \begin{cases} \psi(\pi, \lambda_0) = 1, \\ \psi'(\pi, \lambda_0) = -H, \end{cases} = 0.$$

$\psi(x, \lambda_0), \varphi(x, \lambda_0)$  функциялары (2) шарттың калестегінде орнады  $\Rightarrow \lambda_0$  - мемекіті есті,  $\psi(x, \lambda_0), \varphi(x, \lambda_0)$  - мемекіті түрекшілдер.

2) Кепі,  $\lambda_0$ -шектесікі жаңа (Шек. 1-есең)

А  $y_0(x, \lambda_0)$  - сол кесе шектесікі тұрғындауынан  
бөлек. Соңғы (2)  $\Rightarrow$

$$U(y_0) := y_0'(0) - h y_0(0) = 0, \quad y_0 = y_0(x, \lambda_0).$$

$$V(y_0) := y_0'(\bar{x}) + H y_0(\bar{x}) = 0,$$

Демек,  $y_0(0) \neq 0$ , себебі, егер  $y_0(0) = 0$ ,  
онда  $U(y_0) := y_0'(0) - h y_0(0) = 0 \Rightarrow y_0'(0) = 0$ ,  
аңа Кони есебінің шешімдерінің  
множествоғы түрделе тәржеме (!) бойын-  
ша  $y_0(x, \lambda_0) \equiv 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} y_0'(0, \lambda_0) = 0 \Rightarrow y_0(x) = C; \\ y_0(\bar{x}_0) = 0. \end{array} \right.$$

Сондайда  $y_0(0, \lambda_0) \neq 0$ . мәннөмектөр  
шектесін  $y_0(0, \lambda_0) = 1$  даң есендегіде болады.

Тогда из條件  $y_0'(0, \lambda_0) - h y_0(0, \lambda_0) = 0$ ,

находим  $y_0'(0, \lambda_0) = h$ . Таким образом

$$\begin{cases} y_0(0, \lambda_0) = 1, \\ y_0'(0, \lambda_0) = h, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varphi(0, \lambda) = 1, \\ \varphi'(0, \lambda_0) = h, \end{cases}$$

$\forall \lambda \in$  Округе  $y_0(x, \lambda_0) \equiv \varphi(x, \lambda_0)$ . Тогда

по (5):  $\Delta(\lambda) = V(\varphi(x, \lambda_0)) \Rightarrow$

$\Delta(\lambda_0) = V(\varphi(x, \lambda_0)) = V(y_0(x, \lambda_0)) = 0 \Rightarrow$

$\lambda_0$  - критический точка вектора  $\varphi$  в точке

$\Delta(\lambda)$ .



Експеримент. Егер  $y_0(0, \lambda_0) = c \neq 1$ , онда  
 $y'_0(0, \lambda_0) - h y_0(0, \lambda_0) = 0 \Rightarrow y'_0(0, \lambda_0) = c h$ .

Тоңғанда  $y_0(x, \lambda_0) = c \varphi(x, \lambda_0)$ , еттең

$\forall \lambda \rightarrow$  ! мөндеиқті түрекесең  $\varphi(x, \lambda)$   
 тұрақта қадаңынан ~~аптас~~ ғанағириен  
 мендерз.

$$d_n := \int_0^{\pi} \varphi^2(x, \lambda_n) dx. \quad (7).$$

Зад  $\{d_n\}_{n \geq 0}$  категорияның салыстырылған  
 саралып, ал  $\{\frac{d_n}{d_0}, d_n\}_{n \geq 0}$ - ның үшін  
 сандармен бірге деялдеп 0/0 да болады.

Лемма 1.1. Справедливо равенство

$$\beta_n \cdot d_n = - \dot{\Delta}(\lambda_n), \quad (8)$$

т.е.  $\beta_n = \frac{\varphi(x, \lambda_n)}{\varphi(x, \lambda_n)},$  а

$$\dot{\Delta}(\lambda_n) = \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_n} \frac{\Delta(\lambda) - \Delta(\lambda_n)}{\lambda - \lambda_n}.$$

□

~~$$\frac{d}{dx} \langle \varphi(x, \lambda), \varphi(x, \lambda_n) \rangle = (\lambda - \lambda_n) \varphi(x, \lambda) \cdot \varphi(x, \lambda_n).$$~~

$$\frac{d}{dx} \langle \varphi(x, \lambda), \varphi(x, \lambda_n) \rangle = (\lambda - \lambda_n) \varphi(x, \lambda) \cdot \varphi(x, \lambda_n).$$

Доказано генерическое равенство.

$$\frac{d}{dx} \langle \varphi(x, \lambda), \varphi(x, \lambda_n) \rangle = (\varphi(x, \lambda) \cdot \varphi'(x, \lambda_n)) -$$

$$- \varphi'(x, \lambda) \varphi(x, \lambda_n) \Big)_x' = \underbrace{\varphi'(x, \lambda) \cdot \varphi'(x, \lambda_n)} +$$

$$+ \varphi(x, \lambda) \cdot \varphi''(x, \lambda_n) \Big] - [\varphi''(x, \lambda) \cdot \varphi(x, \lambda_n) +$$

$$+ \underbrace{\varphi'(x, \lambda) \varphi'(x, \lambda_n)} \Big] = \varphi(x, \lambda) \varphi''(x, \lambda_n) -$$

$$- \varphi''(x, \lambda) \cdot \varphi(x, \lambda_n) = \begin{cases} -\varphi''(x, \lambda_n) + q(x) \varphi'(x, \lambda_n) = \lambda_n \varphi(x, \lambda_n) \\ -\varphi''(x, \lambda) + q(x) \varphi(x, \lambda) = \lambda \varphi(x, \lambda) \end{cases}$$

$$= \underline{\varphi(x, \lambda)} \Big[ \underbrace{q(x) \varphi(x, \lambda_n)} - \lambda_n \varphi(x, \lambda_n) \Big] -$$

$$- \varphi(x, \lambda_n) \cdot \Big[ \underbrace{q(x) \cdot \varphi(x, \lambda)} - \lambda \varphi(x, \lambda) \Big] = \lambda \varphi(x, \lambda) \varphi(x, \lambda_n) -$$

$$\rightarrow \lambda_n \varphi(x, \lambda) \cdot \varphi(x, \lambda_n) = (\lambda - \lambda_n) \varphi(x, \lambda) \varphi(x, \lambda_n).$$

В доказательстве, вычитаем  
член  $\lambda - \lambda_n$  из части  $\langle \psi(x, \lambda), \varphi(x, \lambda_n) \rangle$ . Тогда

$$(\lambda - \lambda_n) \int_0^{\pi} \psi(x, \lambda) \varphi(x, \lambda_n) dx = \langle \psi(x, \lambda), \varphi(x, \lambda_n) \rangle \Big|_0^{\pi}.$$

$$\begin{aligned} & \langle \psi(x, \lambda), \varphi(x, \lambda_n) \rangle \Big|_0^{\pi} = (\psi(\pi, \lambda) \varphi'(\pi, \lambda_n) - \psi'(\pi, \lambda) \varphi(\pi, \lambda_n)) - \\ & - (\psi(0, \lambda) \varphi'(0, \lambda_n) - \psi'(0, \lambda) \varphi(0, \lambda_n)) = \\ & = [\varphi'(\pi, \lambda_n) + H \varphi(\pi, \lambda_n)] - [\psi(0, \lambda) h - \psi'(0, \lambda)] = \\ & = - \frac{1}{2} [\psi'(0, \lambda) - h \psi(0, \lambda)] + [\varphi'(\pi, \lambda_n) + H \varphi(\pi, \lambda_n)] = \\ & = - (\Delta(\lambda) - \Delta(\lambda_n)). \end{aligned}$$

$$(\lambda - \lambda_n) \int_0^{\pi} \psi(x, \lambda) \varphi(x, \lambda_n) dx = - (\Delta(\lambda) - \Delta(\lambda_n)) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_0^{\pi} \psi(x, \lambda) \varphi(x, \lambda_n) dx = - \frac{\Delta(\lambda) - \Delta(\lambda_n)}{\lambda - \lambda_n} \quad / \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_n}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_n} \int_0^{\pi} \psi(x, \lambda) \varphi(x, \lambda_n) dx = - \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_n} \frac{\Delta(\lambda) - \Delta(\lambda_n)}{\lambda - \lambda_n}.$$

$$\int_0^{\pi} \psi(x, \lambda_n) \varphi(x, \lambda_n) dx = - \dot{\Delta}(\lambda_n).$$

$$\text{T.K. } \psi(x, \lambda_n) = \beta_n \varphi(x, \lambda_n) \Rightarrow$$

$$\int_0^{\pi} \beta_n \cdot \varphi(x, \lambda_n) \cdot \varphi(x, \lambda_n) dx = -\overset{\circ}{\Delta}(\lambda_n) \Rightarrow$$

$$\beta_n \int_0^{\pi} \varphi^2(x, \lambda_n) dx = -\overset{\bullet}{\Delta}(\lambda_n) \Rightarrow$$

$$\beta_n \cdot d_n = -\overset{\circ}{\Delta}(\lambda_n)$$



T. 1.2.  $\{\lambda_n\}$  - меншікі издеғі  $\wedge$   
 $\varphi(x, \lambda_n), \varphi(x, \lambda_n)$  - меншікі түрекүйдеғі  
 нақты издеғі.

$\Delta(\lambda)$  характеристикалык функцияның  
 заректік издеғі  $\{\lambda_n\}$  - мән издеғі,  
 етеш  $\dot{\Delta}(\lambda_n) \neq 0$ .

Әртүрлі меншікі издеғіле  $\lambda_n \neq \lambda_k$   
 сондай  $\{\varphi(x, \lambda_n), \varphi(x, \lambda_k)\}$  V  $\varphi$  меншікі  
 түрекүйдеғі өзаре ~~е~~  $L^2(0; \pi)$  көзін-  
 дінде ортошкалық болады.

◻  $\lambda_n, \lambda_k$  ( $\lambda_n \neq \lambda_k$ ) - собственные значения и  
 $\lambda_n \leftrightarrow y_n(x)$ ,  $\lambda_k \leftrightarrow y_k(x)$ .

$$\int_0^{\pi} (\ell y_n(x)) y_k(x) dx = \int_0^{\pi} y_n(x) (\ell y_k(x)) dx.$$

$$\ell y_n(x) := -y_n''(x) + g(x)y_n(x) \Rightarrow$$

$$\int_0^{\pi} [-y_n''(x) + g(x)y_n(x)] y_k(x) dx = - \int_0^{\pi} y_n''(x) y_k(x) dx + \\ + \int_0^{\pi} g(x) y_n(x) y_k(x) dx = S_1 + S_2.$$

$$S_1 = \int_0^{\pi} y_n''(x) y_k(x) dx = \begin{vmatrix} u = y_k(x) & du \in y_n''(x) \\ du = y_k'(x) dx & v = y_n'(x) \end{vmatrix} = \\ = y_k(x) \cdot y_n'(x) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} y_k'(x) y_n'(x) dx = \begin{vmatrix} u = y_k'(x) & du = y_n'(x) \\ du = y_k''(x) & v = y_n(x) \end{vmatrix} = \\ = \left[ y_k(x) y_n'(x) \Big|_0^{\pi} - (y_k'(x) \cdot y_n(x)) \Big|_0^{\pi} \right] + \int_0^{\pi} y_k''(x) y_n(x) dx \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}
& \left[ y_k(x) y_n'(x) \right] \Big|_0^{\pi} - \left[ y_k'(x) y_n(x) \right] \Big|_0^{\pi} = \\
& = \left( y_k(\pi) y_n'(\pi) - y_k(0) \cdot y_n'(0) \right) - \left( y_k'(\pi) y_n(\pi) \right) - \\
& - y_k'(0) y_n(0) \Big) = \left[ y_k(\pi) \underline{y_n'(\pi)} - \underline{y_k'(\pi)} y_n(\pi) \right] - \\
& - \left[ y_k(0) \underline{y_n'(0)} - \underline{y_k'(0)} y_n(0) \right] = \left\{ \begin{array}{l} \cancel{y_s' + H y_s} \\ y_s'(\pi) + H y_s(\pi) = 0 \\ y_s'(0) - H y_s(0) = 0 \end{array} \right\} \\
& = \left( y_k(\pi) \left[ -H y_n(\pi) \right] - \left[ -H y_k(\pi) \right] \cdot y_n(\pi) \right) - \\
& - \left( y_k(0) \left[ h y_n(0) \right] - \left[ h y_k(0) \right] y_n(0) \right) = 0
\end{aligned}$$

$$S_1 = - \int_0^{\pi} y_k''(x) y_n(x) dx \Rightarrow$$

$$\int_0^{\pi} l y_n(x) y_k(x) dx = \int_0^{\pi} -y_k''(x) y_n(x) dx + \int_0^{\pi} q(x) y_k(x) y_n(x) dx =$$

$$= \int_0^{\pi} y_n(x) \left[ -y_k''(x) + q(x) y_k(x) \right] dx =$$

$$= \int_0^{\pi} y_n(x) l y_k(x) dx .$$

$$\int_0^{\pi} l y_n(x) y_k(x) dx = \int_0^{\pi} y_n(x) l y_k(x) dx$$

prob - bo go kogomo

~~scribble~~

$$ly_n(x) := -y_n''(x) + g(x)y_n(x) \Rightarrow (1) \Rightarrow$$

$$ly_n(x) = \lambda_n y_n(x), \quad \wedge \quad ly_k(x) = \lambda_k y_k(x) \Rightarrow$$

$$\lambda_n \int_0^{\pi} y_n(x) y_{k\epsilon}(x) dx = \lambda_k \int_0^{\pi} y_n(x) y_k(x) dx \Leftrightarrow$$

$$(\lambda_n - \lambda_k) \int_0^{\pi} y_n(x) y_k(x) dx = 0$$

$$\lambda_n \neq \lambda_k \Leftrightarrow \lambda_n - \lambda_k \neq 0 \Leftrightarrow$$

$$\int_0^{\pi} y_n(x) y_k(x) dx = 0.$$

def.  $y_n(x) \perp y_k(x)$  &  $L^2(0; \pi) \iff$

$$(y_n(x), y_k(x))_{L^2(0; \pi)} = 0,$$

$$(y_n(x), y_k(x))_{L^2(0; \pi)} \stackrel{\text{def}}{=} \int_0^\pi y_n(x) y_k(x) dx \iff$$

$y_n(x) \perp y_k(x)$  &  $L^2(0; \pi).$  3) - go k - ko.

Def  $\lambda^0 = u + i v, v \neq 0 ; \lambda^0 \in \mathbb{C}$

$\lambda^0 \iff y^0(x) \not\equiv 0.$

$g(x), h, H \in \mathbb{R} \Rightarrow \bar{\lambda}^0 = u - i v, \bar{\lambda}^0 - c. z.$

$\bar{\lambda}^0 \iff \bar{y}^0(x). \quad \lambda^0 \neq \bar{\lambda}^0 \iff$

$$\|y^0\|_{L^2(0; \pi)} \stackrel{\text{def}}{=} \int_0^\pi y^0(x) \bar{y}^0(x) dx = 0 \iff$$

$y^0(x) \equiv 0. \iff \lambda^0 = \bar{\lambda}^0 \iff v = 0!$

Отсюда также следует, что собственные  
функции  $\varphi(x, \lambda_n)$ ,  $\psi(x, \lambda_n)$  - веществен-  
ные.

Пусть  $\varphi(x, \lambda_n) = u(x, \lambda_n) + i v(x, \lambda_n)$  комплекс-  
нене вещественное. Тогда

$$\varphi''(x, \lambda_n) = u''(x, \lambda_n) + i v''(x, \lambda_n) \quad \text{и}$$

$$-\varphi''(x, \lambda_n) + q(x) \varphi(x, \lambda_n) = \lambda_n \varphi(x, \lambda_n), \text{ след-ко}$$

$\bar{\varphi}(x, \lambda_n) = u(x, \lambda_n) - i v(x, \lambda_n)$  также  
собственная функция. Доказано.

$$\begin{aligned} -\varphi''(x, \lambda_n) + q(x) \varphi(x, \lambda_n) = \lambda_n \varphi(x, \lambda_n) \Rightarrow \\ \left\{ \begin{array}{l} -u''(x, \lambda_n) + q(x) u(x, \lambda_n) = \lambda_n u(x, \lambda_n) \\ -v''(x, \lambda_n) + q(x) v(x, \lambda_n) = \lambda_n v(x, \lambda_n) \end{array} \right. \end{aligned}$$

отсюда, получим второе собственное значение  $(-\lambda_n)$ , т.е.

$$\left\{ \begin{array}{l} -u''(x, \lambda_n) + q(x) u(x, \lambda_n) = \lambda_n u(x, \lambda_n), \\ i v''(x, \lambda_n) - i q(x) v(x, \lambda_n) = -\lambda_n v(x, \lambda_n), \end{array} \right.$$

систему уравнений

$$\begin{aligned} -u''(x, \lambda_n) + i v''(x, \lambda_n) + q(x) (u(x, \lambda_n) - i v(x, \lambda_n)) = \\ = \lambda_n (u(x, \lambda_n) - i v(x, \lambda_n)). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow [u''(x, \lambda_n) - i v''(x, \lambda_n)] + q(x) \bar{\varphi}(x, \lambda_n) = \lambda_n \bar{\varphi}(x, \lambda_n) \\ - \bar{\varphi}''(x, \lambda_n) + q(x) \bar{\varphi}(x, \lambda_n) = \lambda_n \bar{\varphi}(x, \lambda_n). \end{aligned}$$

$\bar{\varphi}(x, \lambda_n) \Leftrightarrow \lambda_n^* - \text{собственное знач.}$

По доказанному получаем.

$$(\lambda_n - \lambda_n^*) \int_0^\pi \varphi(x, \lambda_n) \bar{\varphi}(x, \lambda_n) dx = 0, \text{ а}$$

$$\int_0^\pi \varphi(x, \lambda_n) \bar{\varphi}(x, \lambda_n) dx = \left\| \varphi(x, \lambda_n) \right\|_{L^2(0; \pi)} = 0 \Rightarrow$$

$\varphi(x, \lambda_n) \equiv 0$ , т.к. не вогнуто.

Тогда  $\lambda_n - \lambda_n^* = 0 \Leftrightarrow \lambda_n = \lambda_n^*$  т.к. не

имеет собственное значение, т.е., т.к.  $\Delta(\lambda)$  имеет  
одно и то же значение для  $\lambda_n$  и  $\lambda_n^*$ .

Так как  $\alpha_n = \int_0^{\pi} \varphi_i^2(x, \lambda_n) dx \neq 0$  и  
 $\beta_n \neq 0$ , то

$$\Delta(\lambda_n) \neq 0.$$

Пример 2.1.  $\int q(x) = 0$ ,  $b = H = 0$ ,  
 $\lambda = p^2$ . Так же

$$C(x, \lambda) = \varphi(x, \lambda) = \cos px,$$

$$S(x, \lambda) = \frac{\sin px}{p}$$

$$\Psi(x, \lambda) = \cos p(\pi - x)$$

$$\Delta(\lambda) = -p \sin p\pi;$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda_n = n^2 (n \geq 0), \\ \varphi(x, \lambda_n) = \cos nx; \\ \beta_n = (-1)^n, \\ \alpha_n = ? \end{array} \right.$$

Решение.

$$-y''(x) + g(x)y(x) = \lambda y(x), g(x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$-y''(x) = p^2 y(x) \Leftrightarrow$$

$-y''(x) - p^2 y(x) = 0$ . Характеристическое  
уравнение для  $y$ .

$$-(y''(x) + p^2 y(x)) = 0 \Leftrightarrow k^2 + p^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$k^2 - (ip)^2 = 0 \Leftrightarrow k = \pm ip \Leftrightarrow |k| = p \Leftrightarrow$$

$$y(x) = C_1 e^{ix} + C_2 e^{-ix} (C_1 \cos px + C_2 \sin px), \text{ а } i \cdot k^2 = 0$$

$$y(x) = C_1 \cos px + C_2 \sin px.$$

T.k.  $h=H=0 \Leftrightarrow U(y) = y'(0) = 0, V(y) = y'(\pi) = 0.$

$$y'(x) = -\rho C_1 \sin \rho x + \rho C_2 \cos \rho x, \text{ отсюда}$$

$$x=0 \Rightarrow y'(0) = -\rho C_1 \sin 0 + \rho C_2 \cos 0 = \rho C_2 = 0, C_2 = 0.$$

\* Тогда  $y(x) = C_1 \cos \rho x$ , т.е. ортогональные  
общие решения  $y(x) = \cos \rho x$ , а т.к.

$$y(0) = \cos 0 = 1, \text{ а } y(x) = C(x, \lambda), \text{ т.е.}$$

$$y'(0) = -\rho \sin \rho \cdot 0 = 0, \text{ то}$$

$$C(x, \lambda) = \cos \rho x.$$

Следующим образом

$$\varphi(x, \lambda) = C(x, \lambda) = \cos \rho x.$$

$$\begin{aligned} & \varphi(x, \lambda) : \\ & \left\{ \begin{array}{l} \varphi(0, \lambda) = 1 \\ \varphi'(0, \lambda) = h = 0, \end{array} \right. \end{aligned}$$

$$y(x) = C_1 \cos px + C_2 \sin px.$$

$$S(x, \lambda) : \begin{cases} S(0, \lambda) = 0; \\ S'(0, \lambda) = 1. \end{cases}$$

$$y(0) = C_1 \cos 0 + C_2 \sin 0 = 0 \Rightarrow C_1 = 0.$$

$$y'(x) = -C_1 p \sin px + p C_2 \cos px \Rightarrow$$

$$y'(0) = -C_1 p \sin 0 + p C_2 \cos 0. \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p C_2 = 1 \Rightarrow C_2 = \frac{1}{p}.$$

$$\text{T.O. } C_1 = 0; C_2 = \frac{1}{p} \Rightarrow$$

$$y(x) = \frac{1}{p} \sin px = S(x, \lambda).$$

$$y(x) = C_1 \cos px + C_2 \sin px.$$

$$\psi(x, \lambda) : \begin{cases} \psi(\pi, \lambda) = 1; \\ \psi'(\pi, \lambda) = -H = 0. \end{cases}$$

$$y(\pi) = C_1 \cos p\pi + C_2 \sin p\pi = 1.$$

$$y'(x) = -pC_1 \sin px + pC_2 \cos px \Rightarrow$$

$$y'(\pi) = -pC_1 \sin p\pi + pC_2 \cos p\pi = 0.$$

$$\begin{cases} C_1 \cos p\pi + C_2 \sin p\pi = 1. \\ -C_1 \sin p\pi + C_2 \cos p\pi = 0. \end{cases}$$

$$c_2 = \frac{c_1 \sin p\pi}{\cos p\pi} \Rightarrow$$

$$c_1 \cos p\pi + \frac{c_1 \sin^2 p\pi}{\cos p\pi} = 1 \Rightarrow$$

$$\frac{c_1 \cos^2 p\pi + c_1 \sin^2 p\pi}{\cos p\pi} = 1 \Leftrightarrow c_1 = \cos p\pi \Rightarrow$$

$$c_2 = \sin p\pi \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}\psi(x, \lambda) &= \cos p\pi \cdot \cos px + \sin p\pi \sin px = \\ &= \cos p(\pi - x).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta(\lambda) &= \langle \varphi, \varphi \rangle = \varphi(x, \lambda) \cdot \varphi'(x, \lambda) - \varphi'(x, \lambda) \cdot \varphi(x, \lambda) = \\
 &= \left| \begin{array}{l} \varphi(x, \lambda) = \cos p(\pi - x) \Rightarrow \varphi'(x, \lambda) = p \sin p(\pi - x) \\ \varphi(x, \lambda) = \cos px \Rightarrow \varphi'(x, \lambda) = -p \sin px \end{array} \right| = \\
 &= \cos p(\pi - x) \cdot (-p \sin px) \stackrel{+}{=} p \sin p(\pi - x) \cdot \cos px = \\
 &= -p \left[ (\cos \pi \cdot \cos px + \sin \pi \sin px) \sin px + \right. \\
 &\quad \left. + (\sin \pi \cos px - \cos \pi \sin px) \cos px \right] = -p \cdot \\
 &\quad \cdot \left( \cancel{\cos \pi \cos px \sin px} + \sin \pi \sin^2 px + \sin \pi \cos^2 px - \right. \\
 &\quad \left. - \cancel{\cos \pi \sin px \cdot \cos px} \right) = -p \cdot (\sin \pi \sin^2 px + \sin \pi \cos^2 px) = \\
 &= -p \sin \pi.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \beta_n &= \frac{\psi(x, \lambda_n)}{\varphi(x, \lambda_n)} = \left| \lambda_n = n^2 \right| = \\
 &= \frac{\cos n(\pi - x)}{\cos nx} = \frac{\cos n\pi \cdot \cos nx + \sin n\pi \cdot \sin nx}{\cos nx} = \\
 &= \left| \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \sin n\pi = 0 \right| = \frac{\cos n\pi \cos nx}{\cos nx} = \\
 &= \cos n\pi = (-1)^n. \\
 \beta_n &= (-1)^n.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 d_n &= \int_0^{\pi} \varphi^2(x, \lambda_n) dx = \int_0^{\pi} \cos^2 nx dx = \\
 &= \int_0^{\pi} \frac{1}{2} [1 + \cos 2nx] dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} dx + \\
 &+ \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \cos 2nx dx = \frac{1}{2} \times \left. \right|_0^{\pi} + \\
 &+ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2n} \cdot \sin 2nx \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{2}\pi + \frac{1}{4n} (\sin 2n\pi - 0) = \\
 &= \frac{1}{2}\pi.
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l}
 \lambda = p^2 \\
 C(x, \lambda) = \varphi(x, \lambda) = \cos px; \\
 S(x, \lambda) = \frac{1}{p} \sin px; \\
 \psi(x, \lambda) = \cos p(\pi - x)
 \end{array}
 \quad \left| \quad \Delta(\lambda) = -p \sin p\pi$$

$$\lambda_n = n^2 \quad (n \geq 0)$$

$$\begin{aligned}
 C(x, \lambda_n) &= \cos nx; & S(x, \lambda_n) &= \frac{1}{n} \sin nx; \\
 \psi(x, \lambda) &\approx \cos n(\pi - x) = (-1)^n \cdot \cos nx;
 \end{aligned}$$

$$\Delta(\lambda_n) = -n \cdot \sin n\pi = 0. \quad \lambda_n - \text{нуль.}$$

$$\beta_n = (-1)^n; \quad \alpha_n = \frac{1}{2}\pi = \text{const.}$$

## Задание 2.

Определить вибронесущие  
решения  $y_1(x), y_2(x)$   
диф. ур.

$$1) \quad y'' + (3x - 1)y' + 2y = 0$$

$$2) \quad y'' + (5x + 1)y' - 2y = 0$$

$$3) y'' + (x^2 + 2)y' + y = 0$$

$$4) y'' - (2x+5)y' - y = 0.$$

при методе Фурье

Островадского - Лувинса