



Жыпылық аритмиясы

- Жыпылық аритмия жүрекшелік бұлшықеттердің әр тобының хаосты қозып жиырылуымен жүретін қарыншаустілік тахиаритмияның түрі.
- Ең жиі кездесетін аритмияның түрі. ДЖнің 1-2% осы ауруға шалдыққан.

Классификациясы

Алғашқы жағдай	Алғаш табылған
Пароксизмальді	Приступ 7 күннен аз уақытқа созылады, әдетте 48 сағ аз.
Персистирлеуші	7 күннен асады
Ұзақ персистирлеуші	1 жылдан аса
Тұрақты	Кардиоверсия көмек бермеген не жүргізілмеген ұзақ уақыт сақталған аритмия

ENRA классы	Симптомдары
I	Симптом жоқ
II	Жеңіл симптомдар: өмір сүру дағдысы бұзылмаған
III	Анық симптомдар: Күнделікті белсенділік азайған
IV	Жеке симптомдар: Күнделікті белсенділік жағдайы мүмкін емес

Диагностикасы

- ЭКГ-да
- Р тісшелерінің болмауы
- Фибриляциялық f тісшелерінің пайда болуы
- RR комплекстері интервалдарының әртүрлі болуы

Асқынуы

- Созылмалы жүрек жетіспеушілігі
- Тромбоз
- Ишемиялық инсульт
- Тромбэмболия т.б.

Емі

- 1. Ритмді қадағалау стратегиясы – кардиоверсия арқылы синусты ритмді қайтарып, рецидивтерді болдырмас үшін дәрілік ем қолдану.
- 2. ЖЖЖ қадағалау стратегиясы – жүректің жиырылу жиілігін дәрілік препараттармен