

# Эритематозный кандидоз



# Псевдомембранозный кандидоз



# Гиперпластический кандидоз



Чаще сочетание атрофического с псевдомембранозным кандидозом



Полиморфная эритема, медикаментозная аллергия у  
пациента с пневмоцистной пневмонией




# Ангулярный хейлит



Множественные остроконечные кандилломы на слизистой оболочке щеки



## Широкая кандилома на нёбе





Множественные околоротовые поражения  
КОНТАГИОЗНЫМ МОЛЛЮСКОМ



## Паралич лицевого нерва



Волосистая лейкоплакия - встречается у 98% инфицированных




# Волосистая лейкоплакия




# Волосистая лейкоплакия




# Типичная волосистая лейкоплакия на боковой поверхности языка



# Умеренная волосистая лейкоплакия на языке



Выраженная волосистая лейкоплакия,  
затронувшая спинку языка





# Волосистая лейкоплакия

- у многих больных она служит одним из наиболее ранних признаков инфекции
- бессимптомные очаги ее локализуются на боковой поверхности языка
- в отличие от известной лейкоплакии это - большое атипичное бляшечное поражение, серовато-белое или белое, морщинистое или с гиперкератотическими разрастаниями
- поражение может быть одно- или двусторонним

# Гингивальная эритема



# Гингивальная эритема



# Язвенно-некротический гингивит Венсана




# Язвенно-некротический гингивит Венсана




# Язвенно-некротический гингивит Венсана



# Некротический стоматит с обширным некрозом мягких тканей за деснами




## Некротический язвенный гингивит





## Быстропрогрессирующий пародонтит




## Быстропрогрессирующий пародонтит




# Рецидивирующий герпетический стоматит



## Большая афтозная язва на нёбном язычке




## Незаживающие и обширные язвы на нёбе



# Тромбоцитопеническая пурпура



Экхимоз на мягком нёбе как проявление  
тромбоцитопенической пурпуры



# Тромбоцитопеническая пурпура

характеризуется возникновением на коже и слизистых оболочках петехий, экхимозов, геморралий

поражение слюнных желез сопровождается симптомокомплексом ксеростомии

на фоне резкого снижения иммунитета у больных часто обостряются хронические периапикальные очаги инфекций, они имеют тенденцию к переходу в остеомиелит, не поддаются консервативному лечению

разрезы на слизистой оболочке полости рта заживают долго, микротравмы слизистой оболочки полости рта приводят к длительно незаживающим эрозиям и язвам



# Кавернозная гемангиома




## Саркома Капоши, начальные очаги на лице



# Саркома Капоши, начальные очаги на слизистой оболочке щеки



Саркома Капоши на верхней слизистой оболочке альвеолярного отростка в виде мелкодольчатой опухоли



# Саркома Капоши




# Саркома Капоши



# Саркома Капоши



# Обширная саркома Капоши на небе и деснах





# Обширная Саркома Капоши



## Саркома Капоши, очаги на коже




# Саркома Капоши

- наиболее часто она локализуется в области твердого и мягкого неба, сосочков корня языка
- поражение, как правило, симметричное
- опухоль имеет вид слабо очерченных эритематозных пятен диаметром от 5-10 мм до 5 см либо узелковых разрастаний, плотных эластичных красновато-голубых, пурпурных или буро-коричневого цвета, различных размеров
- высыпания могут изъязвляться и сопровождаться болезненностью
- саркома Капоши протекает вяло, образовавшиеся эрозии не эпителизируются

# Нон-Ходжкинская лимфома



# Неходжкинская лимфома в позадиомолярной области



Болезнь Ходжкина в виде изъязвленной воспалительной десневой опухоли

