

# Перевод с пероральных форм антипсихотиков на пролонгированные

---

## **Перевод пациентов с клопиксола-акуфаз на клопиксол-депо :**

*Одновременно с заключительной инъекцией клопиксола-акуфаз (100 мг) следует ввести 200-400 мг (1-2 мл) клопиксола-депо, 200 мг/мл.*

## **Перевод пациентов с перорального клопиксола на клопиксол-депо :**

*Пероральная суточная доза клопиксола (мг)  $\times$  8 = клопиксол-депо (мг) внутримышечно. Следует продолжать принимать клопиксол перорально во время первой недели после первой инъекции, но в уменьшенной дозе.*

## **Перевод пациентов с перорального флюанксола на флюанксол-депо:**

*Пероральная суточная доза флюанксола (мг)  $\times$  4 = флюанксол-депо (мг) внутримышечно. Следует продолжать принимать флюанксол перорально во время первой недели после первой инъекции, но в уменьшенной дозе.*

## **Перевод пациентов с перорального галоперидола на галоперидол-деканоат:**

*Пероральная разовая доза галоперидола (мг)  $\times$  10 = галоперидол-деканоат (мг) внутримышечно, каждые 4 недели. Начальная доза галоперидола-деканоата не должна превышать 100 мг.*