

# СУСТАВНОЙ СИНДРОМ ПРИ ПОДАГРЕ

# Жалобы

- боль и отечность первого пальца стопы
- ночная боль
- Повышение температуры

# АНАМНЕЗ

- употребление большого количества мяса, молока, икры, рыбы, кофе, какао, шоколада)
- злоупотребление алкоголем
- Болезни почек
- лейкозы
- Прием лекарств — цитостатики, салуретики, противотуберкулезные препараты

# Диагностика

- Гиперурикемия более 0,42 ммоль/л у муж. И 0,36 ммоль/л у жен.
- Моноартрит плюснефалангового сустава
- Наличие характерных кристаллических уратов в суставной жидкости
- Наличие тофусов
- Более чем одна острая атака артрита в анамнезе;

# Рентгенограмма



Figure 1



Figure 2

Симптом пробойника



Топусы

# Принципы терапии

- Диета стол №6
- Урикостатики -аллопуринол
- Урикозурики - антуран, пробенецид
- НПВП - диклофенак, найз

# Лечение острого подагрического

- предпочтительней в течение 24 ч от начала артрита.
- При отсутствии противопоказаний средством выбора являются НПВП
- Колхицин назначают при неэффективности НПВП или наличии противопоказаний (например, лечение варфарином)
- ГКС применяют при наличии противопоказаний для назначения НПВП и колхицина и при множественном поражении суставов
- Аллопуринол является препаратом длительного применения, способствующим уменьшению прогрессирования заболевания, а не препаратом для купирования острого приступа!