

# ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ Кафедра общей и клинической психологии Кафедра стоматологии детского возраста



# Психологический анализ комплаентности пациентов, перенёсших стоматологические и хирургические вмешательства челюстно-лицевой области

#### Выполнили:

Клинический психолог ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» Фиталь Эллина Александровна

Стоматолог-гигиенист, студент 3 курса 302 группы факультета СР и КП Смирнов Вадим Максимович

#### Научные руководители:

Доцент кафедры общей и клинической психологии, к.психол.н., доц. Болучевская В.В. Профессор кафедры стоматологии детского возраста, д.м.н., проф. Маслак Е.Е.



# Определение

- *Комплаенс* (compliance) осознанное сотрудничество между врачом и пациентом, а также членами его семьи, выступающее обязательным условием любого лечения, обеспечивающим его эффективность (Р.В. Кадыров и соавторы).
- ВОЗ определяет комплаенс как «степень соответствия поведения пациента в отношении применения лекарства, выполнение рекомендаций по питанию или изменению образа жизни назначениям и указаниям врача».

## Цель и методики исследования

- Цель исследования: проанализировать уровень комплаентности пациентов, перенёсших стоматологические и хирургические вмешательства челюстно-лицевой области на основе результатов психодиагностического исследования.
- Методики исследования:
- 1) Многофакторный личностный опросник FPI. Форма В (И.Фаренберг, Х.Зарг, Р. Гампел);
- 2) Психологическая диагностика отношения к болезни (методика ТОБОЛ);
- 3) Опросник «Уровень комплаентности» (Р.В. Кадыров, О.Б. Асриян, С.А. Ковальчук);
- 4) Анкета первичных данных;
- 5) Статистический анализ в SPSS 21: корреляционный анализ по Пирсону, сравнение двух независимых выборок по t критерию Стьюдента.

# Характеристика выборки

- Общий объём выборки составили 92 респондента (46 респондентов в основной группе и 46 респондентов в контрольной группе) в возрасте от 18 до 26 лет.
- В основную группу вошли пациенты, которые перенесли стоматологические и хирургические вмешательства в течение последних 6 месяцев с момента последнего вмешательства 33 девушки (71.7%) 13 юношей (28.3%).
- В **контрольную группу** вошли пациенты, которые не переносили вмешательств челюстно-лицевой области от года и более 31 девушка (67.4%) и 15 юношей (32.6%).

# Результаты анкетирования


#### Основная группа

По какой из причин Вы чаще всего не посещаете стоматолога?



#### Контрольная группа

По какой из причин Вы чаще всего не посещаете стоматолога?




# Результаты анкетирования

#### Основная группа

Нужно ли придерживаться рекомендаций стоматолога?


нет

да



#### Контрольная группа


Нужно ли придерживаться рекомендаций стоматолога?



# Результаты анкетирования


#### Основная группа

Всегда ли Вы сами придерживаетесь рекомендаций стоматолога?



#### Контрольная группа

Всегда ли Вы сами придерживаетесь рекомендаций стоматолога?



### Результаты личностного тестирования

- □ Основная группа
- Контрольная группа

От 1 до 3 – низкие значения

шкал

От 4 до 6 − средние

значения шкал

От **7** до **9** - высокие

значения шкал






#### Результаты диагностики типа отношения к болезни




■ Контрольная группа






# Полученные данные уровня комплаентности у основной группы



# Полученные данные уровня комплаентности у контрольной группы



## Статистический анализ полученных данных

- 1) Обе выборки (основная и контрольная) соответствуют закону нормального распределения (р>0.05).
- 2) При проведении корреляционного анализа по Пирсону выявлено следующее: В основной группе:
- •а) Имеется тенденция к образованию корреляционной связи между показателем спонтанной агрессивности и показателем депрессивности (r>0.3); между показателем спонтанной агрессивности и показателем раздражительности (r>0.3).

#### В контрольной группе:

- •а) Имеется тенденция к образованию корреляционной связи между показателем спонтанной агрессивности и показателем реактивной агрессивности (r>0.3).
- 3) При сравнении двух независимых выборок по t критерию Стьюдента выявлены различия при статистической значимости p<0.01.

## Выводы

- 1. Уровень комплаентности основной группы статистически значимо превышает уровень комплаентности контрольной группы (при р<0.01)
- 2. Значимых корреляций между комплаентностью и типом отношения к болезни не выявлено.



# Спасибо за внимание!

