

ACRIOL PRO

A woman with long blonde hair is seated in a dental chair, wearing a white protective face mask. A dentist, wearing a white lab coat and blue gloves, is performing a procedure on her teeth. The background is a bright, clinical setting with other people in blue scrubs.

**Новое лекарственное
средство для анестезии
КОЖИ**

О производителе

Акрихин – люди заботятся о людях **80 лет!**



- 1936 г. Выпуск препарата от малярии Акрихин



- 2016 г. ТОП-5 крупнейших российских фарм. производителей
- более 200 препаратов
- собственный ЦНИР
- GMP

Больше не нужно выбирать между качеством, легальностью и ценой



- Зарегистрированный лекарственный препарат: РУ ЛП-004175 от 03.03.2017
- Доступная цена
- Фармацевтическое качество (сертификат GMP)
- Представлен в удобных форматах упаковок 5, 30 и **100 г**
- Разрешен для применения у детей с 1-го дня жизни

Акриол Про – лекарственный анестезирующий крем для кожи и слизистой половых органов



- Эмульсия
- Высокая концентрация анестетика в каждой капле (до 80%)
- pH 8.7 ускоряет начало действия
- Отсутствие консервантов + анестетики амидного ряда снижают риск аллергии
- Низкий риск возникновения системных токсических эффектов при соблюдении инструкции по применению

Состав:



100 г крема содержит:

действующие вещества:

- лидокаин – 2,5 г
- прилокаин – 2,5 г

вспомогательные вещества:

- ПЭГ-54 гидрогенизированное
касторовое масло – 1,9 г
- карбомер – 1,0 г
- натрия гидроксид – 0,52 г
- вода очищенная – до 100 г

Показания к применению:

- Анестезия кожи
- Анестезия слизистой оболочки половых органов
- Анестезия трофических язв

Области применения:

- Косметология (мезотерапия, контурная пластика, лазерные процедуры, альтерра, пиллинг, эпиляция)
- татуаж и перманентный макияж
- Катеризация сосудов, инъекции
- Поверхностная анестезия трофических язв нижних конечностей при хирургической обработке

Способы применения и дозы

Интактная кожа 1-2,5 г на 10 см²

Показание	Доза и способ нанесения	Время аппликации
При введении иглы, например, при катетеризации сосудов при взятии проб крови	Половина 5 г тюбика (примерно 2 г) на 10 см ² нанести толстым слоем на кожи и покрыть окклюзионной повязкой	1 час, максимум 5 часов
При небольших хирургических манипуляциях, например, при выскабливании контагиозного моллюска, удалении бородавок, небольших косметологических процедурах и эпиляции	1,5-2 г/10 см ² нанести толстым слоем на кожу и покрыть окклюзионной повязкой	1 час, максимум 5 часов
На большие площади свежевывритой кожи (в амбулаторных условиях), в т.ч. перед эпиляцией	<u>Максимальная рекомендуемая доза 60 г</u> , максимально рекомендуемая площадь аппликации 600 см² ; нанести толстым слоем на кожу и покрыть окклюзионной повязкой	1 час, максимум 5 часов
При поверхностных процедурах на больших площадях (в стационарных условиях), например, взятие кожи методом расщепленного лоскута	1,5-2 г/10 см ² нанести толстым слоем на кожу и покрыть окклюзионной повязкой	2 часа, максимум 5 часов

- Технический регламент Таможенного союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции ТР ТС 009/2011 от 23.09.2011 г

Запрещает лидокаин и тетракаин в парфюмерно-косметической продукции

- ФЗ 532

Вводит уголовную ответственность за оборот незарегистрированных лекарственных средств

