

ФУТЕР:

Реклама лекарственного средства. Перед применением лекарственного средства обязательно проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению лекарственного средства.
СТЕРОКОРТ РП МОЗ Украины № UA/7784/01/01 от 17.08.2020
Производитель ПРАТ «ФІТОФАРМ». Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1В, офіс А 504
Сайт: https://fitofarm.ua/ru/

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Остальное - по образу и подобию Адвантан по структуре сайта.
Можно даже тезисы оттуда стянуть. Мы это всё немножко поменяем. Но суть останется та же.
https://advantan.ru/

И лучше, чтобы пока что «с заглушкой», но было прописано место для видео-ролика.
Однажды он у нас будет! ☺️

На каждом листе вот такая кнопка
☺️

Найти в аптеке

http://front.rackwheel.com/sterokort/index.html

Ссылка на фронт сайта.

Реклама лекарственного средства. Перед применением лекарственного средства обязательно проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению лекарственного средства.

СТЕРОКОРТ РП МОЗ Украины № UA/7784/01/01 от 17.08.2020
Производитель ПРАТ «ФІТОФАРМ». Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1В, офіс А 504

Сайт Fitofarm.ua

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

1. Высота этого текста должна занимать 15% от видимого листа.
2. Эта часть должна быть зафиксирована и всё время видима

https://www.theraflex.com.ua/ru

ОБРАЗЕЦ (сайт – хлам, но плашка правильная ☺️)

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

https://www.nazol.ru/

ОБРАЗЕЦ



Давайте добавим

Разрешен детям с 6 месяцев

С 4 мес



Мне нужна сменяющаяся картинка (3 шт) живых людей где-то в этом месте

Это ориентировочные картинки. Правильные выдаст Рубленко. В Пн вышлю.

Дозволений с 4 міс

Швидко усуває прояви алергії на шкірі

Може використовуватися всією родиною

Быстрая

помощь при зуде, воспалении и аллергии на коже

Слоган сюда переносим цвет синий (в цвет надписи Стерокорт)

Действует там, где надо

Стерокорт® – это средство для наружного применения, которое действует только в очаге поражения, не оказывая серьезного воздействия на здоровую кожу. Обладает высокой эффективностью в борьбе с раздражением, зудом, воспалением и аллергией на коже. Достаточно одного нанесения в сутки для облегчения зуда и воспаления.

- ✓ Действует при воспалительных заболеваниях кожи;
- ✓ Стерокорт® действует в очаге воспаления и практически не оказывает негативного воздействия на организм;
- ✓ Редкие побочные реакции и хорошая переносимость;
- ✓ Разрешен детям с 6-ти месяцев во всех лекарственных формах.

ДЕЙСТВУЕТ ТАМ, ГДЕ НЕОБХОДИМО[1]

Стерокорт® – это безрецептурный крем для наружного применения, который действует в очаге поражения, не оказывая серьёзного воздействия на здоровую кожу.
Обладает высокой эффективностью в борьбе с раздражением, зудом, воспалением и аллергией на коже.

- ✔ Имеет выраженный противовоспалительный эффект[1]
- ✔ Действует в очаге воспаления и практически не имеет негативного воздействия на организм[3,4]
- ✔ Подходит для использования на чувствительных участках кожи[3]: лицо, шея, складки
- ✔ Минимум побочных эффектов и хорошая переносимость[1,2]
- ✔ Разрешён детям с 4-х месяцев[1]

1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Стерокорт®
2. Dr Jennifer Pilgrim MB ChB (Otago), FRACP, RESEARCH REVIEW™PRODUCT REVIEW Methylprednisolone aceponate 0.1% ointment/cream www.researchreview.co.nz
3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16409433/ **Methylprednisolone aceponate in eczema and other inflammatory skin disorders -- a clinical update**
4. Luger TA. Balancing efficacy and safety in the management of atopic dermatitis: the role of methylprednisolone aceponateJ EurAcadDermatolVenereol. 2011 Mar; 25(3):251-8.

Действует там, где надо

Стерокорт® – это средство для наружного применения, которое действует только в очаге поражения, не оказывая серьезного воздействия на здоровую кожу. Обладает высокой эффективностью в борьбе с раздражением, зудом, воспалением и аллергией на коже. Достаточно одного нанесения в сутки для облегчения зуда и воспаления.

ПОДРОБНЕЕ О ПРЕПАРАТЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОМФОРТА КОЖЕ ПРИ ЗУДЕ И ПОКРАСНЕНИЯХ

Помогает убрать зуд и покраснение при аллергии и воспалении

Разрешен детям с 4х месяцев[1]

Редкие побочные реакции и хорошая переносимость[2]

Уменьшает интенсивность зуда в течение 2-3 дней от начала лечения[3]

1 – Инструкция по медицинскому применению препарата Стерокорт®. РП UA/7784/01/01
2 – Blume-PeytaviU &WahnU.J Eur AcadDermatol Venereol2011;25:508-15.
3 – Garcia Ponte LG and Ebert U. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012;26(6):9–13.
4 – Е.В.Дворянкова, И.М.Корсунская, Л.Р.Сакания, З.А.Невозинская. К вопросу о рациональном выборе топической терапии при атопическомдерматите. ConsiliumMedicum. Педиатрия. (Прил.) 2015; 01: 70-74.

Стерокорт®

для дітей з 4-х місяців[2] та дорослих

РАБОТАЕТ СИЛЬНО, ЗАБОТИТСЯ НЕЖНО*

- Лёгкая текстура обеспечивает смягчающее и охлаждающее действие на кожу[4]
- Быстро впитывается и не оставляет следов[4]
- Подходит для любого участ

1 раз на добу!

*имеется в виду , что согласно европейской классификации ТГКС метилпреднизолона ацепонат относится к классу III (сильные) и согласно классификации топических глюкокортикоидов по соотношению эффективность/безопасность имеет наивысший терапевтический индекс (согласно данных Немецкого Общества Дерматологов (DDG))

1 – Инструкция по медицинскому применению препарата Стерокорт®. РП UA/7784/01/01

2 – Blume-PeytaviU &WahnU.J Eur AcadDermatol Venereol2011;25:508-15.

3 – Garcia Ponte LG and Ebert U. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012;26(6):9–13.

4 – Е.В.Дворянкова, И.М.Корсунская, Л.Р.Сакания, З.А.Невозинская. К вопросу о рациональном выборе топической терапии при атопическомдерматите. ConsiliumMedicum. Педиатрия. (Прил.) 2015; 01: 70-74

Облегчает симптомы

Стерокорт® - безрецептурный крем для эффективного и безопасного облегчения зуда, воспаления и аллергии на коже

Слово «крем» убрать

убрать

Добавить ссылку 1

Выбрать фигуру круг

Добавить ссылку 2

убрать

Добавить ссылку 3

1 – У 80% детей от 4х месяцев до 4х лет. Vera CasañoA and Rex CavalléJ.Monografiasde Dermatologia2002;15(6):399–408.
2 – CurtoL, et al. J Eur AcadDermatol Venereol2014;28:1356–1362.
3 – NiednerR and ZaumseilRP. AktDermatol 2004; 30:200–203;