

**АО «Медицинский университет Астана»
Кафедра детской инфекции**

**ОПОРНЫЕ ПРИЗНАКИ
ГРИППА И ДРУГИХ ОРВИ**

Астана, 2016 г.

ГРИПП

- эпидемическое повышение заболеваемости в зимне-весенний период;
- острое, внезапное начало;
- выраженный симптом интоксикации достигающий максимального развития в 1-2-е -сутки заболевания, характерна головная боль в области виска, лба, надбровных дуг, глаз, общая слабость, мышечные и суставные боли, снижение аппетита;
- выраженная (39 и более непродолжительная лихорадка, достигающая максимума в 1-2-е сутки заболевания ;
- катаральный синдром для гриппа характерен прежде всего трахеит, сопровождающийся приступообразным сухим кашлем с чувством царапанья и саднения за грудиной; заложенность и скудные слизистые выделениями из носа, болями в горле, особенно при глотании.

ПАРАГРИПП

- чаще болеют дети в возрасте 1-5 лет;
- острое начало с одновременным развитием катарального синдрома и синдрома интоксикации;
- синдром интоксикации выражен умеренно;
- катаральный синдром выражен с 1 дня, характерен грубый, сухой кашель, боли в горле, насморк, заложенность носа;
- нередко первым проявлением является синдром крупа-грубый, лающий кашель, охриплость голоса, шумное дыхание;
- температура тела достигает максимума на 2-3 –е сутки .

АДЕНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- острое начало с последовательным развитием симптомов заболевания(повышается температура и появляются катаральные явления в верхних
- температура повышается постепенно, достигая максимума на 2-3-е сутки;
- наличие выраженного катарального синдрома, преобладающего над синдромом интоксикации, характерны обильные серозные выделения из носа, которые вскоре становятся слизисто-гнойными, влажный кашель, конъюнктивит, сначала поражается один глаз, затем другой;
- увеличение шейных ЛУ;
- гепатоспленомегалия .

РИНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- острое начало;
- слабовыраженная интоксикация;
- выраженный катаральный синдром- к концу 1-х-суток появляются обильные водянисто-серозные выделения, кожа преддверия носа мацерирована ,заложенность носа, чихание, покашливание;.
- температура нормальная или субфебрильная.

РЕОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- острое начало;
- умеренно выраженный симптом интоксикации;
- сочетание назофарингита (слизистые выделения из носа, гиперемия СО миндалин, небных дужек, задней стенки глотки) с энтеритом (жалобы на боли в животе, урчание по ходу тонкой кишки);
- увеличение шейных ЛУ;
- гепатоспленомегалия.

РЕСПИРАТОРНО- СИНЦИТАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- начало острое или постепенное; Субфебрильная или нормальная температура тела.
- отсутствие или слабо выраженный интоксикационный синдром.
- обильные слизистые выделения из носа
- вовлечение в процесс нижних дыхательных путей (бронхиолит-кашель приступообразный , продолжительный, с трудом отделяется густая , вязкая мокрота или пневмония).