



Теория коллективного выбора

Филатов А.Ю.

Институт систем энергетики им.Л.А.Мелентьева,
Иркутский государственный университет

<http://math.isu.ru/filatov>,
<http://polnolunie.baikal.ru/me>,
http://fial_.livejournal.com,
alexander.filatov@gmail.com



Постановка проблемы кооперативного принятия решений

Многие общественно значимые решения не могут приниматься на основе рыночных механизмов, поскольку кооперативные возможности не будут эффективно использованы при децентрализованных действиях агентов.

Примеры:

- Финансирование общественных благ
- Трагедия общины (истощение ресурсов из-за чрезмерного использования)
- Дилемма заключенного (доминирующие стратегии ведут к худшему исходу)
- Асимметричность информации (отрицательный отбор; моральный риск)

Индивидуальные предпочтения → коллективный выбор (принимают все!)

Предположение: пренебрегаем мнением меньшинства; из двух альтернатив побеждает та, за которую проголосовало более 50% человек!

Правило большинства – единственный метод, удовлетворяющий требованиям

1. Анонимность (равноправие избирателей).
2. Нейтральность (равноправие кандидатов).
3. Монотонность (усиление поддержки не подвергает сомнению избрание).

Практика: альтернатив более двух!



Системы голосования

Системы голосования:

- Мажоритарная (Россия, президентские выборы – два тура)
- Пропорциональная (Россия, парламентские выборы, с 2003 года)
- Смешанная (Россия, парламентские выборы, до 2003 года)
- Голосование выборщиков (США, президентские выборы)


Парадоксы «голосования выборщиков»:

- Победитель может набрать меньше голосов избирателей, чем соперник (2000, Буш < Гора)
- Роль «колеблющихся штатов» и неравенство избирателей (Флорида, Нью-Мексико vs Юта)

Выборы-2008 (<http://edition.cnn.com/election/2008/>):

Обама (66,9 млн.) vs МакКейн (58,3 млн.)
 победа МакКейна – смена позиции 0,4 млн.
 или 26,1 млн. (12% голосов) «нужных людей»

- Парадокс Алабамы; парадокс новых штатов; парадокс более быстрого роста населения...



| | | | | | |
|---|---|-------|---|-------|---|
| A | 6 | 4,286 | 4 | 4,714 | 5 |
| B | 6 | 4,286 | 4 | 4,714 | 5 |
| C | 2 | 1,429 | 2 | 1,571 | 1 |



Правило Кондорсе vs Борда

Правило относительного большинства:

3 5 7 6

A A B C A – победитель в голосовании (8 голосов)

B C D B A – наихудший кандидат (13 голосов из 21)

C B C D $C > A$ (13 из 21), $C > B$ (11 из 21), $C > D$ (14 из 21) \Rightarrow

победитель C

D D A A $B > C$: 1 место (7:6), 1–2 м (16:11), 1–3 м (21:21) \Rightarrow

Правило Кондорсе:

победитель B

Победитель по Кондорсе – кандидат, побеждающий любого из соперников при парном сравнении.

Правило Борда (учет рангов кандидатов):

Кандидаты от худшего к лучшему получают ранги $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots$

Победитель по Борда – кандидат с максимальной суммой очков.

Обобщение правила Борда: произвольные шкалы

Правило относительного большинства – 0 0 ... 0 1.

Правило антибольшинства – 0 1 ... 1 1.



Парадокс Кондорсе

Победитель по Кондорсе может отсутствовать: $K > П > Ч > K$

K $Ч$ $П$

$П$ K $Ч$

$Ч$ $П$ K

Вероятности отсутствия победителя по Кондорсе:

p – число кандидатов, n – число избирателей

| p / n | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | предел |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|
| 3 | 0,056 | 0,069 | 0,075 | 0,078 | 0,080 | 0,088 |
| 4 | 0,111 | 0,139 | 0,150 | 0,156 | 0,160 | 0,176 |
| 5 | 0,160 | 0,200 | 0,215 | 0,230 | 0,251 | 0,251 |
| 6 | 0,202 | 0,255 | 0,258 | 0,284 | 0,294 | 0,315 |
| 7 | 0,239 | 0,299 | 0,305 | 0,342 | 0,343 | 0,369 |
| предел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Вариация Коупленда (из Кондорсе): максимизация разницы побед и поражений (выиграть у максимального числа кандидатов).

Вариация Симпсона (из Кондорсе): максимизация наименьшего числа избирателей, голосующих за данного кандидата при парном сравнении с другими (никому сильно не проиграть).



Борда ≠ Кондорсе

Существуют профили предпочтений избирателей, при которых победитель по Кондорсе не может быть избран ни при каком методе подсчета очков!

Пример для строго монотонного правила подсчета очков $s_2 > s_1 > s_0$

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---|--|
| | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| s_2 | A | B | B | C | $A > B$ (4 из 7), $A > C$ (4 из 7) \Rightarrow A – победитель по Кондорсе |
| | | | | | |
| s_1 | B | C | A | A | очки B = = очки A |
| s_0 | C | A | C | B | |

Пример для произвольного правила подсчета очков $s_2 \geq s_1 \geq s_0, s_2 > s_0$

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|
| | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| s_2 | A | B | B | C | $A > B$ (9 из 17), $A > C$ (10 из 17) \Rightarrow A – победитель по Кондорсе |
| | | | | | |
| s_1 | B | C | A | A | очки B = = очки A |
| s_0 | C | A | C | B | |



Профиль Страффина

1 4 1
3
A C E
E
B D A
A
C B D

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | 5 | 5 | 5 | 1 |
| B | 4 | | 5 | 4 | 5 |
| C | 4 | 4 | | 5 | 5 |
| D | 4 | 5 | 4 | | 5 |
| E | 8 | 4 | 4 | 4 | |

Победитель по Кондорсе отсутствует,
у всех есть поражения в парных играх.

Вариация Копленда:
победитель A (+3-1)
B=C=D (+2-2), E (+1-3).

Вариация Симпсона:
победители B=C=D=E (4), A (1).

Правило Борда – классическое и случай произвольных шкал. Победителем может стать любой из кандидатов.

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|---|------|
| 4 | D=1*4+4*0+1*3+3*3=16 | 4 | A=19,6 | 4 | A=19,6 | 4 | A=16 | 9 | A=41 |
| 3 | E=1*3+4*2+1*1+3*2=18 | 3,9 | B=18,9 | 3 | B=18 | 3 | B=24,3 | 8 | B=23 |
| 2 | C=1*2+4*4+1*0+3*0=18 | 2 | C=18 | 2 | C=21,6 | 2,9 | C=18,9 | 2 | C=38 |
| 1 | D=1*1+4*3+1*2+3*1=18 | 1 | D=21,6 | 1 | D=18 | 1 | D=18,9 | 1 | D=38 |
| 0 | E=1*0+4*1+1*4+3*4=20 | 0 | E=20 | 0,9 | E=20,9 | 0 | E=20 | 0 | E=40 |



Аксиоматический подход

- 1. Однозначность** – правило всегда дает сделать однозначный выбор. **Не выполняется** для анонимных и нейтральных правил, если n имеет делитель $\leq p$.
- 2. Анонимность (равноправие избирателей)** – имена избирателей не имеют значения: если два избирателя поменяются голосами, то результат выборов не изменится. **Не выполняется**, если при равенстве победителем становится **выбранный определенным избирателем**.
- 3. Нейтральность (равноправие альтернатив)** – имена кандидатов не имеют значения: если поменять местами кандидатов A и B в предпочтении каждого избирателя, то исход голосования изменится соответственно. **Не выполняется**, если при равенстве победителем становится **определенный кандидат**.
- 4. Состоятельность по Кондорсе** – правило всегда выбирает победителя по Кондорсе, если он существует. **Не выполняется** для любых методов подсчета очков, в т.ч. для правила относительного большинства, правила Борда и т.д.
- 5. Парето-эффективность (единогласие)** – если кандидат A для всех избирателей лучше B , то B не может быть избранным. **Не выполняется** для правила **антибольшинства**.



Последовательные сравнения по правилу большинства

1. Не выполняется нейтральность. Повестка определяет контроль над выборами.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------|--|----------|
| A | A | D | D | B | $A > B,$ | | Побед. A |
| A | A | D | D | B | $A > C,$ | | |
| B | B | B | C | C | $B > C,$ | | |
| B | B | B | C | C | $B > D,$ | | |
| C | C | A | A | D | $C > D,$ | | |

| | |
|--|----------|
| | Побед. B |
| | Побед. C |
| | Побед. D |

2. Не выполняется Парето-эффективность.

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|---|--|
| B | D | C | B | A | |
| A | D | B | $A < B < C < D,$ | | |
| D | C | A | при этом $A > D$ | | |
| C | B | D | для всех избирателей | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| D | D | C | C | | |
| A | A | D | D | | |
| C | C | A | A | | $A > B, C > D, A > C$ (при равенстве голосов) |
| B | B | B | B | | при этом $D > A$ для всех избирателей |



Аксиоматический подход

6. Монотонность – увеличившаяся поддержка кандидата не может уменьшить шанса быть избранным. **Не выполняется для относительного большинства с выбыванием (голосования в 2 тура).**

профиль 1: профиль 2:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | Профиль 1: выходят A и B, $A > B$ (11:6) |
| A | C | B | B | A | C | B | A | Профиль 2: A улучшает свое положение, |
| B | A | C | A | B | A | C | B | выходят A и C, $C > A$ (9:8). |
| C | B | A | C | C | B | A | C | |

Не выполняется для правила альтернативных голосов (последовательного исключения неудачников) для любого способа подсчета очков.

| | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | Шаг 1: исключается C, | |
| s_2 | A | B | B | C | C | A | $9s_1 + 8s_2 < \min\{10s_1 + 9s_2; 8s_1 + 10s_2\}$. | |
| s_1 | B | A | C | B | A | C | Шаг 2: $A > B$ (15:12). | |
| $s_0=0$ | | C | C | A | A | B | B | |
| | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | В выделенных столбцах A становится лучше B | | |
| s_2 | A | B | B | C | A | Шаг 1: исключается B, | | |
| s_1 | B | A | C | A | C | $9s_1 + 7s_2 < \min\{9s_1 + 12s_2; 9s_1 + 8s_2\}$. | | |
| $s_0=0$ | | C | C | A | B | B | Шаг 2: $C > A$ (14:13). | |



Аксиоматический подход

7. Пополнение – если 2 независимые группы избирателей выбирают кандидата A , то, объединившись, они выберут его же. **Не выполняется для любого правила, состоятельного по Кондорсе.**

Состоятельный по Кондорсе метод выбирает A в группе 1, при этом $B > A$

Гр.1:

Гр. 2:

2 2 2 4 3
(2:4).

Гр.1: победитель A . $A < B$ (2:4), $A > C$ (4:2), $B < C$

C A B A B
(7:0).

Гр.2: победитель A . $A > B$ (4:3), $A > C$ (7:0), $B > C$

8. Участие – собственный бюллетень не может уменьшить полезность избирателя. **Не выполняется для любого правила, состоятельного по Кондорсе, при 4 и более кандидатах.**

A B C C C
3 3 5 4 4

A A D B C

Правило Симпсона до участия: победитель A .

D D B C A

$S(A)=6(B,C)$, $S(B)=4(D)$, $S(C)=3(B)$, $S(D)=5(A)$.

C B C A B

Правило Симпсона после участия: победитель B .

B C A D D

$S(A)=6(C)$, $S(B)=8(D)$, $S(C)=7(D)$, $S(D)=5(A)$.



Аксиоматический подход

9. Неманипулируемость (независимость от посторонних альтернатив) – нельзя увеличить свою полезность, ведя стратегическое голосование. **При наличии 3 и более кандидатов справедливо только для правила диктатора (теор. Гиббарда-Сэттертуэйта).**

3 2 2 Избиратели с профилем $C > B > A$ видят, что C не побеждает ни
A B C при каких обстоятельствах и стратегически голосуют $B > C > A$.

Разрешение проблемы: В результате от положения C меняется победитель


1. Вероятностные правила голосования.

С А Пример: **«Правило случайного диктатора»** – вероятностная версия относительного большинства. Доминирующая стратегия – указать наилучшего для себя кандидата. Не выполняется «Парето-эффективность».

2. Ограничение области предпочтений

Пример: **«однопиковые предпочтения»** – предпочтения, для которых при линейном упорядочении кандидатов полезность сначала возрастает до некоторого пика, а затем уменьшается.

Случай однопиковых предпочтений




Коллективный выбор температуры в комнате (открыть / закрыть окно)

24 > 26 (4:1), 22 > 24 (3:2), 21 > 22 (3:2)


Из двух альтернатив побеждает подержанная медианным избирателем!

Упорядочение не обязательно должно быть изначально. Можно придумать порядок, при котором предпочтения однопиковые!



-1,59 -0,87 0,30 0,69 1,14
КПРФ СР ЕР ЛДПР СПС

Экономическая свобода



ЦСКА, Локомотив, Спартак



ЦСКА, Локомотив, Спартак

Л Л С Ц С Ц У Локомотива при игре с ЦСКА и Спартаком
С Ц Л Л Ц С двойная поддержка трибун!
Ц С Ц С Л Л

Сопоставление результатов в турнире троих и в чемпионате:

- 2000 – Локомотив во внутригрупповом выше Спартака, хотя в чемпионате Спартак по-прежнему (как и в 90-е) победитель с большим отрывом.
- 2001-2004, 2008 – одинаковые результаты в чемпионате и в турнире 3 команд.
- 2005-2006 (!!!) – Локомотив лучший в группе, хотя худший в чемпионате
- 2007 – Локомотив существенно хуже остальных в чемпионате, но второй в группе с большим опережением Спартака и рядом с 1 местом ЦСКА.

Неограниченная область предпочтений приводит к стратегическому поведению и плохим для всех исходам для любых правил голосования!



Выполнение аксиом для различных правил голосования

| | О | Б | А | М | Ш | 2 | К | В | С | П | Д | Ж |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Простота | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Однозначность | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Анонимность | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Нейтральность | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
| Состоятельность по Кондорсе | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
| Парето-эффективность | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | - |
| Монотонность | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
| Пополнение | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - |
| Участие | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - |
| Неманипулируемость | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + |

О – относительное большинство

Б – правило Борда

А – правило антибольшинства

М – Борда со строго монотонной шкалой

Ш – Борда с произвольной шкалой

2 – относительное большинство, 2 тура

К – правило Кондорсе


В – вариация Копленда

С – вариация Симпсона

П – повестка дня

Д – правило диктатора

Ж – жребий



Теорема Эрроу

Более сложная задача – не просто найти победителя, но составить порядок

$N = \{1, 2, \dots, n\}$ – избиратели, $A = \{a, b, c, \dots\}$ – кандидаты.

$P(A)$ – множество линейных порядков на A

$R(A)$ – множество нестрогих порядков на A

$$P(A)^n \rightarrow R(A)$$

Если $|A|=2$, есть единственное анонимное, нейтральное и монотонное правило – **правило большинства**. Оно также является неманипулируемым.

Теорема Эрроу о невозможности демократии: если $|A|>2$, существует единственное Парето-эффективное неманипулируемое правило – **правило диктатора**.

Пример стратегического поведения, приводящего к плохому для всех исходу, для правила Борда:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| 4 | Л | Ц | С | С=Л=Ц=9 | Л | Ц | С | Д=9 |
| 3 | С | Л | Ц | Д=3 | Д | Д | Д | М=6 |
| 2 | Ц | С | Л | М=0 | М | М | М | Л=Ц=С=5 |
| 1 | Д | Д | Д | С | Л | Ц | | |
| 0 | М | М | М | Ц | С | Л | | |



Метод Шульце (1997)

(метод разъезженного пути)

- Избиратели указывают в бюллетене предпочтения относительно кандидатур. 1 – наиболее желаемый кандидат, 2 – второй по предпочтительности и т.д.
- Разрешается ставить одинаковые числа нескольким кандидатурам.
- Разрешается вообще не заполнять поле для части кандидатур (в таком случае считается, что они одинаково хуже всех, для которых указано число).

Обработка результатов голосования:

$d(A,B)$ – число избирателей, строго предпочитающих кандидата A кандидату B .


Путь силы p от A до B – последовательность кандидатов $C(1), \dots, C(n)$ со св-ми:

1. $C(1)=A, C(n)=B$.
2. $d(C(i),C(i+1)) > d(C(i+1),C(i)), i=1, \dots, n$.
3. $p = \min d(C(i),C(i+1))$.

Сила сильнейшего пути $p(A,B)$ – максимальное значение силы пути от A до B .

Если пути от кандидата A к кандидату B не существует, $p(A,B)=0$.

Победитель – кандидат A , такой что $p(A,B) \geq p(B,A)$ для каждого кандидата B .



Метод Шульце (1997). Пример

45 избирателей, 5 кандидатов:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| A | A | B | C | C | C | D | E |
| C | D | E | A | A | B | C | B |
| B | E | D | B | E | A | E | A |
| E | C | A | E | B | D | B | D |
| D | B | C | D | D | E | A | C |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | $d(*,A)$ | $d(*,B)$ | $d(*,C)$ | $d(*,D)$ | $d(*,E)$ |
| $d(A,*)$ | | 20 | 26 | 30 | 22 |
| $d(B,*)$ | 25 | | 16 | 33 | 18 |
| $d(C,*)$ | 19 | 29 | | 17 | 24 |
| $d(D,*)$ | 15 | 12 | 28 | | 14 |
| $d(E,*)$ | 23 | 27 | 21 | 31 | |

| | кА | кВ | кС | кD | кE |
|------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| от А | | A-30-D-28-C-29-B | A-30-D-28-C | A-30-D | A-30-D-28-C-24-E |
| от В | B-25-A | | B-33-D-28-C | B-33-D | B-33-D-28-C-24-E |
| от С | C-29-B-25-A | C-29-B | | C-29-B-33-D | C-24-E |
| от D | D-28-C-29-B-25-A | D-28-C-29-B | D-28-C | | D-28-C-24-E |
| от E | E-31-D-28-C-29-B-25-A | E-31-D-28-C-29-B | E-31-D-28-C | E-31-D | |

$E > A$ (25:24), $E > B$ (28:24), $E > C$ (28:24), $E > D$ (31:24)

$A > B$ (28:25), $A > C$ (28:25), $A > D$ (30:25)

$C > B$ (29:28), $C > D$ (29:28)

$B > D$ (33:28)

$E > A > C > B > D$



Метод Шульце. Еще примеры

Кондорсе:

23 17 2 10
8
A B B C
C

| | $d(*,A)$ | $d(*,B)$ | $d(*,C)$ | к A | к B | к C |
|----------|----------|----------|----------|------|-------------|-------------|
| $d(A,*)$ | | 33 | 25 | A | A-33-B | A-33-B-42-C |
| $d(B,*)$ | 27 | | 42 | B | B-42-C-35-A | B-42-C |
| $d(C,*)$ | 35 | 18 | | от C | C-35-A | C-35-A-33-B |

$B > A$ (35:33), $A > B > C$ (42:33), $C > A$ (35:33) **$B > C > A$**

Янг, 100 избирателей:

| | A | B | C | D | к A | к B | к C | к D |
|---|----|----|----|----|------------------|-------------|------------------|-------------|
| A | | 76 | 68 | 34 | | A-76-B | A-76-B-68-D-70-C | A-76-B-68-D |
| B | 24 | | 66 | 68 | D-66-A | | B-68-D-70-C | B-68-D |
| C | 62 | 64 | | 30 | C-64-B-68-D-66-A | C-64-B | | C-64-B-68-D |
| D | 66 | 32 | 70 | | D-66-A | D-66-A-76-B | D-70-C | |

$A > B$ (76:66), $A > C$ (68:64), $A > D$ (68:66),

$B > C$ (68:64), $B > D$ (68:66), $D > C$ (70:64).

$A > B > D > C$. Общая поддержка этого порядка $76+38+34+36+68+70=322$.

$D > C > A > B$. Общая поддержка этого порядка $66+32+70+62+64+76=370 > 322$.



*Спасибо
за внимание!*

<http://math.isu.ru/filatov>,
<http://polnolunie.baikal.ru/me>,
http://fial_.livejournal.com,
alexander.filatov@gmail.com