


# Практическое занятие 3

Подготовила студентка 2 курса, группы лого-1,  
Бурмакина Екатерина.




# Психопатологическая семиотика.


Семиотика-систематическое описание признаков, феноменов психических заболеваний, является важнейшей составной частью общей психопатологии, поскольку именно в семиотике отражаются наиболее специфические особенности данной группы заболеваний.

## Психопатологическая синдромология (А.В. Снежневский)


### Позитивные симптомы



### Негативные симптомы



# Психопатологическая синдромология.



Синдром — комплекс симптомов.

Психопатологический синдром — комплекс более или менее типичная совокупность внутренне (патогенетически) связанных между собой психопатологических симптомов, в особенностях клинических проявлениях которой находят свое выражение объем и глубина поражения психических функций, острота и массивность действия на мозг патогенной вредности.

Психопатологические синдромы — это клиническое выражение различных видов психической патологии, которые включают психические заболевания психотического (психозы) и непсихотического (невроты, пограничные) типов, кратковременные реакции и стойкие психопатологические состояния.



# Первая помощь при эпилепсии.

- Уложить на ровную, желательно мягкую поверхность. Это, чтоб обезопасить от случайных травм во время неадекватного состояния. Расстегнуть верхние пуговицы, освободить от стягивающей одежды. Она может душить, опасно ограничивать его движения.
- Попробуйте повернуть голову пациента вправо или влево, чтобы не дать захлебнуться слюной, возможными рвотными массами.
- Все предметы, находящиеся в поле досягаемости для упавшего, необходимо отодвинуть. Человек не отдает себе отчет в том, что делает его тело. И может схватить что-нибудь, нанести себе или окружающим травму.
- В ротовую полость вставляем только мягкие предметы, не пытайтесь дать попить, скормить таблетку. Просто переждите опасное время, позвонив в скорую. После, когда все завершится и настанет сон, обеспечьте покой.
- Попробуйте осторожно, мягким валиком (из галстука, платка) разомкнуть челюсти. Но не пальцами. Судороги могут быть настолько сильными, что ломаются зубы. Открывая рот, мы избегаем этой опасности.
- После того, как опасность минует и эпилептик придет в себя, ему сразу нужно принять лекарство. Это поможет предотвратить повторные припадки

# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СУДОРОЖНОМ ПРИСТУПЕ



**Не кладите ничего пациенту в рот**



Зафиксируйте  
длительность  
приступа

Не мешайте оказанию  
первой помощи

Расстегните  
воротник





# Первая помощь при эпилептическом приступе у ребенка



Засеките время приступа

Не хватайте и не держите

Объясните окружающим

Попросите толпу разойтись

Успокойте ребенка





**Спасибо  
За  
Внимание!**