


# «Проблемы выхаживания глубоко недоношенных детей на этапе реанимации»




# Данные официальной статистики

МЗ РФ 2014


Из них с ЭНМТ - 1,1%		
Вес, граммы	Количество	Проценты
500-749	2048	0,11
750-999	4692	0,25
1000-1499	12355	0,65



# Outcome Mortality 22-32 wks GA



# Смертность



# Causes and Timing of Death in Extremely Premature Infants from 2000 through 2011

*R.M. Patel, S. Kandefer, et al N Engl J Med. 2015 Jan 22; 372(4): 331–340.*

- Проспективный анализ летальности ЭНМТ /6075 случаев (27,3%) из 22.248 рождённых живыми/
  - респираторные причины,
  - незрелость ,
  - инфекция,
  - повреждения ЦНС,
  - НЭК ←

# Факторы влияющие на микрофлору кишечника новорождённого



# Энтераное питание



- Молозиво за щёчку в родильном зале;
- Контакт кожа к коже;
- Первое питание через 3 часа после рождения.







# Факторы риска возникновения госпитальных инфекций

- Низкая квалификация персонала;
- Непоследовательность действий при выполнении манипуляций;
- Инвазивные вмешательства;
- Нарушение техники энтерального кормления;




# Протоколы инвазивных манипуляций

## ПРОТОКОЛ ПОСТАНОВКИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КАТЕТЕРА



Надеть шапку и маску.



Вымыть руки  
антибактериальным  
мылом до локтя.



Обработать руки  
антисептиком  
с экспозицией 30 сек.



Надеть стерильный халат и перчатки  
с помощью ассистента.



### НЕСТЕРИЛЬНЫЙ СТОЛ



- катетер
- ножницы
- шприцы по 2,0 мл
- стерильные неопудренные перчатки
- стерильный и нестерильный пластырь
- стерильные салфетки, кожный антисептик
- р-р NaCl 0,9% с мини-спайком
- р-р 40% глюкозы 0,2

### ПОДГОТОВКА СТЕРИЛЬНОГО СТОЛА



### СБОР СТЕРИЛЬНОГО СТОЛА



Ассистент  
обеспечивает доступ  
к пациенту.



Первичная обработка  
конечности.



Организация стерильного поля.



Повторная обработка  
конечности сестрой,  
проводящей манипуляцию.



Катетеризация.



# «Виртуальная изоляция» пациента;



# АУДИТ

- Видеонаблюдение
- Инфекционный контроль
- Взаимоконтроль
- Совместная *регулярная* работа с эпидемиологом





енный  
ухажив




каса  
мать



- Смена памперса
- Энтеральное питание, в т.ч. зондовое с помощью перфузора
- Репозиция датчиков
- Гигиенические ванны
- Массаж
- Любые рутинные мероприятия













Handwritten text on the white cloth:

1993 7/29  
P- 31/100  
05/17/24

# **Изменение антибактериальной стратегии**

- **Определены более строгие показания к назначению антибактериальной терапии, основанные на мониторинговании уровней маркёров воспаления и результатах бактериологического исследования;**
- **Внедрение протоколов антибактериальной терапии;**
- **Исключены из обращения незащищённые цефалоспорины;**
- **Сокращено использование антибактериальных препаратов резерва;**
- **Ротация антисептиков.**

# ТРУДНОСТИ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ В ОРИТН

- Рост устойчивости микроорганизмов и неэффективность известных антибиотиков;
- «Параллельный ущерб» - селекция полирезистентных микроорганизмов.
- Ограничение спектра используемых АМП может временно снизить резистентность к конкретному препарату (?).
- Локальная клиническая микробиологическая лаборатория - краеугольный камень в контроле за использованием антибиотиков.


# Как превратить эпидемиолога из врага в друга и помощника?

- Необходимо:
  - сесть вместе за круглый стол;
  - обозначить круг проблем, связанных с внутрибольничной инфекцией;
  - попросить помощи в организации противоэпидемических мероприятий, изложив свой план действий;
  - провести совместный обход отделения с целью инфекционного контроля.

# Микробиологический мониторинг



## 2012-2013гг.

- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Klebsiella pneumoniae*  
ESBL +



## 2014-2015гг

- Coagulase negative staphylococcus species
- *E. coli* ESBL +




# Парентеральное питания



- Венозный доступ с родильного зала
- Базовая инфузия на предполагаемый вес плода до рождения. (АК + глюкоза)
- Отсутствие ЦВК (по возможности)



# Оценка развития



- Несвоевременная оценка не даёт объективной картины
- День «Ч» - еженедельная антропометрия, быстрая реакция
- Изменение диаметра





# Летальность

Масса при рождении (г).	2012	2013	2014	2015
до 499	6 (100%)	4 (100%)	0	2(100%)
500-749	25 (67,8%)	14 (66,7%)	8 (38,1%)	9 (42,8%)
750-999	9 (22,5%)	12 (37,5%)	1 (2,9%)	7 (20,0%)
<b>Всего ЭНМТ</b>	<b>40 (47,6%)</b>	<b>30 (55,5%)</b>	<b>9 (16,4%)</b>	<b>18 (22,8%)</b>

Гестационный возраст	2012	2013	2014	2015
22-24	21 (67,7%)	12 (75%)	6 (46,1%)	9 (47,4%)
25-27	15 (50%)	12 (42,6%)	2 (7,7%)	8 (21,6%)
28-30	4 ( 20%)	6 (54,5%)	1 (8,3%)	1 (5,6%)

# Некротизирующий энтероколит

	2013			2014			2015		
<b>Число больных с НЭК</b>	9 (1,5%)			2 (0,4%)			5 (0,8%)		
<b>Масса при рождении</b>	<750	750-999	999-1500	<750	750-999	999-1500	<750	750-999	999-1500
<b>оперированы</b>	5	-	2	2	-	-	3	1	1
<b>Умерло</b>	6	-	2	2	-	-	1 (585гр)	-	-
<b>Летальность</b>	88,8% (8)			100% (2)			20% (1)		

# Проблемы

- Состояние здоровья и социальный уровень рожениц;
- Уровень пренатальной диагностики врождённых пороков развития;
- Рост уровня резистентности микроорганизмов;
- Трудности с приобретением оригинальных препаратов;
- Отсутствие достоверной статистики по ВБИ;
- Проблемы энтерального питания (отсутствие банка грудного молока);
- Отсутствие лабораторных микрометодик;
- Недостаточная подготовка кадров амбулаторного этапа по ведению детей с ЭНМ

И .....



# Командный подход

